

Pendant l'été, Santé publique France surveille l'exposition de la population à la chaleur et les impacts sur la santé.

Chaque année, le bilan de cette surveillance apporte des éléments pour faire évoluer la prévention et l'adaptation. Retour sur l'été 2023.

Qu'appelle-t-on canicule ?

Les canicules sont définies par département lorsque les moyennes de 3 jours des températures minimales et maximales mesurées dépassent les seuils d'alerte.

En Île-de-France


Les 8 départements ont été classés en « vigilance orange » du 08 au 11/09. Les indicateurs de morbidité sont restés stables à part sur la seule journée du 11 ; augmentation chez SOS médecins et d'iCanicule (sans hospitalisations). Les passages en services d'urgences ont augmenté faiblement.

Au niveau national
ÉTÉ 2023



été le plus chaud observé dans l'Hexagone depuis le début du XX^e siècle.

EN ÎLE-DE-FRANCE, UNE CANICULE OBSERVÉE AU COURS DE L'ÉTÉ 2023



D 8 au 11 septembre

6 départements concernés sur 8

Durée par département

MIN 3 jours
MAX 4 jours
MOYENNE 3,7 jours




Qu'est-ce qu'un seuil d'alerte ?

Les seuils d'alerte correspondent à des températures associées à une augmentation importante du risque de mortalité de la population exposée à la chaleur. Ils ont été définis pour chaque département sur une période historique de 30 ans.

Nombre de jours de canicule en 2023

- Plus de 20 jours
- 15 à 19 jours
- 10 à 14 jours
- 6 à 9 jours
- 3 à 5 jours
- Aucun



RECOURS AUX SOINS D'URGENCE : QUEL IMPACT DE L'EXPOSITION À LA CHALEUR ?

Santé publique France surveille les recours aux soins d'urgence, notamment un indicateur iCanicule (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) reflétant spécifiquement des effets sur la santé apparaissant rapidement après une exposition à la chaleur. Cet indicateur décrit la dynamique des recours aux soins afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion.

Durant la période de surveillance

(1^{er} juin – 15 septembre)

	Total	14 ans et moins	15 à 74 ans	75 ans et plus
Actes SOS Médecins pour iCanicule	325	33%	38%	27%
Passages aux urgences pour iCanicule	1 893	11%	41%	48%
Hospitalisations suite à un passage aux urgences pour iCanicule	1 280	10%	34%	56%

Durant les canicules

Total Part sur la période de surveillance

29

9%

173

9%

102

8%

MORTALITÉ : QUELLE PART ATTRIBUABLE À LA CHALEUR ?

Santé publique France estime *a posteriori* par département la mortalité toutes causes attribuable à l'exposition de la population générale à la chaleur. L'objectif est d'illustrer le poids de l'exposition de la population générale à la chaleur dans la mortalité toutes causes, et son évolution spatiale et temporelle.

Durant la période de surveillance

(1^{er} juin – 15 septembre)


560 DÉCÈS

sont attribuables à la chaleur




soit **3 décès sur 100 observés**

Les 75 ans et plus représentent
sept décès sur dix



Part de la mortalité attribuable à la chaleur



Durant les canicules


86 DÉCÈS

sont attribuables à la chaleur



soit **8 décès sur 100 observés**

Les 75 ans et plus représentent
sept décès sur dix



Part de la mortalité attribuable à la chaleur

