



## السل (بي سي جي)

غالبًا ما يوصى بالتلقيح ضد مرض السل بدءًا من عمر شهر واحد وحتى سن ١٥ عامًا لدى الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالسل.

## الخناق والكزاز وشلل الأطفال (DTP)

يوصى باستخدام اللقاحات المعززة للبالغين في أعمار ثابتة في سن ٢٥ و ٤٥ و ٦٥ ثم كل عشر سنوات.

## السعال الديكي

يُجرى اللقاح المعزّز ضد السعال الديكي للشخص البالغ في عمر ٢٥ عامًا مع إمكانية الإعادة في سن ٣٩ عامًا. ينصح بالتلقيح ضد السعال الديكي عند الحامل من الثلاثية الثانية من الحمل لحماية رضيعها.

## المستدمية النزلية من النوع ب (Hib)

بالنسبة للأطفال الذين لم يلقحوا قبل ٦ أشهر، يمكن إجراء التلقيح التعويضي حتى سن ٥ سنوات باستخدام اللقاح أحادي التكافؤ (من ١ إلى ٣ جرعات حسب العمر).

## التهاب الكبد ب

إذا لم يلقح خلال السنة الأولى، فيمكن أخذ التلقيح حتى سن الـ ١٥. من سن الـ ١٦، يُنصح به فقط للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب الكبد ب.

## المكورات الرئوية

بعد ٢٤ شهرًا، يوصى بهذا التلقيح للأطفال والبالغين المعرضين للخطر.

## الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (ROR)

بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا بعد العام ١٩٨٠، فإن التحديث يعني الحصول على جرعتين من اللقاح.

## المكورات السحائية ج

من سن ١٢ شهرًا وحتى سن ٢٤ عامًا، يوصى بجرعة واحدة لمن لم يلقحوا.

## الفيروس العجلي

يوصى به لجميع الرضع من عمر شهرين. هناك حاجة إلى جرعتين إلى ثلاث جرعات (عن طريق الفم) حسب اللقاح.

## المكورات السحائية ب

يمكن إجراء التلقيح التعويضي حتى سن سنتين للرضع الذين لم يتلقوا الجرعات الثلاثة الموصى بها من اللقاحات في عمر ٢ و ٥ و ١٢ شهرًا.

## فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يوصى بتلقيح الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين ١١ و ١٤ عامًا مع إمكانية التلقيح التعويضي حتى سن ١٩ عامًا. كما يوصى بالتطعيم للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) حتى سن ٢٦ عامًا.

## الإنفلونزا

يوصى بالتلقيح، كل عام، خاصة للأشخاص المعرضين لخطر حدوث مضاعفات: الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ عامًا فما فوق، والذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، ويشملون الأطفال من سن ٦ أشهر، والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم > ٤٠ كغ / م<sup>2</sup>). سيقدّم الآن لقاح الإنفلونزا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ و ١٧ عامًا.

## كوفيد - ١٩

في الخريف، بالإضافة إلى الأشخاص المعرضين للخطر المستهدفين بالتلقيح ضد الإنفلونزا، يتم أيضًا استهداف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو من الخرف أو من متلازمة التمثيل الغذائي ٢١ بالتلقيح ضد كوفيد - ١٩.

وفي الربيع، يوصى بتلقيح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٨٠ عامًا فما فوق، والمقيمين بدور رعاية المسنين والوحدات الخاصة بالرعاية الطويلة الأمد، والأشخاص الذين يعانون من ضعف مناعي بغض النظر عن أعمارهم.

## الحزام الناري

يوصى بتلقيح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ عامًا فما فوق.

لمزيد من المعلومات



Le site de référence qui répond à vos questions

هل لديك سؤال؟ هل تؤدّ الحصول على نصيحة؟ تحدث إلى أخصائي رعاية صحية

