


Définition : Un cas cliniquement évocateur de chikungunya est défini par l'association :
- d'une fièvre élevée (température rectale ou tympanique $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) débutant de manière brutale
- et de douleurs articulaires des extrémités des membres au premier plan du tableau clinique (pour les enfants de moins de 3 ans : douloureux aux dires des parents)
- et l'absence d'autre orientation diagnostique

Surveillance des cas cliniquement évocateurs

De mi-avril à mi-juin, (S2016-15 à 23), l'estimation du nombre hebdomadaire de cas cliniquement évocateurs de chikungunya* est resté à un niveau stable et faible (Figure 1).
Au total, pour l'ensemble du département, 310 cas cliniquement évocateurs de chikungunya ont été estimés sur cette période.

| Figure 1 |

Surveillance des cas cliniquement évocateurs de chikungunya, Guyane, janvier 2014 à juin 2016 / *Estimated weekly number of chikungunya syndromes, French Guiana, January 2014 - June 2016*



*L'estimation du nombre de cas cliniquement évocateurs de chikungunya est la somme du nombre de consultations enregistrées pour ce motif par les Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS) et de l'estimation du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour ce motif (l'estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles).

Surveillance des cas probables ou confirmés

Sur la période (de S2016-15 à 23), le nombre hebdomadaire de cas probables ou confirmés de chikungunya est resté très faible. Au total sur cette période, 13 patients ont eu un diagnostic biologique positif et il s'agit uniquement de cas probables.
Le dernier cas confirmé a été enregistré en mars 2016 chez une personne vivant à Kourou.

* Analyse de la situation épidémiologique

L'activité liée au virus du chikungunya est restée calme sur le territoire guyanais: peu de cas cliniquement évocateurs ont été enregistrés et aucun cas n'a été confirmé au cours des deux derniers mois.

La situation épidémiologique du chikungunya correspond à la phase 1 du Psage : « cas sporadiques ».

*Psage : Programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies.

* Echelle du risque épidémique : ■ Cas sporadiques ■ Foyers épidémiques ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Retour à la normale

Nos partenaires

La Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaires de l'ARS (Dr Anne-Marie McKenzie, Rocco Carlisi, Claire-Marie Cazaux, Hélène Euzet, Danièle Le Bourhis), l'infirmière régionale de Veille Sanitaire Hospitalière (Christelle Prince), le réseau de médecins généralistes sentinelles, les services hospitaliers (urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), les Centres délocalisés de prévention et de soins, le CNR Arbovirus de l'Institut Pasteur de la Guyane, ainsi que l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.



Directeur de la publication
Dr François Bourdillon, directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef
Martine Ledrans, coordonnatrice scientifique de la Cire AG