

Surveillance des syndromes de gastro-entérite

Après une diminution lors de la dernière semaine de mars, le nombre hebdomadaire de cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite augmente à nouveau en avril (Figure 1). Ainsi, il est supérieur aux valeurs maxima-


les attendues depuis le début de ce mois et est estimé à 48 et 23, respectivement pour les deux dernières semaines (S2015-15 et S 2015-16). Depuis le début de l'épidémie, le nombre total de cas est estimé à 450.

Définition de cas : épisode brutal de diarrhée avec ou sans fièvre, avec au moins 3 selles liquides dans les dernières 24 heures, avec ou sans déshydratation, avec ou sans vomissement.

* Ce nombre est une estimation, pour l'ensemble de la population de Saint-Barthélemy, du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour une gastro-entérite. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies auprès du réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire estimé de syndromes de gastro-entérite vus par les médecins généralistes, Saint-Barthélemy, décembre 2013 à avril 2015 (S2015-16) / Estimated weekly number of gastro-enteritis illnesses diagnosed in GP clinics, Saint-Barthelemy, December 2013 - April 2015 (epi-week 2015-16).



Analyse de la situation

L'épidémie saisonnière de gastro-entérite continue à Saint Barthélemy. Il reste important de continuer à appliquer toutes les mesures visant à limiter la propagation des germes à l'origine de cette épidémie et principalement le lavage très régulier des mains.



Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoire, services d'hospitalisation), ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.



Directeur de la publication :
Dr François Bourdillon, directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef :
Martine Ledrans, coordonnateur scientifique de la Cire AG

Surveillance des syndromes de gastro-entérite

Le nombre estimé de cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite a continué d'augmenter lors des deux dernières semaines. (Figure 1).

Ce nombre était de 334 et 375 respectivement pour les deuxième et troisième semaines d'avril (S2015-15 et S2015-16).


Le nombre total de cas est estimé à 1320 depuis le début de l'épidémie.

Définition de cas : épisode brutal de diarrhée avec ou sans fièvre, avec au moins 3 selles liquides dans les dernières 24 heures, avec ou sans déshydratation, avec ou sans vomissement.

* Ce nombre est une estimation, pour l'ensemble de la population de Saint-Martin, du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour une gastro-entérite. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies auprès du réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire estimé de syndromes de gastro-entérite vus par les médecins généralistes, Saint-Martin, janvier 2013 à avril 2015 (S2015-16) / Estimated weekly number of gastro-enteritis illnesses diagnosed in GP clinics, Saint-Martin, Jan 2013 - April 2015 (epi-week 2015-16).



Analyse de la situation

L'épidémie saisonnière de gastro-entérite se poursuit à Saint Martin.

L'application des mesures visant à limiter la propagation des germes, et en premier lieu le lavage fréquent des mains, est vivement recommandée.



Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoire, services d'hospitalisation), ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.

Directeur de la publication :

Dr François Bourdillon, directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef :

Martine Ledrans, coordonnateur scientifique de la Cire AG