

Vaccination

Date de publication : 28 avril 2025

CORSE

POINTS CLÉS 2024 bilan des couvertures vaccinales

Nourrissons


- **Rougeole-oreillons-rubéole (ROR)**

Couverture vaccinale au moins 1 dose élevée.

- **Méningocoques**

Couverture vaccinale élevée contre les méningocoques C et en progression contre les méningocoques B.

 **Nouvelle obligation** contre les méningocoques ACWY et B



Enfants et adolescents

- **Diphthérie, tétanos et poliomyélite (DTP)**

Diminution de la couverture vaccinale avec l'âge

- **Méningocoques C**


Couverture vaccinale insuffisante chez les 15 ans et plus

 **Nouvelle recommandation** contre les méningocoques ACWY entre 11-14 ans et rattrapage entre 15-24 ans

Proposition de vaccination des 15-24 ans contre les méningocoques B

- **Papillomavirus**

Stabilité des couvertures vaccinales chez les filles et augmentation chez les garçons, même si elle reste faible.



Adultes et femmes enceintes

- **Diphthérie, tétanos et poliomyélite**

Faibles couvertures vaccinales pour les rappels recommandés à 25 ans et 45 ans

  **Adultes à jour**

41 % à 25 ans

32 % à 45 ans

- **Coqueluche**

Augmentation de la couverture chez la femme enceinte

 **44 % vaccinées durant leur grossesse**

Personnes âgées de 65 ans et plus


Couvertures vaccinales globalement très insuffisantes

 **Nouvelles recommandations**

- **Pneumocoque** pour tous dès 65 ans

- **VRS (virus respiratoire syncytial)** à partir de 75 ans ou dès 65 ans en cas de pathologies chroniques

- **Zona** pour tous dès 65 ans avec le nouveau vaccin



Vaccination

Date de publication : 28 avril 2025

CORSE

SOMMAIRE

Contexte	2
Points clés en Corse	3
Nourrissons	5
Enfants et adolescents	10
Adultes et femmes enceintes	14
Personnes âgées	16
Prévention	21
Sources de données	25
Pour en savoir plus	25

Contexte

La thématique de la semaine européenne de la vaccination 2025 est la vaccination des personnes âgées.

En 2025, la France compte presque autant de personnes âgées de 65 ans et plus (14,9 millions) que de moins de 20 ans (15,7 millions). Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ 60 % des hospitalisations pour infections respiratoires aigües virales durant la période de surveillance hivernale. Ces infections augmentent le risque cardio-vasculaire (accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde) et de décompensation de maladies métaboliques (diabète en particulier). Par ailleurs, les hospitalisations qu'elles engendrent sont associées à des pertes d'autonomie et à un déclin cognitif. Ces infections virales font aussi le lit des pneumopathies bactériennes telles que celles à pneumocoques, dont le pronostic peut être redoutable. Enfin, à partir de 50 ans, le risque de poussée de zona augmente dans l'ensemble de la population. Outre des complications neurologiques et oculaires, cette reviviscence du virus de la varicelle est surtout responsable de douleurs intenses et persistantes, ayant un impact majeur sur la qualité de vie.

Ces enjeux de santé s'expliquent par l'immunosénescence, définie par une moindre capacité de l'organisme, associée au vieillissement, à générer une immunité mémoire de qualité. Pour autant, les vaccinations chez les personnes de plus de 65 ans restent efficaces et n'en sont que plus importantes.

Face à cet enjeu, la Haute Autorité de Santé (HAS) a pris position, en avril 2024, en faveur d'une simplification du calendrier vaccinal, s'appuyant sur une approche par âges ou périodes-clés de la vie, dans un but de meilleure compréhension et appropriation par les patients et par les soignants.

Ainsi, elle a émis de nouvelles recommandations pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Outre la vaccination contre la grippe, la Covid-19 et le rappel DTP, de nouvelles vaccinations sont désormais recommandées :

- la vaccination universelle **contre les pneumocoques**, avec un vaccin conjugué 20-valent permettant une simplification du schéma vaccinal ;
- la vaccination **contre les virus respiratoires syncytiaux (VRS)** ;
- l'introduction d'un vaccin recombinant **contre le zona** sans limite d'âge et d'une efficacité bien supérieure à celle du vaccin à virus vivant atténué utilisé jusqu'alors.

Les couvertures vaccinales des personnes âgées peuvent très largement être améliorées grâce à ces nouvelles approches, pour leur offrir une entrée dans la vieillesse dans les conditions les plus favorables possibles.

Ce bulletin présente également les principaux indicateurs de couverture vaccinale aux autres âges ou périodes-clés, avec de nouveaux indicateurs produits par Santé publique France, concernant les rappels DTP ou encore la vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte.

Points clés en Corse

• Chez les nourrissons

La couverture vaccinale contre la **rougeole, les oreillons et la rubéole** au moins 1 dose était élevée (92 %) ; elle était de 82 % pour le schéma complet. Cette couverture 2 doses était inférieure à l'objectif de 95 % permettant d'interrompre la transmission du virus et inférieure au niveau national. Cependant, cette estimation peut être sous-estimée en raison des vaccinations réalisées en PMI.

La couverture vaccinale contre les **infections à méningocoques C** était élevée (87 %) et celle contre les **infections à méningocoque B**, recommandée depuis 2022, avait progressé en 2024 pour atteindre 42 % (contre 31 % en 2023).

NOUVEAUTE 2025 / La vaccination des nourrissons contre les **méningocoques ACWY et B** est **obligatoire** depuis le 1^{er} janvier 2025.

Quelle que soit la valence, les couvertures vaccinales pour les vaccinations obligatoires étaient inférieures au niveau national.

• Chez les enfants et adolescents

La couverture vaccinale contre la **diphérie, le té tanos et la poliomyélite** était de 77 % pour le rappel recommandé à 6 ans, et de 72 % pour celui recommandé entre 11 et 13 ans. Elle diminuait avec l'âge et était inférieure au niveau national.

Environ 42 % des 15-19 ans étaient vaccinés contre les **méningocoques C**. Cette couverture restait très inférieure à 95 %, seuil recommandé pour interrompre la transmission de la bactérie.

NOUVEAUTE 2025 / La vaccination contre les **méningocoques ACWY** est **recommandée entre 11-14 ans**, quel que soit le statut vaccinal antérieur, avec un rattrapage possible jusqu'à 24 ans.

La couverture vaccinale contre les **papillomavirus** continuait de progresser chez les filles et chez les garçons, avec respectivement 39 % des filles et 13 % des garçons de 16 ans vaccinés avec un schéma complet. Une réduction des écarts de couverture était observée entre les deux sexes, mais celles-ci étaient inférieures au niveau national.

• Chez les adultes et les femmes enceintes

Seuls 41 % des adultes étaient à jour de leur rappel contre la **diphthérie, le té tanos et la poliomyélite** recommandé à 25 ans, et 32 % pour celui recommandé à 45 ans.

La couverture vaccinale contre la **coqueluche** des femmes enceintes, recommandée depuis 2022 lors du second trimestre de grossesse, était en augmentation. Moins de la moitié des femmes ayant accouché en 2024 avaient été vaccinées pendant leur grossesse. Elles étaient un quart en 2023.

• Chez les personnes âgées de 65 ans et plus

Les couvertures vaccinales étaient globalement insuffisantes, avec 46 % de personnes de 65 ans et plus vaccinées contre la **grippe** (stable par rapport à la saison précédente), alors que l'objectif est de 75 %. Pour la **diphthérie, le té tanos et la poliomyélite**, seul un tiers des personnes étaient à jour de leur rappel recommandé à 65 ans. La couverture vaccinale contre les pneumocoques chez les 65 ans et plus à risque était très faible (14 %) et inférieure à celle retrouvé au niveau national.

En plus des rappels de vaccination contre la diphthérie, le té tanos et la poliomyélite, ainsi que la vaccination annuelle contre la grippe et le Covid-19, **de nouvelles vaccinations concernent désormais l'ensemble des personnes à partir 65 ans**, il s'agit des vaccinations contre le pneumocoque et le zona (avec le nouveau vaccin), et de la vaccination contre les VRS à partir de 75 ans ou dès 65 ans en cas de pathologies chroniques.

Nourrissons

Les vaccinations obligatoires en 2024

Diphthérie, téтанos, poliomyélite (DTP), coqueluche, *Haemophilus influenzae b* (*Hib*), hépatite B et pneumocoques

En 2024, la couverture vaccinale (CV) des nourrissons (âgés de 21 mois) par le vaccin hexavalent, était de l'ordre de 87 % et celle par le vaccin anti-pneumococcique, de 88 % (tableau 1).

Ces CV étaient légèrement inférieures au niveau national. Le département de Haute-Corse présentait des CV plus élevées.

Méningocoque C

Environ 87 % des nourrissons (âgés de 21 mois) étaient vaccinés contre le méningocoque C.

Depuis le 1^{er} janvier 2025, la vaccination tétravalente contre les **méningocoques ACWY est devenue obligatoire pour tous les nourrissons** et jusqu'à l'âge de 2 ans (y compris pour ceux ayant déjà été vaccinés contre le méningocoque C) avec un schéma à deux doses : une dose à l'âge de 6 mois suivie d'une dose de rappel à 12 mois.

Tableau 1. Couvertures vaccinales par le vaccin hexavalent (diphthérie, téтанos, poliomyélite, coqueluche, *Haemophilus influenzae b*, hépatite B), contre les pneumocoques, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et contre le méningocoque C, à l'âge de 21 mois en 2024 (enfants nés entre janvier et mars 2023), Corse, France

zone géographique	hexavalent ¹ 3 doses (cohorte 2023) (%)	pneumocoques ² 3 doses (cohorte 2023) (%)	ROR au moins 1 dose (cohorte 2023) (%)	méningocoque C ³ 1 dose (cohorte 2023) (%)
2A - Corse-du-Sud	85	86	90	85
2B - Haute-Corse	90	90	94	88
Corse	87	88	92	87
France hexagonale*	92	92	95	89
France entière*	92	92	95	89

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024.

¹Pour limiter le biais lié au fait que les vaccinations fournies gratuitement dans les PMI ne soient pas enregistrées dans le DCIR, les enfants n'ayant eu aucun remboursement de vaccin pentavalent ou hexavalent la première année de vie sont exclus de l'analyse. Les couvertures vaccinales par le vaccin hexavalent (3 doses) restent susceptibles d'être sous-estimées, du fait de la vaccination d'enfants alternativement en PMI et en cabinet médical.

²Pour le pneumocoque, les couvertures vaccinales (3 doses) sont susceptibles d'être sous-estimées du fait de la vaccination d'enfants alternativement en PMI et en cabinet médical.

³Pour estimer la couverture vaccinale de la dose de vaccin contre le méningocoque C recommandée à l'âge de 12 mois, les doses de vaccins (1^{re} ou 2nd dose) délivrées à partir de l'âge de 10 mois, ont été prises en compte.


*Pour les estimations nationales, les analyses ont exclu les départements pour lesquels le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale. Pour le vaccin hexavalent, la vaccination contre les pneumocoques et la vaccination ROR, il s'agit de : Seine-Saint-Denis, la Guyane, la Martinique et Mayotte. Pour la vaccination contre le méningocoque C, il s'agit de : la Guyane et Mayotte.

Rougeole, oreillons et rubéole

En 2024, 92 % des enfants âgés de 21 mois avaient reçu au moins 1 dose de vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR – tableau 1).

La couverture vaccinale ROR (2 doses) était estimée à 82 % chez les enfants à 33 mois en Corse. **Ces couvertures se situaient en dessous de l'objectif de 95 %**, nécessaire pour interrompre la circulation du virus de la rougeole. Elles étaient, par ailleurs, parmi les plus faibles des départements (figure 1) et donc inférieures aux CV nationales (95 % pour 1 dose et 87 % pour 2 doses). La seconde dose est **susceptible d'être sous-estimée** du fait de la vaccination d'enfants alternativement en PMI et en cabinet médical, les vaccinations fournies gratuitement en PMI n'étant pas enregistrées dans le système national des données de santé (SNDS).

Figure 1. Couvertures vaccinales départementales contre la rougeole (2 doses), à l'âge de 33 mois en 2024 (enfants nés entre janvier et mars 2022), France*



*Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire et surestiment très vraisemblablement la couverture vaccinale.

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024

ROUGEOLE : vigilance renforcée face à la recrudescence des cas

Le virus de la rougeole est parmi les plus contagieux : une personne contagieuse peut contaminer 15 à 20 personnes. Bien que la CV ROR se maintienne à un niveau élevé chez les nourrissons, du fait de l'obligation vaccinale mise en place en 2018, **l'objectif de 95 % (à deux doses) n'est pas encore atteint**. Chez les adultes âgés de 18 à 35 ans, la CV était estimée à 90 % en France (baromètre 2021). Les personnes non vaccinées ou n'ayant jamais eu la rougeole représentent une population réceptive à la rougeole dans un contexte de **recrudescence de la rougeole avec une épidémie de grande ampleur au Maroc** et des flambées épidémiques en Europe et dans le monde.

En France, entre le 1^{er} janvier et le 14 mars 2025, 180 cas ont été déclarés contre 83 en 2024 sur la même période, **avec une augmentation du nombre de cas importés suite à un séjour au Maroc** ([bulletin au 20 mars 2025](#)). En plus des recommandations du calendrier vaccinal en vigueur pour les personnes nées depuis 1980 et âgées d'au moins 12 mois, **des recommandations spécifiques existent pour les personnes devant voyager dans une zone de forte endémicité, comme le Maroc actuellement.**

⚠ Pour les nourrissons : la vaccination ROR peut être administrée dès l'âge de 6 mois (voyage ou situation particulière). Ces nourrissons doivent par la suite recevoir deux doses de vaccin ROR trivalent selon le calendrier vaccinal (1 dose à l'âge de 12 mois, puis une dose entre 16 et 18 mois).

⚠ Pour les personnes nées avant 1980 non protégées contre la rougeole (sans antécédent connu de rougeole ou non vaccinées antérieurement) : une dose de vaccin ROR est recommandée.

Pour en savoir plus : [lien](#)

Vaccination contre les méningocoques B

La vaccination contre les méningocoques B recommandée entre 2022 et 2024 est devenue **obligatoire pour tous les nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans depuis 1^{er} janvier 2025**, par le vaccin Bexsero® avec un schéma comprenant deux doses (à 3 et 5 mois) et un rappel à 12 mois. **Un rattrapage vaccinal méningocoque B est recommandé de façon transitoire pour les jeunes enfants**, jusqu'à l'âge de 4 ans révolus (5^e anniversaire). Une vaccination est également mise en place pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Cette vaccination prévient les infections invasives à méningocoque B mais n'éradique pas le portage pharyngé et ne prévient donc pas la transmission. La protection apportée par ce vaccin est donc uniquement individuelle et les enfants non vaccinés ne bénéficient pas d'une protection collective (protection collective induite par un haut niveau de couverture vaccinale lorsque la vaccination prévient le portage et la transmission).

En 2024, la CV (schéma complet) contre les méningocoques B était de 42 %, en progression par rapport à 2023 (+ 11 points), mais inférieure de 15 points par rapport au niveau hexagonal (tableau 2 et figures 2 et 3). Soixante-dix-sept pourcents des enfants âgés de 8 mois avaient initié leur schéma vaccinal contre les méningocoques B en 2024.


Pour cette valence, la CV était plus élevée en Corse-du-Sud.

Tableau 2. Couvertures vaccinales méningocoque B au moins 1 dose, à l'âge de 8 mois, et 2 doses + rappel à l'âge de 21 mois, en 2023 et 2024, Corse, France

zone géographique	méningocoque B			
	au moins 1 dose à 8 mois	2 doses + rappel à 21 mois	2023 (%)	2024 (%)
2A - Corse-du-Sud	69	83	36	46
2B - Haute-Corse	73	73	25	38
Corse	71	77	31	42
France hexagonale	75	82	36	57
France entière*	75	82	35	56


*Les analyses ont exclu le département de Mayotte pour lequel le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale.
Source : Données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024.

Figure 2. Couvertures vaccinales départementales méningocoque B (au moins 1 dose), à l'âge de 8 mois (enfants nés entre janvier et mars 2024), en 2024, France*



*Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire et surestiment très vraisemblablement la couverture vaccinale.

Figure 3. Couvertures vaccinales départementales méningocoque B (2 doses + rappel), à l'âge de 21 mois (enfants nés entre janvier et mars 2023), en 2024, France*




Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024



Recrudescence des cas des infections invasives à méningocoques

En France, une recrudescence des infections invasives à méningocoque (IIM) est actuellement observée avec un nombre de cas exceptionnellement élevé depuis le début de l'année 2025 (95 cas en janvier et 89 en février, données arrêtées au 7 mars 2025). Cette recrudescence n'est pas observée en Corse (figure 4).

Figure 4. Nombre annuel de cas d'infection invasive à méningocoque domiciliés dans la région selon le sérogroupe, janvier 2015 à mars 2025, Corse



Une vigilance particulière sur le regroupement spatio-temporel de cas est en vigueur avec deux regroupements spatio-temporels d'IIM B déjà identifiées depuis le début de l'année chez des étudiants à Lyon ainsi qu'à Rennes, avec la mise en place d'une campagne de vaccination contre les IIM B à destination des jeunes âgés de 15 à 24 ans, habitant ou scolarisés ou étudiants ou travaillant sur le territoire de Rennes Métropole.

Ces situations rappellent le potentiel de transmission et de virulence des IIM B. La détection rapide des regroupements spatio-temporels de cas permet de mettre en place des actions ciblées de vaccination.

D'autre part, les IIM liées aux sérogroupe W et Y sont en augmentation depuis 2022 et ont justifié de nouvelles recommandations de vaccination depuis le 1^{er} janvier 2025, ciblant les nourrissons et les adolescents, ainsi qu'un ratrappage jusqu'à 24 ans.

Enfin, depuis le 2 avril 2025, la vaccination contre les méningocoques B par le Bexsero® est remboursable pour les 15-24 ans.

Vaccination contre les rotavirus

 **La vaccination des nourrissons contre les rotavirus** a été introduite dans le calendrier vaccinal en 2023 avec un schéma comprenant deux doses, à 2 et 3 mois pour le vaccin monovalent (Rotarix®) ou trois doses (à 2, 3 et 4 mois) pour le vaccin pentavalent (Rotateq®).

Fin 2024, la CV au moins 1 dose des nourrissons âgés de 8 mois contre les rotavirus, était de 42 %. Elle était de 28 % pour le schéma complet (tableau 3). Cette CV semblait en légère diminution par rapport à 2023.


Tableau 3. Couvertures vaccinales rotavirus (au moins 1 dose et schéma complet) à l'âge de 8 mois, en 2023 et 2024, Corse, France

zone géographique	rotavirus			
	au moins 1 dose à 8 mois		schéma complet à 8 mois	
	2023 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2024 (%)
2A - Corse-du-Sud	41	48	31	33
2B - Haute-Corse	46	37	35	24
Corse	44	42	33	28
France hexagonale	32	46	24	36
France entière*	31	45	24	36

*Les analyses ont exclu le département de Mayotte pour lequel le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale.

Source : Données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024.

Figure 5. Couvertures vaccinales départementales rotavirus (au moins 1 dose), à l'âge de 8 mois, (enfants nés entre janvier et mars 2024), en 2024, France*



*Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire et surestiment très vraisemblablement la couverture vaccinale. Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024

Enfants et adolescents

Vaccination contre diphtérie, tétanos, poliomyélite

À 6 ans, puis entre 11 et 13 ans, un rappel de vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est recommandé. Ces vaccinations sont généralement combinées avec le rappel de vaccination contre la coqueluche.

Soixante-dix-sept pourcents des enfants ont reçu le rappel à 6 ans contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) et 72 % le rappel à 11-13 ans (tableau 4). Pour cette population, les vaccins commercialisés combinent le plus souvent les valences DTP avec la valence anti-coqueluche. Ainsi, la couverture vaccinale contre la coqueluche à ces âges pouvait être considérée comme proche de celle estimée pour le DTP.

Alors qu'à l'âge de 8 ans, la CV était un peu plus élevée en Haute-Corse par rapport à la Corse-du-Sud, ces CV étaient équivalentes à 15 ans. Ces CV étaient inférieures d'environ 5 points par rapport au niveau hexagonal.

Tableau 4. Couvertures vaccinales DTP des rappels recommandés à 6 et 11-13 ans, en 2024, Corse, France

zone géographique	diphtérie tétanos poliomyélite	
	dose de rappel	
	6 ans (%)	11-13 ans (%)
2A - Corse-du-Sud	75	73
2B - Haute-Corse	79	72
Corse	77	72
France hexagonale	83	77
France entière*	82	77

*Les analyses ont exclu le département de Mayotte pour lequel le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale.

La couverture vaccinale pour le rappel de 6 ans est estimée à l'âge de 8 ans et celle pour le rappel de 11-13 ans est estimée à l'âge de 15 ans.

Source : Données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024.

Vaccination contre les méningocoques C

 **Chez l'adolescent**, la recommandation de vaccination contre les méningocoques C est remplacée par la vaccination contre les méningocoques ACWY depuis le 1^{er} janvier 2025. Cette vaccination est recommandée entre 11 et 14 ans avec un rattrapage jusqu'à l'âge de 24 ans. Elle protège des infections invasives et éradique le portage pharyngé. Ce rattrapage permet ainsi de protéger directement les personnes vaccinées et de diminuer la circulation de ces sérogroupes. À compter de la rentrée scolaire 2025, cette vaccination sera également déployée, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination au collège, combinée à celle contre les papillomavirus. Le renforcement de la vaccination des jeunes adultes prévoit une vaccination contre les méningocoques ACWY et B pour les 15 à 24 ans.

En 2024, la couverture vaccinale contre les infections à méningocoques C était de 66 % chez les 10-14 ans, 42 % chez les 15-19 ans et 18 % entre 20 et 24 ans. Ces CV étaient très inférieures au niveau hexagonal.

Tableau 5. Couvertures vaccinales méningocoque C par tranche d'âge, de 10 à 24 ans, France, en 2023 et en 2024, Corse, France

zone géographique	ménigocoque C					
	10-14 ans		15-19 ans		20-24 ans	
	2023 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2024 (%)
2A - Corse-du-Sud	63	63	34	43	14	16
2B - Haute-Corse	66	69	34	42	18	20
Corse	65	66	34	42	16	18
<i>France hexagonale*</i>	72	74	48	54	31	34
<i>France entière*</i>	72	74	48	54	31	34

*Les analyses ont exclu les départements pour lesquels le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale : Mayotte pour l'ensemble des classes d'âge ; Haute-Vienne pour 15-19 ans ; Landes, Puy de Dôme, Hautes Pyrénées, Haute Vienne pour les 20-24 ans.

Source : Source SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024.

Vaccination contre les papillomavirus (HPV)

La vaccination contre les papillomavirus (HPV) est recommandée chez les jeunes âgés **entre 11 et 14 ans** (filles et garçons) avec un schéma à 2 doses à cinq mois d'intervalle. Un rattrapage de la vaccination est possible **jusqu'à 19 ans**, un schéma avec 3 doses est alors nécessaire.

En 2024, 51 % des filles et 22 % des garçons âgés de 15 ans (nés en 2009) avaient initié leur schéma vaccinal contre les HPV. Cette couverture avait progressé d'environ 5 points depuis 2023 (tableau 6).

La CV pour le schéma complet de vaccination contre les HPV était de 39 % chez les filles et 13 % chez les garçons en 2024, chez qui la progression était plus importante (5 points, et CV globalement stable chez les filles). Ces CV étaient très inférieures aux niveaux retrouvés au niveau hexagonal (tableau 6, figures 6 et 7).

Tableau 6. Couvertures vaccinales contre les papillomavirus humains au moins 1 dose à 15 ans et 2 doses à 16 ans, chez les filles et les garçons, en 2023 et en 2024, Corse, France

zone géographique	papillomavirus (filles)				papillomavirus (garçons)			
	au moins 1 dose à 15 ans		2 doses à 16 ans		au moins 1 dose à 15 ans		2 doses à 16 ans	
	2023 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2024 (%)
2A - Corse-du-Sud	47	52	36	40	13	24	7	14
2B - Haute-Corse	45	50	39	39	14	21	9	12
Corse	46	51	38	39	14	22	8	13
France hexagonale	56	59	46	49	27	38	16	25
France entière*	55	58	45	48	26	37	16	25

*Les analyses ont exclu le département de Mayotte pour lequel le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale.

Source : Données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024.

Figure 6. Couvertures vaccinales contre les papillomavirus humains (2 doses) à 16 ans, chez les jeunes filles, en 2024, France*





Figure 7. Couvertures vaccinales contre les papillomavirus humains (2 doses) à 16 ans, chez les garçons, en 2024, France*



*Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire et surestiment très vraisemblablement la couverture vaccinale.

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024

Campagne de vaccination contre les papillomavirus dans les collèges

La seconde campagne de vaccination contre les papillomavirus au collège a débuté en octobre 2024 pour l'année scolaire 2024-2025. Elle a ciblé les garçons et les filles élèves de 5^e, majoritairement nés en 2012 et âgés de 12 ans en 2024.

En Corse, au 30 septembre 2024 (avant le début de la campagne), la couverture vaccinale contre les HPV, au moins une dose, était de 29 % chez les filles et de 18 % chez les garçons nés en 2012. Ces couvertures étaient supérieures respectivement de 4 et 7 points par rapport aux adolescents nés en 2011, cibles de la première campagne de vaccination au collège.

La seconde phase de cette campagne a eu lieu sur les quinze premiers jours d'avril 2025.

Les vaccinations réalisées dans les collèges, dans le cadre de cette nouvelle campagne, sont en cours d'enregistrement dans le SNDS-DCIR (système national des données de santé – datamart des consommations inter-régimes). Les estimations de couverture vaccinale contre les HPV pour les jeunes nés en 2012 à l'issue de la première phase et en fin de campagne seront diffusées lorsque l'ensemble des données seront disponibles et consolidées.

Pour rappel les résultats de la précédente campagne (année scolaire 2023-2024) sont disponibles [ici](#).

Adultes et femmes enceintes

Vaccination contre diphtérie, tétonos, poliomyélite (DTP rappel)

⚠️ À l'âge **adulte**, la mise à jour des rappels de vaccination contre la diphtérie, le tétonos et la poliomyélite est recommandée à l'âge de **25 ans** et de **45 ans**.

En 2024, 41 % des adultes avaient reçu le rappel de vaccin contre le DTP recommandé à 25 ans et 32 % avaient reçu celui recommandé à 45 ans (tableau 7). Ces CV étaient inférieures de plus de 10 points par rapport au niveau national.

Tableau 7. Couvertures vaccinales DTP des rappels recommandés à 25 et 45 ans, en 2024, Corse, France

zone géographique	diphtérie tétonos poliomyélite	
	dose de rappel	
	25 ans (%)	45 ans (%)
2A - Corse-du-Sud	44	34
2B - Haute-Corse	37	31
Corse	41	32
France hexagonale	54	43
France entière*	53	43

*Les analyses ont exclu le département de Mayotte pour lequel le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale.

La couverture vaccinale pour le rappel de 25 ans est estimée à l'âge de 30 ans et celle pour le rappel de 45 ans est estimée à l'âge de 50 ans

Source : Données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024.

Vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte

 Pendant la **grossesse**, la vaccination contre la **coqueluche** est recommandée **à partir du 2^e trimestre**, de préférence entre les semaines d'aménorrhées 20 et 36. La vaccination contre la coqueluche est recommandée à chaque grossesse.


La couverture vaccinale des femmes enceintes contre la coqueluche (vaccin recommandé depuis 2022) était en forte augmentation. En 2024, 44 % des femmes ayant accouché avaient été vaccinées contre la coqueluche pendant leur grossesse, contre 26 % en 2023.

Ces CV étaient néanmoins inférieures de 20 points par rapport au niveau national.

Tableau 8. Couvertures vaccinales contre la coqueluche chez les femmes ayant accouché en 2023 et en 2024, Corse, France*

zone géographique	coqueluche	
	année d'accouchement	
	2023 (%)	2024 (%)
2A - Corse-du-Sud	44	55
2B - Haute-Corse	10	35
Corse	26	44
France hexagonale	45	64
France entière*	43	62

Figure 8. Couvertures vaccinales contre la coqueluche chez les femmes ayant accouché en 2024, France*



*Les analyses ont exclu le département de Mayotte pour lequel le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale.

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024

*Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire et surestiment très vraisemblablement la couverture vaccinale.

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024

Personnes âgées

Vaccination contre la grippe

La vaccination contre la **grippe** est recommandée **chaque année chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus**. Malgré une efficacité modérée et variable selon les saisons, la vaccination, associée aux gestes barrières, reste la mesure de prévention la plus efficace. Elle permet en moyenne de réduire le risque de décès chez les personnes âgées vaccinées d'environ un tiers et elle diminue la mortalité cardiovasculaire habituellement associée à la grippe.

Parmi l'ensemble des personnes de 65 ans et plus, la CV était de 46 % lors de la saison 2024-25, au même niveau que celle estimée lors de la saison 2023-24 (tableau 9) et très loin de l'objectif des 75 % de couverture pour les personnes à risque. Elle était inférieure au niveau national (tableau 9 et figure 9). Cette CV augmentait avec l'âge. De 37 % chez les 65-74 ans, elle passait à 55 % chez les 75 ans et plus.


Tableau 9. Couvertures vaccinales contre la grippe, par classe d'âge, lors des saisons 2022-23 et 2023-24, Corse, France

zone géographique	grippe					
	65 ans et plus		65-74 ans		75 ans et plus	
	2023 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2024 (%)
2A - Corse-du-Sud	45	46	36	37	55	54
2B - Haute-Corse	47	47	37	37	57	56
Corse	46	46	37	37	56	55
France hexagonale	55	54	47	47	62	61
France entière*	54	54	47	47	62	61

* Ne comprend pas les données de la Réunion, où la période de la campagne de contre la grippe est différente de celle des autres départements, ni Mayotte. Ces estimations n'incluent pas les personnes avec obésité morbides ni les femmes enceintes qui ne reçoivent pas de bon de prise en charge.

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 28/02/2025

Figure 9. Couvertures vaccinales contre la grippe, 65 ans et plus, en 2024, France*



* Ne comprend pas les données de la Réunion, où la période de la campagne de contre la grippe est différente de celle des autres départements, ni Mayotte. Ces estimations n'incluent pas les personnes avec obésité morbides ni les femmes enceintes qui ne reçoivent pas de bon de prise en charge.

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 28/02/2025

Concernant les **estimations de couvertures vaccinales contre la grippe chez les résidents et les professionnels exerçant en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), incluant les Ehpad**, une enquête *ad hoc* a été réalisée auprès de ces établissements pour la saison 2024-25.

Les résultats de cette enquête seront publiés avant juin 2025 sur le site Internet de Santé publique France.

Les résultats de la précédente enquête indiquaient une **tendance à la baisse** de la couverture vaccinale contre la grippe **des résidents en Ehpad**, et surtout **une baisse marquée chez les professionnels des Ehpad** depuis la crise liée à la Covid-19.

Vaccination contre diphtérie, téтанos, poliomyélite (DTP rappel)

⚠ À partir de l'âge de 65 ans, un rappel contre la diphtérie, le téтанos et la poliomyélite est recommandé **tous les dix ans**.

En 2024, dans la région, 32 % des personnes étaient à jour de leur rappel contre le DTP recommandé à 65 ans (tableau 10). Seulement 26 % et 21 % avaient reçu les rappels recommandés à 75 et 85 ans. **Cette couverture vaccinale diminuait avec l'âge** et était, là aussi, inférieure à celle des autres départements (figure 10). Les rappels à 65 ans, 75 ans et 85 ans restaient insuffisamment réalisés.

Tableau 10. Couvertures vaccinales DTP des rappels recommandés à 65, 75 et 85 ans, en 2024, région, France


zone géographique	diphtérie téтанос poliomyélite		
	65 ans (%)	75 ans (%)	85 ans (%)
2A - Corse-du-Sud	33	29	27
2B - Haute-Corse	30	24	16
Corse	32	26	21
France hexagonale	50	45	34
France entière*	50	44	34

*Les analyses ont exclu le département de Mayotte pour lequel le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale.

La couverture vaccinale pour le rappel de 65 ans est estimée à l'âge de 70 ans, celle pour le rappel de 75 ans est estimée à l'âge de 80 ans et celle pour le rappel de 85 ans est estimée à l'âge de 90 ans.

Source : Données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024.

Figure 10. Couvertures vaccinales DTP du rappel recommandé à 65 ans, en 2024, France*



*Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire et surestiment très vraisemblablement la couverture vaccinale.

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2024

Vaccination contre le zona

Depuis 2024, la vaccination contre le zona est recommandée pour les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus et tous les adultes de 65 ans et plus avec le vaccin Shingrix®. Pour ces personnes, depuis le 14 décembre 2024, ce vaccin est remboursé à 65 % par l'Assurance maladie.

Les dernières estimations disponibles chez les adultes de 65 à 74 ans, en 2023, indiquaient des couvertures très faibles (moins de 2 % de la population).

Des estimations de couvertures vaccinale prenant en compte l'utilisation du Shingrix® seront fournies l'année prochaine.

Vaccination contre les pneumocoques

⚠️ Jusqu'en 2023, la vaccination anti-pneumococcique était recommandée à partir de 2 ans pour l'ensemble des personnes à risque élevé d'infection à pneumocoque en utilisant une dose de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (VPC 13) suivie d'une dose de vaccin pneumococcique polyosidique non conjugué 23-valent (VPP 23) selon des modalités dépendant des antécédents vaccinaux.

Depuis 2024, il est possible de simplifier le schéma vaccinal en n'utilisant qu'un vaccin pneumococcique conjugué 20-valent (VPC 20) à partir de 18 ans.

Fin 2024, la HAS a recommandé l'extension de la vaccination contre les pneumocoques pour tous dès 65 ans avec un VPC 20.

Afin de disposer d'un point de référence, nous présentons les couvertures vaccinales à la fin de l'année 2023 des personnes de 65 ans et plus à risque d'infections sévères à pneumocoque avec le schéma vaccinal VPC 13 – VPP 23.

Fin 2023, dans la région, 14 % des personnes âgées de 65 ans et plus à risque d'infections sévères à pneumocoque étaient vaccinées avec le schéma vaccinal VPC 13 – VPP 23. Cette couverture était plus faible en Corse-du-Sud qu'en Haute-Corse, département dans lequel cette couverture était équivalente au niveau national.

Tableau 11. Couvertures vaccinales contre les pneumocoques chez les personnes de 65 ans et plus à risque, en 2023, Corse, France

zone géographique	pneumocoque	
	65 ans et plus à risque	VPC 13 ¹
	VPC 13-VPP 23 ²	
2A - Corse-du-Sud	14	12
2B - Haute-Corse	18	17
Corse	16	14
France hexagonale	19	17
France entière*	19	17

¹VPC 13 : vaccin pneumococcique conjugué 13-valent. ²VPP 23 : vaccin pneumococcique polyosidique (non conjugué) 23-valent

Les schémas vaccinaux pris en compte dans cette analyse sont le remboursement d'au moins une dose de VPC13 ou de la séquence VPC13-PPV23 depuis le 01/01/2014 jusqu'au 31/12/2023, quel que soit l'ordre et le délai de remboursement de ces vaccins. Les personnes souffrant de pathologies à risque prédisposant à la survenue d'une infection invasive à pneumocoque ont été repérées à partir de la cartographie 2022 de la CNAM incluant une sélection de codes CIM-10 de diagnostics du PMSI, d'affections de longue durée (ALD), de remboursements de médicaments spécifiques de certaines pathologies et d'actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM). Les vaccins non remboursés, administrés gratuitement, par exemple à l'hôpital, ne sont pas enregistrés dans le SNDS et donc non pris en compte dans cette analyse. Cela peut conduire à sous-estimer la CV. La méthode utilisée pour calculer la CV contre le pneumocoque sera amenée à évoluer à l'avenir.

*Les analyses ont exclu le département de Mayotte pour lequel le DCIR ne permet pas d'estimations fiables de couverture vaccinale.
Source : Données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2023

Prévention

Santé publique France est étroitement associée à la politique vaccinale pilotée par le ministère chargé de la Santé.

Outre le suivi de la couverture vaccinale, la surveillance épidémiologique des maladies à prévention vaccinale et la gestion des stocks stratégiques de vaccins, Santé publique France est responsable de plusieurs missions dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé :

- **Production de connaissances sur l'adhésion du public et des professionnels de santé** à la vaccination qui permettent d'orienter les actions développées visant à promouvoir la vaccination auprès de ces publics ;
- **Information sur la vaccination et sa promotion** afin de restaurer et maintenir la confiance dans la vaccination ;
- **Identification et promotion d'intervention prometteuses ou efficaces** permettant d'améliorer les couvertures vaccinales pour être au plus près des objectifs fixés par l'OMS.

Information et promotion de la vaccination

Dans l'objectif d'informer et promouvoir la vaccination auprès du public et des professionnels de santé, Santé publique France met à disposition de nombreux outils.

✓ Le site de référence : [vaccination-info-service.fr \(VIS\)](https://vaccination-info-service.fr)

Avec plus de 35 millions de visites depuis sa mise en ligne en 2017, vaccination-info-service.fr est le site de référence sur la vaccination pour le grand public et les professionnels de santé. Régulièrement mis à jour et enrichi en contenus textuels et vidéos, le site comprend un espace à destination du grand public et un autre à destination des professionnels de santé, permettant ainsi à tous d'accéder à des informations fiables et précises sur la vaccination.

Chaque année, les deux versions intègrent les nouvelles recommandations publiées dans le calendrier vaccinal. Les informations principales publiées sur la version « professionnel » sont également mises en avant dans l'encart « Actualités » visible en page d'accueil, permettant ainsi un accès direct aux nouveautés publiées.

Pour accompagner la promotion des nouvelles recommandations vaccinales, des outils didactiques sont créés chaque année, notamment sous forme de vidéos expliquant la recommandation et à qui elle se destine précisément. Début 2025, trois nouvelles vidéos ont ainsi été publiées sur le site : une vidéo sur la vaccination des nourrissons contre les méningocoques ACWY, une vidéo sur la vaccination des femmes enceintes contre les VRS, et une vidéo récapitulant les vaccinations recommandées aux femmes enceintes.



**VACCINATION
INFO SERVICE.FR**

ACTUALITÉS

Infections invasives à méningocoques : nouvelles recommandations de la HAS
19.03.2025

Chikungunya à La Réunion : la HAS recommande de vacciner les personnes à risque
05.03.2025

Recrudescence d'infections invasives à méningocoques
21.02.2025

[VOIR PLUS](#)



Pour promouvoir les sites VIS, Santé publique France met à disposition un dépliant d'information, une affiche et deux marques-page pour la promotion des deux espaces du site, disponibles sur le site de Santé publique France.



✓ Les outils pour les pro

La collection « Repères pour votre pratique » : ces dépliants synthétiques à destination des professionnels font le point sur des recommandations vaccinales spécifiques (ménigocoques B, rougeole, rotavirus, etc.).

Ces outils sont à retrouver sur le site de Santé publique France, certains sont disponibles à la commande.



✓ Les outils pour le grand public

Santé publique France possède un large éventail d'outils pour informer le grand public :

→ **Les dépliants d'information « 5 bonnes raisons de se faire vacciner »** répondent aux questions essentielles que peut se poser le grand public sur la plupart des vaccinations du calendrier vaccinal (rotavirus, coqueluche femmes enceintes, ménigocoque, etc).



Nouveauté

Dans un contexte de forte circulation de la rougeole, un dépliant « **5 bonnes raisons de se faire vacciner** » contre la rougeole pour les adolescents et adultes a été publié afin de rappeler l'importance de cette vaccination pour les adultes et ses modalités.



→ **La carte postale et l'affiche du calendrier vaccinal**, mis à jour tous les ans, permettent à chacun d'identifier les vaccinations indiquées ainsi que le schéma vaccinal préconisé selon son âge et/ou sa situation.

La carte postale est traduite en cinq langues chaque année (arabe, anglais, chinois, turc et espagnol), disponibles en téléchargement sur le site de Santé publique France.


Nouveauté

Les personnes de 65 ans et plus sont à risque de forme grave de plusieurs maladies à prévention vaccinale, aussi la mise à jour de leur statut vaccinal est particulièrement importante.

Pour accompagner les nouvelles recommandations vaccinales les concernant (pneumocoques, VRS, zona, grippe et Covid) une carte postale dédiée à la vaccination des seniors a été publiée cette année et est disponible en téléchargement.

Vaccination : êtes-vous à jour ?					2025
					calendrier simplifié des vaccinations 65 ans et plus
Personnes de 65 ans et plus					
	65 ans	75 ans	80 ans	85 ans	95 ans et +
DTP-Coqueluche	1 dose	1 dose		1 dose	1 dose
Pneumocoque				1 dose	
Grippe			1 dose par an		
Covid-19		1 dose par an		2 doses par an	
Zona			2 doses (à 2 mois d'intervalle)		
VRS	1 dose pour certaines maladies chroniques			1 dose	

→ **Le carnet de vaccination adolescents-adultes** est utile pour assurer le suivi de ses vaccinations et a été mis à jour cette année pour intégrer les nouvelles recommandations vaccinales (ex : méningocoques ACWY pour les adolescents).



→ **La brochure « Comprendre la vaccination »** répond simplement aux principales questions sur la vaccination et fait le point sur les maladies à prévention vaccinale.



- **Des affiches** permettent de communiquer sur divers sujets liés à la vaccination (vaccination en général, rougeole, etc.).



Nouveauté

Une nouvelle affiche destinée aux différents lieux de soins, informe le grand public de la possibilité de se faire vacciner par différents professionnels de santé. À commander [ici](#)

→ Des vidéos pédagogiques et des vidéos d'experts sont également disponibles sur le site vaccination-info-service.fr pour informer le grand public.


Retrouvez tous nos documents à la commande et en téléchargement sur le site internet de Santé publique France : [La vaccination – Santé publique France \(santepubliquefrance.fr\)](http://La vaccination – Santé publique France (santepubliquefrance.fr))

✓ Les outils pour les populations plus vulnérables

Dans un souci de réduction des inégalités sociales de santé, Santé publique France produit des documents plus simples et pédagogiques pour rendre les informations sur la vaccination accessible à tous.

De nombreux outils de cette collection « accessible » sont produits en fonction des actualités. Les outils plus pérennes sur la vaccination, disponibles en téléchargement et à la commande sur le site de Santé publique France, sont :

- **Le dépliant et l'affiche « Les vaccins à tous les âges »** qui présentent le schéma vaccinal actualisé sous forme d'une frise chronologique.
- **La brochure « Pour comprendre la vaccination »** qui permet de donner de nombreuses informations pour bien comprendre la vaccination à travers des textes courts et simples et des illustrations.



Des vidéos conçues spécialement pour ces publics sont mis à disposition des professionnels pour les accompagner dans la transmission d'informations et des vidéos en LSF (Langue des Signes Française) sur toutes les vaccinations sont également disponibles.

Tous les outils accessibles (documents et vidéos) de Santé publique France sont disponibles sur l'espace accessible du site : <https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous>

Sources de données

Les estimations de couvertures vaccinales s'appuient sur les données du datamart de consommation inter régimes (DCIR) – système national des données de santé (SNDS) et des enquêtes spécifiques.

Couvertures vaccinales estimées à partir du DCIR – SNDS : cette base regroupe les données individuelles de remboursement de vaccins des bénéficiaires des principaux régimes de l'assurance maladie. Les données de couvertures vaccinales sont calculées sur la base des proportions de bénéficiaires ayant un remboursement de vaccin. Les données de certains départements, pour lesquels la proportion de nourrissons bénéficiant de vaccins gratuits achetés par le conseil départemental est significative et entraîne un biais dans l'estimation, ne sont pas incluses dans les analyses. En raison de la forte proportion de personnes non affiliées à un régime d'assurance maladie à Mayotte, le DCIR ne permet pas d'obtenir des estimations de couverture vaccinale fiables dans ce département.

Pour en savoir plus

- Données épidémiologiques sur la rougeole : [lien](#)
- Données épidémiologiques sur les IIM : [lien](#)
- Données de couvertures vaccinales : [lien](#), lien vers l'outil Odissé : [lien](#)
- Le site de référence sur les vaccinations avec son espace grand-public et professionnel : [vaccination-info-service.fr](#)

Remerciements

À l'agence régionale de santé de Corse.

À l'ensemble des partenaires de Santé publique France en Corse.

Comité de rédaction

Équipe de rédaction :

Stéphane ÉROUART, Bertrand GAGNIÈRE, Gaëlle GAULT, Sandrine GAUTIER, Guillaume HEUZÉ, Virginie de LAUZUN, Pascaline LOURY, direction des régions

Laure FONTENEAU, Rémi HANGUEHARD, Isabelle PARENT du CHATELET, Sophie VAUX, direction des maladies infectieuses

Oriane NASSANY, Sandrine RANDRIAMAMPIANINA, direction de la prévention et de la promotion de la santé

Référent en région :

Guillaume HEUZÉ

Pour nous citer : Bulletin vaccination. Édition Corse. Avril 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 25 pages, 2025. Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 28 avril 2025

Contact : paca.corse@santepubliquefrance.fr