

## Pays de la Loire

Semaines 35-37 (du 25 août au 14 septembre 2025)

# Point Epidémiologique

## SOMMAIRE

Tendances de la semaine	1
Actualités	1
Indicateurs clés	2
Asthme et rhinopharyngite chez les moins de 15 ans	3
Covid-19	4
Cas groupés d'IRA dans les établissements médico-sociaux	5
Arboviroses	6
Mortalité	7
Infection invasive à méningocoque	8
Hépatite A, Legionellose	9
Diphthérie, Rougeole, Foyer de Tiac	10
Sources et méthodes	11

## Tendances de la semaine

### Asthme et rhinopharyngite chez les moins de 15 ans

Indicateurs en hausse. Niveaux modérés à élevés.

### Covid-19

Indicateurs en hausse. Niveaux faibles.

### Hépatite A aiguë

Indicateurs en hausse en Loire-Atlantique (cf. page 9 de ce bulletin).

## Actualités

- **PestiRiv** : [résultats de l'étude nationale sur l'exposition aux pesticides des riverains de zones viticoles](#)
- **Asthme chez les enfants** : [attention à la rentrée scolaire](#)
- **Rougeole en France** : [bulletin national du 1<sup>er</sup> janvier au 31 août](#)
- **Canicule et santé** : [excès de mortalité – bulletin national du 11 septembre](#)

## Indicateurs clés

	S36	S37
<b>Asthme chez les moins de 15 ans</b>		
<b>Recours aux soins (surveillance syndromique)</b>		
Actes SOS Médecins (part d'activité codée)	18 (2,2%)	46 (4,9%)
Passages aux urgences (part d'activité codée)	47 (2,0%)	114 (4,3%)
<b>Rhinopharyngite chez les moins de 15 ans</b>		
<b>Recours aux soins (surveillance syndromique)</b>		
Actes SOS Médecins (part d'activité codée)	106 (12,9%)	179 (18,9%)
<b>Covid-19</b>		
<b>Recours aux soins (surveillance syndromique)</b>		
Actes SOS Médecins (part d'activité codée)	35 (0,9%)	75 (1,9%)
Passages aux urgences (part d'activité codée)	28 (0,2%)	58 (0,4%)

## Asthme et rhinopharyngite chez les moins de 15 ans


Les recours aux soins (actes SOS Médecins et passages aux urgences) pour crises d'asthme et rhinopharyngite chez les enfants âgés de moins de 15 ans étaient en nette hausse en S36, à des niveaux comparables à ceux observés les années précédentes à la même période. Une tendance identique est observée en France métropolitaine.

Chaque année, au cours des deux semaines qui suivent la rentrée scolaire, ces hausses d'activité sont observées chez les enfants âgés de moins de 15 ans. Ceci est lié à la recrudescence des épisodes d'infections virales respiratoires lors de la reprise de la vie en collectivité après les vacances scolaires d'été. D'autres facteurs, comme l'exposition à des allergènes à l'école ou l'arrêt du traitement de fond de l'asthme pendant les vacances, pourraient également jouer un rôle.

Le traitement de l'asthme chez l'enfant s'inscrit dans une démarche globale associant une éducation thérapeutique de l'enfant et de son entourage. Le traitement de fond de l'asthme permet d'éviter la survenue des exacerbations les plus sévères, notamment celles nécessitant l'hospitalisation.


Des recommandations pour les parents d'élèves sont disponibles [sur le site de l'Assurance Maladie](#) afin de réduire le risque de crises d'asthme en période de rentrée scolaire.

**Nombre et part de diagnostics de crises d'asthme parmi les actes SOS Médecins, chez les moins de 15 ans, Pays de la Loire**




Source : SOS Médecins – SurSaUD®

**Nombre et part de diagnostics de crises d'asthme parmi les passages aux urgences, chez les moins de 15 ans, Pays de la Loire**



Source : réseau OSCOUR® – SurSaUD®

**Nombre et part de diagnostics pour rhinopharyngite parmi les actes SOS Médecins, chez les moins de 15 ans, Pays de la Loire**




Source : SOS Médecins – SurSaUD®

## Covid-19


Une hausse des recours aux soins (actes SOS Médecins et passages aux urgences) pour Covid-19 a été observée en S37, avec un doublement du nombre de recours aux soins par rapport à S36, tout en restant à un niveau d'activité faible.

**Nombre et part de diagnostics syndromiques de Covid-19 parmi les actes SOS Médecins, population tous âges, Pays de la Loire**



Source : SOS Médecins – SurSaUD®

**Nombre et part de diagnostics syndromiques de Covid-19 parmi les passages aux urgences, population tous âges, Pays de la Loire**



Source : réseau OSCOUR® – SurSaUD®


### Pour en savoir plus...

Prévention de la Covid-19 : des gestes et comportements individuels ou collectifs sont à appliquer dès qu'on présente un signe clinique d'infection respiratoire pour protéger son entourage mais aussi toute l'année pour prévenir une infection. Ces mesures barrières sont complémentaires de la vaccination et sont à renforcer au cours des vagues épidémiques de Covid-19. Plus d'informations sur le site de [Santé publique France](https://www.santepubliquefrance.fr).

## Cas groupés d'IRA dans les établissements médico-sociaux

Une légère hausse des cas groupés d'IRA en EMS a été observée en S36 (données S37 non consolidées). Ces épisodes étaient en majorité dus à la Covid-19.

**Nombre de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA) signalés par les établissements médico-sociaux (EMS), total et par étiologie faisant partie des étiologies retenues, par semaine de survenue des premiers symptômes, signalés depuis le 03/07/2023, Pays de la Loire**



**Indicateurs cumulés pour l'ensemble des épisodes de cas groupés d'IRA en EMS signalés et pour les épisodes clôturés uniquement, pour les signalements depuis le 30/09/2024, Pays de la Loire**

	Foyers dont l'unique étiologie retenue est :			
	Total	Covid-19	Grippe	VRS
<b>Tous signalements (ouverts et clôturés)</b>				
Nombre de foyers signalés	356	89	116	19
Nombre de malades parmi les résidents	4 923	883	1 621	357
Nombre de malades parmi le personnel	1 002	223	418	36
Nombre d'hospitalisations (résidents et personnel)	226	12	88	16
Nombre de décès (résidents et personnel)	229	12	116	12
<b>Signalements clôturés uniquement</b>				
Nombre de foyers clôturés	256	55	89	15
Médiane du taux d'attaque chez les résidents	20,5%	15,2%	20,0%	22,6%
Médiane du taux d'hospitalisation chez les résidents	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%
Médiane du taux de létalité chez les résidents	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%

Source : Portail de signalement des événements sanitaires indésirables

## Arboviroses

Depuis le 1<sup>er</sup> mai 2025 : 41 cas importés de dengue, 63 cas importés de chikungunya et 1 cas importé de Zika ont été déclarés dans les Pays de la Loire.

Aucun cas autochtone n'a été détecté dans les Pays de la Loire.

**Nombre de cas de dengue, chikungunya et Zika détectés en Pays de la Loire depuis le 1<sup>er</sup> mai 2025, population tous âges, Pays de la Loire**

Département	Cas importés			Cas autochtones
	dengue	chik.	Zika	
44 - Loire-Atlantique	<b>24</b>	<b>32</b>	0	0
49 - Maine-et-Loire	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	0
53 - Mayenne	0	<b>4</b>	0	0
72 - Sarthe	<b>2</b>	<b>6</b>	0	0
85 - Vendée	<b>9</b>	<b>6</b>	0	0
<b>Total Pays de la Loire</b>	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	0

Source : Voozarbo, données au 17 sept. 2025

Source : Voozarbo

### Pour en savoir plus...

La dengue, le chikungunya et le Zika sont des maladies à déclaration obligatoire (DO) en France métropolitaine, tout cas biologiquement confirmé doit être signalé sans délai à l'Agence Régionale de Santé.


Du 1<sup>er</sup> mai au 30 novembre, période d'activité du moustique *Aedes albopictus*, un système de surveillance renforcée est mis en place sur tout le territoire métropolitain pour éviter la survenue de foyers de transmission autochtone. Chaque cas signalé déclenche une investigation épidémiologique et entomologique afin de déterminer le statut importé ou autochtone du cas, investiguer la présence du moustique tigre sur les lieux fréquentés par le cas pendant sa période de virémie et, le cas échéant, mener des actions de lutte anti-vectorielle (destruction des gîtes larvaires, traitements adulticides et larvicides).

Plus d'informations sur le site de [Santé publique France](#).

## Mortalité


La mortalité toutes causes restait, ces dernières semaines, dans les valeurs attendues pour tous âges et pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

### Nombre hebdomadaire de décès toutes causes, tous âges, 2019-2025 (jusqu'à la semaine S-2), Pays de la Loire



Source : Insee – SurSaUD®

### Nombre hebdomadaire de décès toutes causes chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, 2019-2025 (jusqu'à la semaine S-2), Pays de la Loire




Source : Insee – SurSaUD®


## Infection invasive à méningocoque

### Maladie à Déclaration Obligatoire


Nombre annuel de cas d'infection invasive à méningocoque domiciliés dans les Pays de la Loire, selon le sérogroupe, depuis 2008



Nombre mensuel de cas d'infection invasive à méningocoque domiciliés dans les Pays de la Loire, selon le sérogroupe, depuis juillet 2021 (jusqu'au dernier mois complet)



Répartition par classe d'âge des cas domiciliés dans les Pays de la Loire survenus sur les douze derniers mois, selon le sérogroupe




## Hépatite A, Légionellose

### Maladie à déclaration obligatoire

Nombre de cas déclarés domiciliés dans les Pays de la Loire, par mois de prélèvement sérologique et par département, depuis juillet 2021 (jusqu'au dernier mois complet)


#### Hépatite A



Une recrudescence de cas d'hépatite A aiguë est observée en Loire-Atlantique depuis le printemps 2025. La majorité des cas déclarés en juin et juillet sont en lien avec deux types de populations vivant dans des conditions d'hygiène précaires, sur le secteur de Nantes métropole. Les cas déclarés depuis sont majoritairement en population générale.

Mesures préventives : [https://santebd.org/wp-content/uploads/2021/04/poster\\_mains\\_propres.jpg](https://santebd.org/wp-content/uploads/2021/04/poster_mains_propres.jpg)

#### Légionellose




## Diphthérie, Rougeole, Foyer de Tiac

### Maladie à déclaration obligatoire


Nombre de cas déclarés domiciliés dans les Pays de la Loire, par mois de prélèvement sérologique et par département, depuis juillet 2021 (jusqu'au dernier mois complet)

#### Diphthérie




Données provisoires Santé publique France – ARS Pays de la Loire

#### Rougeole



Données provisoires Santé publique France – ARS Pays de la Loire

#### Foyer de Toxi-infection alimentaire collective (foyer de Tiac)



Données provisoires Santé publique France – ARS Pays de la Loire

## Sources et méthodes

**Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès).** Ce système de surveillance sanitaire dit syndromique a vu le jour en 2004 et est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé.

- **Les données des associations SOS Médecins de Nantes et de Saint-Nazaire** : chaque acte médical (visite à domicile et consultation) fait l'objet d'un envoi de données à Santé publique France. Le taux de codage des diagnostics médicaux pour les deux associations SOS Médecins de la région est supérieur à 95 %.
- **Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers** (Oscour® - Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) : chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi de données à Santé publique France sous forme de Résumé de Passages aux Urgences (RPU). Dans la région, tous les établissements hospitaliers avec services d'urgences participent au réseau Oscour®, avec un taux de codage des diagnostics d'environ 80 % en 2024, variant de 37 % en Mayenne à 95 % en Vendée.
- **La mortalité « toutes causes »** est suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'Etat-civil dans les communes informatisées de la région (soit 376 communes en Pays de la Loire qui représentent environ 85 % de la mortalité régionale) : un projet européen de surveillance de la mortalité, baptisé Euromomo (<http://www.euromomo.eu>), permet d'assurer un suivi de la mortalité en temps réel et de coordonner une analyse normalisée afin que les signaux entre les pays soient comparables. Les données proviennent des services d'état-civil et nécessitent un délai de consolidation de 2 à 3 semaines. Ce modèle permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés pendant les saisons estivales et hivernales. Ces « excès » sont variables selon les saisons et sont à mettre en regard de ceux calculés les années précédentes.

**Infections respiratoires aiguës (IRA) dans les établissements médico-sociaux (EMS).** Les cas groupés d'IRA (incluant la Covid-19), qui correspondent à un minimum de 3 résidents malades en 4 jours, sont signalés par les EMS via le Portail de signalement des événements sanitaires indésirables du Ministère de la Santé et de la Prévention. Le dispositif de signalement a été déployé le 20 juin 2023.

**Arboviroses.** Les données épidémiologiques sont recueillies via Voozarbo.

**Maladies à déclaration obligatoire.** Le dispositif de surveillance des maladies dites à déclaration obligatoire repose sur la transmission de données par les médecins et les biologistes (libéraux et hospitaliers) aux personnels compétents des Agences régionales de santé ; et/ou aux épidémiologistes de Santé publique France. L'objectif est de détecter et de déclarer les 38 maladies à déclaration obligatoire pour agir et prévenir les risques d'épidémie et analyser l'évolution dans le temps de ces maladies et adapter les politiques de santé publique aux besoins de la population. En savoir + [santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire](https://santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire)

Pour en savoir plus, consulter le site de [Santé publique France](https://santepubliquefrance.fr).

### Consulter les indicateurs en open data :

- Retrouver l'observatoire cartographique de Santé publique France [Odissé](https://odisse.santepubliquefrance.fr)

## Équipe de rédaction

**Rédactrice en chef :** Lisa King, responsable de Santé publique France Pays de la Loire

Noémie Fortin,  
Anne-Hélène Liébert,  
Sophie Hervé,  
Ronan Ollivier,  
Delphine Barataud,  
Pascaline Loury,  
Florence Kermarec,  
Aymeric Cadic

## Partenaires

Santé publique France Pays de la Loire remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire
- l'Observatoire régional des urgences (ORU) des Pays de la Loire
- le Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (Cpias)
- l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- les associations SOS Médecins de Nantes et de Saint-Nazaire
- les services d'urgences (réseau Oscour®)
- les services de réanimation
- les médecins libéraux
- les établissements médico-sociaux (EMS)
- les laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, notamment les laboratoires de virologie des CHU de Nantes et d'Angers
- le laboratoire Inovalys

**Pour nous citer :** Bulletin Point Épidémiologique. Édition Pays de la Loire. Septembre 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 12 pages, 2025. Directrice de publication : Caroline Semaille

**Dépôt légal :** 18/09/2024

**Contact :** [paysdelaloire@santepubliquefrance.fr](mailto:paysdelaloire@santepubliquefrance.fr)