

Infections respiratoires aiguës

Semaine 42 (13 au 19 octobre 2025). Publication : 22 octobre 2025

ÉDITION NATIONALE

Tendances de la semaine

Infections respiratoires aiguës (IRA). Activité globalement stable en ville et à l'hôpital.

Grippe. Ensemble des indicateurs à leur niveau de base dans toutes les régions. Fin de l'épidémie à La Réunion (S41).

Bronchiolite. Indicateurs stables et à leur niveau de base dans la majorité des régions. Régions Ile-de-France et Normandie en pré-épidémie. Détection de rhinovirus susceptibles d'induire des bronchiolites dans l'Hexagone.


COVID-19. Activité syndromique en diminution en ville et globalement stable à l'hôpital. Indicateurs virologiques et dans les eaux usées en baisse.

Indicateurs clés


Indicateurs syndromiques

Part de la pathologie parmi	IRA basses		Syndrome grippal		Bronchiolite (moins d'un an)		COVID-19	
	S42	S42 vs S41	S42	S42 vs S41	S42	S42 vs S41	S42	S42 vs S41
Actes médicaux SOS Médecins	11,9%	-1,1 pt	4,1%	-0,1 pt	5,6%	-0,8 pt	1,9%	-0,7 pt
Passages aux urgences (OSCOUR®)	2,7%	-0,1 pt	0,2%	0 pt	10,2%	+0,5 pt	0,4%	-0,1 pt
Hospitalisations après passage aux urgences (OSCOUR®)	5,9%	-0,2 pt	0,2%	0 pt	16,5%	-0,7 pt	0,9%	-0,2 pt

Niveau d'alerte régional*
Grippe^{1,2,3} Bronchiolite^{1,2}




Taux de passages aux urgences**
COVID-19¹



* Méthodologie en [annexe](#). Antilles : niveau d'alerte pour S41. ** Données non disponibles pour Mayotte.
Source : ¹ réseau OSCOUR®, ² SOS Médecins, ³ réseau Sentinelles


Retrouvez la situation épidémiologique de chaque région dans les [bulletins régionaux](#) de Santé publique France.

Part des syndromes grippaux parmi les actes SOS Médecins




Source : SOS Médecins

Part de la bronchiolite parmi les actes SOS Médecins chez les enfants de moins de 1 an



Source : SOS Médecins

Part des suspicions de COVID-19 parmi les actes SOS Médecins



Source : SOS Médecins

Indicateurs virologiques

	Virus grippaux		VRS		SARS-CoV-2	
	S42	S42 vs S41	S42	S42 vs S41	S42	S42 vs S41
Taux de positivité des prélèvements						
Laboratoires de ville ^{1,2}	1,9%	+0,4 pt	0,3%	0 pt	17,7%	-2,3 pt
Médecine de ville ^{1,3*}	1,3%	-0,4 pt	1,3%	+0,2 pt	20,6%	-3,2 pt
Milieu hospitalier ^{1,4}	0,9%	+0,3 pt	1,2%	+0,1 pt	8,0%	-4,0 pt
Surveillance dans les eaux usées ^{5**}					1 812	-32,5%

Source : ¹ CNR-VIR, ² réseau RELAB, ³ réseau Sentinelles, SOS Médecins, DUMG Rouen et Côte d'Azur, ⁴ réseau RENAL, ⁵ SUM'Eau

* Prélèvements réalisés chez des patients consultant pour une IRA

** Ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur concentration en azote ammoniacal. Méthodologie en [annexe](#)

Retrouvez la situation épidémiologique en médecine de ville dans le bulletin du [réseau Sentinelles](#).

Point de situation

En semaine 42, les indicateurs infections respiratoires aiguës (IRA) étaient globalement stables en ville et à l'hôpital. D'après les données virologiques en ville et à l'hôpital, l'activité pour IRA est toujours portée principalement par les rhinovirus et le SARS-CoV-2. Le taux de positivité pour les rhinovirus était de 37,7% en médecine de ville et de 23,7% à l'hôpital.

Les indicateurs syndromiques de COVID-19 diminuaient en ville et restaient globalement stables à l'hôpital à des niveaux inférieurs à ceux de l'année précédente à la même période, mais avec des disparités selon les classes d'âge. La part des hospitalisations après passage aux urgences diminuait chez les 65 ans et plus. Le taux de positivité pour SARS-CoV-2 était en diminution en ville et à l'hôpital avec des disparités selon la région. L'indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées était en forte diminution cette semaine. La part des décès de COVID-19 certifiés électroniquement était stable par rapport à la semaine précédente.

Les indicateurs syndromiques liés à la bronchiolite se stabilisaient en ville ainsi qu'à l'hôpital, en restant à des niveaux proches de la saison précédente à la même période. Ils étaient à leur niveau de base dans la majorité des régions. L'Île-de-France et la Normandie restaient en pré-épidémie. Dans les départements et régions d'outre-mer, les indicateurs de la bronchiolite étaient à leur niveau de base. Le taux de détection du VRS (virus respiratoire syncytial) dans les prélèvements nasopharyngés tous âges à l'hôpital était à un niveau de base. D'autres virus susceptibles d'induire des bronchiolites circulent dans l'Hexagone, notamment des rhinovirus.

Les indicateurs de la grippe étaient à leur niveau de base dans toutes les régions de l'Hexagone avec toutefois quelques détections de cas sporadiques comme habituellement observé à cette période de l'année. La situation était identique dans les régions d'outre-mer. À La Réunion, l'épidémie de grippe s'est terminée en semaine 41.

Le nombre de nouveaux épisodes d'IRA dans les Établissements médico-sociaux (EMS) tendait à diminuer mi-octobre, à un niveau proche de l'année précédente après plusieurs semaines d'augmentation en septembre. La grande majorité des épisodes était attribuée exclusivement à la COVID-19.


La campagne de vaccination contre la grippe et contre la COVID-19 a débuté le 14 octobre 2025. Elle cible toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes à risque de forme grave, les femmes enceintes, les résidents en Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (Unité de soins de longue durée), ainsi que les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l'infection, y compris les professionnels de santé.

La campagne d'immunisation des nouveau-nés contre les infections à VRS a débuté le 1^{er} septembre 2025 à l'exception de la Guyane où elle a débuté le 1^{er} août 2025. Deux stratégies sont possibles : soit la vaccination de la femme enceinte pour protéger le nouveau-né ou le nourrisson de moins de 6 mois soit l'immunisation active des nourrissons par un anticorps monoclonal.

Médecine de ville

En semaine 42, le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 195 cas pour 100 000 habitants [IC95% : 187 -204] (données non consolidées) vs 197 [189-205] en S41.


Estimation de l'incidence des cas d'IRA vus en consultation de médecine générale*



Source : réseau Sentinelles, IQVIA ; * Données IQVIA non disponibles depuis S01-2025


En semaine 42, 10 594 actes SOS Médecins correspondant à une IRA basse ont été enregistrés, soit 11,9% de l'ensemble des actes (vs 13,0% en S41). Le nombre d'actes médicaux pour syndrome grippal était de 3 632, soit 4,1% (vs 4,2% en S41). Un total de 151 actes pour bronchiolite a été enregistré chez les moins d'un an, soit 5,6% (vs 6,4% en S41) de l'ensemble des actes dans cette classe d'âge. Le nombre d'actes pour suspicion de COVID-19 était de 1 666, soit 1,9% des actes SOS Médecins (vs 2,6% en S41).

Part des IRA basses* parmi les actes SOS Médecins



Source : SOS Médecins. * Méthodologie en [annexe](#)

Part des syndromes grippaux, des suspicions de COVID-19 (tous âges) et de la bronchiolite (chez les moins de 1 an) parmi les actes SOS Médecins




Source : SOS Médecins

Grippe

En semaine 42, le taux de consultations tous âges confondus pour syndrome grippal estimé à partir des données du réseau Sentinelles et IQVIA était de 104 pour 100 000 habitants [IC95% : 98-111] (données non consolidées) vs 113 pour 100 000 habitants [106-119] en S41.


En semaine 42, la part d'activité pour grippe/syndrome grippal SOS Médecins était en niveau de base tous âges confondus et dans toutes les classes d'âge.

Consultations pour syndrome grippal : pourcentage parmi les actes SOS Médecins et taux de consultations pour 100 000 habitants (réseau Sentinelles, IQVIA*)




Source : réseau Sentinelles, IQVIA, SOS Médecins ; * Données IQVIA non disponibles depuis S01-2025

Part des syndromes grippaux parmi les consultations SOS Médecins, selon le niveau d'intensité* pour cet indicateur



Source : SOS Médecins. * Méthodologie en annexe

Part des syndromes grippaux parmi les actes SOS Médecins




Source : SOS Médecins

Bronchiolite

En semaine 42, parmi les 2 692 actes médicaux SOS Médecins réalisés pour des enfants de moins de 1 an, 151 actes (5,6%) étaient liés à la bronchiolite.


La part de la bronchiolite parmi les consultations SOS Médecins se stabilisait et restait à un niveau de base en semaine 42 en médecine de ville.

Part de la bronchiolite parmi les actes SOS Médecins chez les enfants de moins de 1 an



Source : SOS Médecins

Part de la bronchiolite parmi les consultations SOS Médecins chez les moins de 1 an, selon le niveau d'intensité* pour cet indicateur




Source : SOS Médecins. * Méthodologie en [annexe](#)

COVID-19

En semaine 42, parmi les patients vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë, le taux d'incidence des cas de COVID-19 a été estimé à 28 cas pour 100 000 habitants [IC95% : 22-34] (données non consolidées) vs 40 [34-45] en S41.

La part des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 étaient en diminution dans toutes les classes d'âge, excepté chez les 0-4 ans où elle restait stable (82 actes, soit 0,5% vs 0,5% en S41). Chez les 65 ans et plus, 204 actes ont été enregistrés, soit 2,0% (vs 2,7% en S41), 1 233 actes chez les 15-64 ans, soit 2,4% (vs 3,4% en S41), et 145 actes chez les 5-14 ans, soit 1,3% (vs 1,6% en S41).

Part des suspicions de COVID-19 parmi les actes SOS Médecins



Source : SOS Médecins

Milieu hospitalier


En semaine 42, 9 864 passages aux urgences pour IRA basse ont été enregistrés, soit 2,7% de l'ensemble des passages tous âges (vs 2,7% en S41). Le nombre d'hospitalisations après passage pour IRA basse était de 4 310, soit 5,9% de l'ensemble des hospitalisations tous âges (vs 6,1% en S41). La part des IRA parmi les passages aux urgences était à un niveau modéré tous âges confondus.

Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était de 876, soit 0,2% des passages (vs 0,2% en S41). Le nombre d'hospitalisations après passage pour syndrome grippal était de 126, soit 0,2% de l'ensemble des hospitalisations (vs 0,1% en S41).

Chez les moins d'un an, 1 265 passages aux urgences pour bronchiolite ont été enregistrés, soit 10,2% des passages dans cette classe d'âge (vs 9,7% en S41). Le nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite était de 340, soit 16,5% des hospitalisations dans cette classe d'âge (vs 17,3% en S41).

En semaine 42, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 était de 1 504, soit 0,4% de l'ensemble des passages (vs 0,5% en S41). Le nombre d'hospitalisations après passage pour suspicion de COVID-19 était de 655, soit 0,9% de l'ensemble des hospitalisations (vs 1,1% en S41).


Part des IRA basses parmi les passages aux urgences



Grippe


En semaine 42, la part de la grippe parmi les hospitalisations après passage aux urgences était à un niveau de base tous âges confondus et dans toutes les classes d'âge.

Part de la grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations après passage aux urgences



Source : réseau OSCOUR®

Part de la grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations après passage aux urgences, selon le niveau d'intensité pour cet indicateur*



Source : réseau OSCOUR®. * Méthodologie en [annexe](#)

Bronchiolite


En semaine 42, chez les moins de 1 an, la bronchiolite concernait 10,2% des passages aux urgences et 16,5% des hospitalisations dans cette classe d'âge.

Parmi les 1 265 enfants de moins de 1 an vus aux urgences pour bronchiolite en semaine 42, 340 (26,9%) ont été hospitalisés.

La part de la bronchiolite parmi les hospitalisations après passage aux urgences se stabilisait et restait encore à un niveau de base en semaine 42.


Part de la bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an

Passages aux urgences



Source : réseau OSCOUR®


Hospitalisations après passage



Source : réseau OSCOUR®

Une analyse détaillée chez les moins d'un an est disponible [ici](#).

Part de la bronchiolite parmi les hospitalisations après passage aux urgences chez les moins de 1 an, selon le niveau d'intensité pour cet indicateur*




Source : réseau OSCOUR®. * Méthodologie en [annexe](#)

COVID-19

La part des hospitalisations après passage aux urgences pour COVID-19/suspicion de COVID-19 se stabilisait dans toutes les classes d'âge, excepté chez les 65 ans et plus où elle diminuait (550 hospitalisations, soit 1,5% vs 1,8% en S41). Chez les 15-64 ans, 73 hospitalisations ont été enregistrées, soit 0,3% (vs 0,3% en S41), une hospitalisation a été enregistrée chez les 5-14 ans, soit 0,0% (vs 0,1% en S41) et 31 hospitalisations ont été enregistrées chez les 0-4 ans, soit 0,7% (vs 0,7% en S41).

Parmi les hospitalisations en service de réanimation après passage aux urgences, 13 l'ont été pour COVID-19/suspicion de COVID-19 en S42, soit 0,5% (vs 0,4% en S41).

Part de la COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations après passage aux urgences




Établissements médico-sociaux

Depuis la semaine 40, 539 épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA) sont survenus dans les établissements médico-sociaux (EMS) et ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention*, dont 497 (92%) épisodes survenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Parmi l'ensemble des épisodes d'IRA survenus en EMS, 514 (95%) ont fait l'objet d'une recherche étiologique, parmi lesquels 430 (84%) étaient exclusivement attribués à la COVID-19, 41 (8%) exclusivement à la grippe et 2 exclusivement au VRS. Le VRS était seul ou associé à un autre pathogène dans 8 épisodes (2%). Le nombre hebdomadaire de clusters observés dans les EMS tendait à diminuer après 4 semaines consécutives d'augmentation et une semaine de stabilisation. Les données des dernières semaines ne sont pas consolidées.

Un total de 192 nouveaux épisodes de cas groupés d'IRA sont survenus en semaine 41 (données non consolidées) vs 270 en S40. Parmi eux, un épisode était attribué exclusivement à la grippe (vs 2 en S40), un était attribué exclusivement à une infection à VRS (vs 1 en S40) et 152 étaient attribués exclusivement à la COVID-19 (vs 215 en S40).

Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA dans les établissements médico-sociaux



S42 et S41 : données non consolidées

* Portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère de la Santé et de la Prévention (<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>)


Surveillance virologique

En semaine 42, le taux de positivité des prélèvements réalisés en ville par les laboratoires de biologie médicale (réseau RELAB) était de 1,9% (138/7 201) pour les virus grippaux (vs 1,5% en S41), 0,3% (23/7 198) pour le VRS (vs 0,3% en S41), 17,7% (1 275/7 200) pour le SARS-CoV-2 (vs 20,0% en S41).

Le taux de positivité des prélèvements réalisés en ville par les médecins des réseaux Sentinelles, SOS Médecins et DUMG Rouen et Côte d'Azur était de 1,3% (2/155) pour les virus grippaux (vs 1,7% en S41), 1,3% (2/155) pour le VRS (vs 1,1% en S41), 20,6% (32/155) pour le SARS-CoV-2 (vs 23,9% en S41) et 37,7% (58/154) pour le rhinovirus (vs 32,4% en S41).

Le taux de positivité des prélèvements réalisés en milieu hospitalier (réseau RENAL) était de 0,9% (79/8 342) pour les virus grippaux (vs 0,6% en S41), 1,2% (94/7 626) pour le VRS (vs 1,2% en S41), 8,0% (916/11 462) pour le SARS-CoV-2 (vs 12,0% en S41) et 23,4% (1 052/4 488) pour le rhinovirus (vs 23,7% en S41).


Taux de positivité pour différents virus respiratoires des prélèvements réalisés en France hexagonale



Source : réseau RELAB, CNR-VIR

Source : réseau Sentinelles, SOS Médecins, DUMG Rouen et Côte d'Azur, CNR-VIR. Reprise des analyses en S40.

Hôpital



Source : réseau RENAL, CNR-VIR


Virus grippaux

En semaine 42, les taux de positivité en médecine de ville (1,3%) et à l'hôpital (0,9%) étaient faibles, se situant à des niveaux habituellement observés à cette période de l'année.


Depuis la semaine 40, en médecine de ville, sur les 463 prélèvements analysés, 8 se sont avérés positifs pour la grippe (taux de positivité 1,7%) : 7A(H1N1)_{pdm09}, 1A(H3N2).

À l'hôpital (réseau RENAL/CNR), parmi les 26 730 prélèvements testés depuis la semaine 40, 207 se sont avérés positifs pour un virus grippal (0,8%), une majorité de virus de type A : 171 virus de type A non sous-typés, 20(H1N1)_{pdm09}, 12A(H3N2) et 4 virus B.

Taux de positivité pour grippe des prélèvements réalisés en France hexagonale



Distribution des types et sous-types de virus grippaux des prélèvements réalisés en France hexagonale




Pour plus d'informations sur les données virologiques issues du réseau RENAL de laboratoires hospitaliers et du réseau RELAB de laboratoires de biologie médicale, consultez [le bulletin hebdomadaire du Centre national de référence Virus des infections respiratoires](#)

VRS


En semaine 42, parmi les 155 prélèvements naso-pharyngés ou salivaires réalisés en ville pour le VRS, 2 (1,3%) étaient positifs pour le VRS. Parmi les 7 626 prélèvements naso-pharyngés réalisés à l'hôpital, 94 (1,2%) étaient positifs pour le VRS.

Taux de positivité* pour VRS des prélèvements réalisés en France hexagonale

Médecine de ville



Hôpital




Source : réseau Sentinelles, SOS Médecins, DUMG Rouen et Côte d'Azur, CNR-VIR

* Prélèvements tous âges. Les proportions sont rapportées aux nombres de prélèvements pour lesquels le pathogène a été testé, tous symptômes confondus

SARS-CoV-2

En semaine 42, le taux de positivité des prélèvements réalisés en milieu hospitalier (réseau RENAL) était de 8,0% (916/11 462) pour le SARS-CoV-2 (vs 12,0% en S41).

Taux de positivité pour le SARS-CoV-2 des prélèvements réalisés à l'hôpital en France hexagonale




Source : réseau RENAL, CNR-VIR

Surveillance dans les eaux usées

En semaine 42, une très nette diminution (-32,5%) du niveau de circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées était observée à l'échelle nationale, avec des données exploitables pour l'ensemble des 54 stations suivies.

Moyenne des indicateurs de surveillance des eaux usées pondérée par la taille de population raccordée aux différents sites surveillés




Source : SUM'Eau. Indicateur eaux usées : ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur concentration en azote ammoniacal (Méthodologie en [annexe](#))

Surveillance génomique

Dans l'Hexagone, en septembre, le lignage XFG (recombinant LF.7/LP.8.1.2) est le plus fréquemment détecté, avec une proportion de 45,2% (602/1 332) sans ses sous-lignages, suivi de XFG.3 avec une proportion de 29,3% (390/1 332), puis de NB.1.8.1 (descendant de XDV) avec une proportion de 11,9% (159/1 332) et devant XFG.3.1 qui représentait 4,2% (56/1 332) des séquences détectées.

Au total, sur le dernier mois analysé, les lignages XFG et NB.1.8.1 accompagnés de l'ensemble de leurs sous lignages (incluant ceux présents à plus de 5% sur la figure), représentaient respectivement 78,7% (1 048/1 332) et 11,9% (159/1 332) de l'ensemble des séquences détectées dans l'Hexagone.

Le graphique représente pour chaque mois les pourcentages des variants SARS-CoV-2 détectés en France hexagonale d'après les données déposées sur la base de données Emergen. Les lignages représentant moins de 5% des variants détectés sont inclus dans le lignage parental ou dans « XXX_Autres ». Le nombre de séquences disponibles pour chaque mois est indiqué au-dessus de l'histogramme. Données produites par le CNR-VIR en s'appuyant notamment sur le réseau RELAB. Le graphique des variants SARS-CoV-2 est mis à jour une fois par mois (troisième semaine du mois), sauf évolution particulière.



Source : CNR-VIR


Mortalité

Certification électronique

En semaine 42, parmi les 6 951 décès déclarés par certificat électronique, 0,2% l'ont été avec une mention de grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès (vs 0,1% en S41). La COVID-19 était mentionnée dans 2,3% des décès (160 décès vs 165 décès, soit 2,4% en S41).

En progression, le déploiement du dispositif de certification électronique recouvrait, fin 2024, 50% de la mortalité nationale, variant de 25% (Bourgogne-Franche-Comté) à 67% (Auvergne-Rhône-Alpes) selon les régions de l'Hexagone. La part des décès certifiés électroniquement est également hétérogène selon le type de lieu de décès (environ 70% des décès survenant en établissements hospitaliers, près de 34% en Ehpad et 15% à domicile).

Part des décès avec une mention de grippe et COVID-19 parmi l'ensemble des décès certifiés par voie électronique




Source : Inserm-CépiDc ; Traitement : Santé publique France

Mortalité toutes causes

Au niveau national, le nombre de décès toutes causes confondues transmis par l'Insee était dans les marges de fluctuation habituelle dans toutes les classes d'âge jusqu'en S41.

Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, tous âges, 2018 à 2025 (jusqu'en semaine 41)



Source des données : Insee. Traitement : Santé publique France (Dernière semaine incomplète)

Prévention

Vaccination contre la grippe

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année, à l'automne, pour :

- les personnes de 65 ans et plus,
- les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse ;
- les personnes âgées de plus de 6 mois atteintes de comorbidité à risque élevé de forme grave de la maladie (incluant notamment : asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), emphysème, cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque, maladie des valves cardiaques, troubles du rythme cardiaque, maladie des artères du cœur, angine de poitrine, antécédent d'accident vasculaire cérébral (AVC), d'infarctus ou de pontage ; formes graves des affections neurologiques et musculaires, néphropathie (atteinte du rein) chronique grave, personnes en dialyse, diabète, obésité, les personnes immunodéprimées ...);
- les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l'infection, y compris les professionnels de santé.
- les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge.
- à l'entourage des personnes immunodéprimées.

Les vaccins disponibles sont les vaccins Vaxigrip® (Laboratoire Sanofi-Pasteur) et Influvac® (Laboratoire Viatris) pour les adultes et enfants à partir de 6 mois, le vaccin Flucelvax® (CSL Seqirus) pour les adultes et enfants à partir de 2 ans et les vaccins Efluelda® (Laboratoire Sanofi) et Fluad® (Laboratoire CSL Seqirus) pour les adultes de 65 ans et plus.

La campagne a débuté le 9 septembre 2025 à Mayotte et le 14 octobre 2025 dans l'Hexagone, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane.

La vaccination conjointe contre la COVID-19 et contre la grippe saisonnière est possible. Les deux vaccinations peuvent être pratiquées dans le même temps, sur deux sites d'injection différents.

Vaccination contre la COVID-19

La vaccination contre la Covid-19 est recommandée chaque année, à l'automne, pour :

- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes âgées de plus de 6 mois et atteintes de comorbidités ayant un risque élevé de forme grave de la maladie (hypertension artérielle compliquée, pathologies cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénales, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21, de troubles psychiatriques ou de démence),
- les personnes immunodéprimées,
- les femmes enceintes,
- les résidents en Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (Unité de soins de longue durée),
- Les personnes à très haut risque de formes graves
- ainsi que les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l'infection, y compris les professionnels de santé.

Ces populations sont éligibles à partir de 6 mois après leur dernière infection ou injection de vaccin contre le Covid-19. Ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans ou plus.

Le vaccin disponible est le vaccin Comirnaty®, vaccin à ARN messager, adapté au variant LP.8.1 (Laboratoire Pfizer-BioNTech).

La campagne pour cet automne a débuté le 14 octobre 2025. La vaccination conjointe contre la COVID-19 et contre la grippe saisonnière est possible. Les deux vaccinations peuvent être pratiquées dans le même temps, sur deux sites d'injection différents.

Prévention des infections à virus respiratoire syncytial (VRS) du nourrisson

La campagne d'immunisation des nouveau-nés et nourrissons contre les infections à VRS comprend deux stratégies possibles : la vaccination de la femme enceinte ou l'immunisation des nourrissons par un anticorps monoclonal. Les parents informés par les professionnels de santé peuvent décider de la stratégie à suivre pour leur enfant.

La campagne de vaccination et d'immunisation a débuté le 1^{er} août 2025 en Guyane, le 1^{er} septembre 2025 en France hexagonale, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy et le 1^{er} octobre à Mayotte.

1. Vaccination chez la femme enceinte, en vue de protéger le nouveau-né et le nourrisson de moins de 6 mois

La vaccination de la femme enceinte est recommandée selon le schéma à une dose avec le vaccin Abrysvo®, entre la 32^e et la 36^e semaine d'aménorrhée, à compter de la date de début de campagne.

La vaccination contre le VRS chez les femmes enceintes immunodéprimées n'est pas recommandée. Dans ce cas, l'administration d'un anticorps monoclonal (palivizumab - Synagis® ou nirsevimab - Beyfortus®) chez le nouveau-né, dès la naissance, ou chez le nourrisson est privilégiée.

2. Immunisation passive des nourrissons par un anticorps monoclonal

Les anticorps monoclonaux disponibles sont :

- 1) nirsevimab (Beyfortus®)
- 2) palivizumab (Synagis®) : la population éligible correspond aux nourrissons nés prématurés et/ou à risque particulier d'infections graves.

L'immunisation par les anticorps monoclonaux s'adresse

- 1) aux nourrissons nés depuis la date de début de la campagne 2025-26 et sous réserve que la mère n'ait pas été vaccinée par Abrysvo® et
- 2) à ceux nés entre février et août 2025 à titre de rattrapage.

Pour les nourrissons exposés à leur deuxième saison de circulation du VRS, les anticorps monoclonaux sont également indiqués pour les nourrissons de moins de 24 mois vulnérables à une infection sévère due au VRS selon la Haute Autorité de Santé (HAS).

Prévention des infections à virus respiratoire syncytial (VRS) chez la personne âgée

Dans le calendrier des vaccinations 2025, il est recommandé la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus, et personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (notamment broncho pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (notamment insuffisance cardiaque) susceptibles de fortement s'aggraver lors d'une infection à VRS.

La nécessité d'un rappel chaque année n'a pas été établie.

Les vaccins disponibles sont le vaccin mRESVIA (non remboursé actuellement), le vaccin Arexvy (non remboursé actuellement) et le vaccin Abrysvo (non remboursé actuellement pour les personnes de 60 ans et plus).

Gestes barrières

En complément des vaccinations et des traitements préventifs existants, l'adoption des gestes barrières reste indispensable pour se protéger de l'ensemble des maladies de l'hiver :

- lavage des mains,
- aération régulière des pièces,
- port du masque en cas de symptômes (fièvre, nez qui coule ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles.

Prévenir les maladies de l'hiver

Retrouvez des informations sur la prévention des maladies de l'hiver sur le site de [Santé publique France](#).

L'Assurance Maladie

Sécurité sociale

Santé publique France

Chaque année,
la grippe nous
rappelle la nécessité
de se faire vacciner.

65 ans

MALADIE CHRONIQUE

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN

La grippe est dangereuse. Elle cause des hospitalisations et plusieurs milliers de morts chaque année. 65 ans et plus, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, faites-vous vacciner.

ameli.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Santé publique France

Grippe, bronchiolite, gastro-entérite, covid

Les maladies de l'hiver

Comment se transmettent-elles ?

Les postillons Les mains

Comment les éviter ?

Lavez-vous les mains Aérez les pièces

Portez un masque lorsqu'il y a du monde ou si vous êtes malade Vaccin contre la grippe, covid et certaines gastro-entérites

Pour les enfants ou personnes fragiles, si vous êtes malade, il faut voir un médecin. S'il n'est pas disponible,appelez le 15

+ d'infos et traductions sur : www.santepubliquefrance.fr/accessible/virusihiver

Partenaires

Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës : médecine libérale et hospitalière, urgences, Centre national de référence Virus des infections respiratoires, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, surveillance microbiologique des eaux usées, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Chnam, Inserm, Insee.

Pour en savoir plus

Surveillance intégrée des [IRA](#)

Surveillances de la [grippe](#), de la [bronchiolite](#) et de la [COVID-19](#)

Surveillance syndromique [SurSaUD®](#)

Surveillance en [établissements médico-sociaux](#)

Surveillance en médecine de ville : [Réseau Sentinelles](#) (Inserm - Sorbonne Université)

Surveillance virologique (Centre national de référence Virus des infections respiratoires, [Institut Pasteur](#) et [Hospices Civils de Lyon](#))

En région : consultez les [Bulletins régionaux](#)

Indicateurs en open data : [Odissé](#)

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin hebdomadaire IRA : [Abonnement](#)

Équipe de rédaction

Sibylle Bernard-Stoecklin, Christine Campèse, Bruno Coignard, Anne Fouillet, Anabelle Gilg Soit Ilg, Rémi Hanguerard, Frédéric Jourdain, Anna Maisa, Damien Mouly, Harold Noël, Isabelle Parent du Châtelet, Laila Toro, Sophie Vaux, Delphine Viriot, Centre national de référence Virus des infections respiratoires

L'équipe remercie pour leurs contributions les Directions des maladies infectieuses, des régions, d'appui, traitement et analyses de données, et prévention et promotion de la santé.

Pour nous citer : Bulletin Infections respiratoires aiguës. Édition nationale. Semaine 42 (13 au 19 octobre 2025). Saint-Maurice : Santé publique France, 20 p. Directrice de publication : Caroline Semaille. Date de publication : 22 octobre 2025

Contact : presse@santepubliquefrance.fr