

Bulletin




Bulletin épidémiologique

Semaine 44 (du 27 octobre au 02 novembre 2025) - Date de publication : 06 novembre 2025

GRAND EST

NIVEAUX D'ALERTE

Syndromes grippaux Bronchiolite (moins de 1 an)



POINTS CLÉS

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5



Les recours aux soins liés à la bronchiolite sont en légère baisse par rapport à la semaine passée. Dans les associations SOS Médecins, ils fluctuent mais restent à des niveaux comparables à ce qui était observé la saison précédente à la même période.



Syndromes grippaux - p.6

Les indicateurs pour la grippe se maintiennent à leur niveau de base. Les données virologiques détectent quelques cas sporadiques, comme attendu à cette période de l'année.



COVID-19 - p.7

La hausse des indicateurs observée à partir de la semaine 30-2025 a atteint son pic en semaine 40-2025. Les indicateurs sont depuis en diminution.



Gastro-entérites aiguës - p.9

Aucune augmentation notable des indicateurs n'est observée.

ACTUALITÉS

Forte baisse du tabagisme en France : en 10 ans, 4 millions de fumeurs quotidiens en moins

Les premiers résultats issus du Baromètre de Santé publique France mettent en évidence une forte diminution du tabagisme et du tabagisme quotidien, après la stagnation observée pendant la pandémie de Covid-19. La prévalence du tabagisme s'établit désormais à 25 % contre 32 % en 2021, et celle du tabagisme quotidien à 18 % contre 25 % en 2021.

Depuis le lancement du premier Programme national de réduction du tabagisme en 2014, le nombre de fumeurs quotidiens de 18 à 75 ans a diminué de 4 millions. L'objectif du Programme national de lutte contre le tabac 2023-2027, qui vise à réduire la prévalence du tabagisme quotidien à 20 % d'ici 2027, a non seulement été atteint, mais dépassé dès 2024. La baisse observée depuis 10 ans résulte de mesures de lutte contre le tabac mises en place par les plans nationaux successifs : paquet neutre, hausse des prix du tabac, dénormalisation de la consommation par l'extension des espaces sans tabac, remboursement des traitements de substitution nicotinique, renouvellement des actions de prévention avec notamment la création de Mois sans tabac en 2016 ou le déploiement des programmes de renforcement des compétences psychosociales (CPS).

Néanmoins, le tabagisme reste fortement marqué par les inégalités sociales et territoriales : le tabagisme quotidien est plus fréquent chez les ouvriers que chez les cadres, et plus élevé parmi les personnes en difficulté financière face à celles se déclarant à l'aise. Les personnes au chômage sont également plus touchées que les actifs.

A l'échelle régionale, la prévalence du tabagisme quotidien demeure plus élevée dans le Grand Est, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, tandis qu'elle est moins élevée en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et dans les DROM, à l'exception de la Réunion.

Par ailleurs, en 2024, 55% des fumeurs souhaitaient arrêter de fumer, et 17,3 % des fumeurs quotidiens de 18-79 ans déclaraient avoir fait une tentative d'arrêt au cours des 12 derniers mois.

Mois sans tabac : la 10ème édition est lancée !

Alors qu'une baisse historique du tabagisme se confirme, Santé publique France et le ministère chargé de la Santé, en partenariat avec l'Assurance Maladie, ont lancé la 10ème édition du Mois sans tabac le 1er novembre 2025. Mois sans tabac propose :

- Un site dédié (<https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/>) avec des conseils personnalisés et un suivi quotidien ;
- L'application Tabac info service, pour un accompagnement 24/7 ;
- Le 39 89, un numéro pour un soutien gratuit et personnalisé par des tabacologues ;
- Des actions de terrain, sous l'égide des Agences régionales de santé : stands d'information, ateliers et évènements, collaboration avec les professionnels de santé, les employeurs et les commerces de proximité.

Retrouvez plus d'informations sur le site de Santé publique France :

<https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2025/forte-baisse-du-tabagisme-en-france-en-10-ans-4-millions-de-fumeurs-quotidiens-en-moins>

PRÉVENTION

Gestes barrières



Grippe, bronchiolite, gastro-entérite, covid Les maladies de l'hiver

Comment se transmettent-elles ?



Les postillons



Les mains

Comment les éviter ?



Lavez-vous les mains



Aérez les pièces



Portez un masque
lorsqu'il y a du monde
ou si vous êtes malade



Vaccin
contre la grippe,
covid et certaines
gastro-entérites

Pour les enfants ou personnes fragiles,
si vous êtes malade, il faut voir un **médecin**.
S'il n'est pas disponible,appelez le **15**



+ d'infos et traductions sur :
www.santepubliquefrance.fr/accessible/virushiver

Recommandations vaccinales

Recommandations vaccinales

Bronchiolite

Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :



- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS des nouveaux nés eux – même.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux



Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination a lieu depuis le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

COVID-19



La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination a lieu depuis le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës



La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.

Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.

BRONCHIOLITE CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 1 AN



Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



SYNDROMES GRIPPAUX



Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



COVID-19



Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)





Figure 7. Evolution de la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en Grand Est depuis la semaine 2025-07. (Source SUM'EAU)*.



* Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau de la région Grand Est à partir d'un suivi réalisé auprès de 5 stations de traitement des eaux usées selon une fréquence hebdomadaire. Les 5 stations suivies sont localisées à proximité des agglomérations de Reims, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse. L'indicateur eaux usées correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.

GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS



Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



MORTALITÉ TOUTES CAUSES

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 43-2025, Grand Est (Source : Insee, au 05/11/2025)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR®,
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes,
- Réseau Sentinelles,
- Systèmes de surveillance spécifiques :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées,
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg,
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
 - Observatoire des urgences Est-RESCUE,
 - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Christine Meffre, Sophie Raguet, Justine Trompette, Jenifer Yaï.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 06 novembre. Saint-Maurice : Santé publique France, 9 pages, 2025.
Directrice de publication : Caroline SEMAILLE

Dépôt légal : 06 novembre 2025

Contact : grandest@santepubliquefrance.fr

Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr