

Infections respiratoires aiguës

Semaine 49 (1 au 7 décembre 2025). Publication : 10 décembre 2025

ÉDITION NATIONALE

Tendances de la semaine

Infections respiratoires aiguës (IRA). Activité en nette augmentation dans toutes les classes d'âge.

Grippe. Poursuite de l'augmentation des indicateurs grippe dans toutes les classes d'âge. Ensemble des régions hexagonales en épidémie excepté la Corse, passée en pré-épidémie. Guyane passée également en pré-épidémie en S49 et Mayotte en épidémie depuis S47.


Bronchiolite. Poursuite de l'épidémie en France hexagonale. Passage en épidémie de la Guadeloupe et de la Martinique. Phase pré-épidémique en Corse, à La Réunion et à Mayotte.

COVID-19. Indicateurs syndromiques globalement stables et à des niveaux faibles. Indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en augmentation.

Indicateurs clés


Indicateurs syndromiques

Part de la pathologie parmi	IRA basses		Syndrome grippal		Bronchiolite (moins d'un an)		COVID-19	
	S49	S49 vs S48	S49	S49 vs S48	S49	S49 vs S48	S49	S49 vs S48
Actes médicaux SOS Médecins	18,8%	+4,8 pt	10,9%	+4 pt	11,1%	-0,3 pt	0,5%	0 pt
Passages aux urgences (OSCOUR®)	5,0%	+1,2 pt	1,7%	+0,9 pt	20,8%	-0,5 pt	0,2%	0 pt
Hospitalisations après passage aux urgences (OSCOUR®)	8,3%	+1,2 pt	1,4%	+0,7 pt	35,9%	-0,5 pt	0,4%	+0,1 pt




* Méthodologie en annexe. Antilles, Guyane : niveau d'alerte pour S48. ** Données non disponibles pour Mayotte.
Source : ¹ réseau OSCOUR®, ² SOS Médecins, ³ réseau Sentinelles

Part des syndromes grippaux parmi les actes SOS Médecins




Source : SOS Médecins

Part de la bronchiolite parmi les actes SOS Médecins chez les enfants de moins de 1 an



Source : SOS Médecins

Part des suspicions de COVID-19 parmi les actes SOS Médecins



Source : SOS Médecins

Indicateurs virologiques

	Virus grippaux		VRS		SARS-CoV-2	
	S49	S49 vs S48	S49	S49 vs S48	S49	S49 vs S48
Taux de positivité des prélèvements						
Laboratoires de ville ^{1,2}	22,0%	+10,2 pt	6,4%	+0,1 pt	6,6%	-0,3 pt
Médecine de ville ^{1,3,*}	32,1%	+9,7 pt	9,7%	-1 pt	7,1%	+1,3 pt
Milieu hospitalier ^{1,4}	8,2%	+3,5 pt	9,2%	+1,4 pt	3,9%	0 pt
Surveillance dans les eaux usées ^{5,**}				1301	+43,0%	

Source : ¹ CNR-VIR, ² réseau RELAB, ³ réseau Sentinelles, SOS Médecins, DUMG Rouen et Côte d'Azur, ⁴ réseau RENAL, ⁵ SUM'Eau

* Prélèvements réalisés chez des patients consultant pour une IRA

** Ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur concentration en azote ammoniacal. Méthodologie en [annexe](#)

Retrouvez la situation épidémiologique en médecine de ville dans le bulletin du [réseau Sentinelles](#).

Point de situation

En semaine 49, les indicateurs infections respiratoires aiguës (IRA) demeuraient en nette augmentation en ville et à l'hôpital, et dans toutes les classes d'âge. Cette augmentation était principalement portée par l'intensification de la circulation des virus grippaux.

L'activité grippale était en forte augmentation dans toutes les classes d'âge dans l'Hexagone, en ville et à l'hôpital, avec une dynamique comparable à ce qui a été observé l'année dernière à la même période. L'ensemble des régions étaient en épidémie, excepté la Corse qui est passée en pré-épidémie en S49. Les virus de type A prédominaient très largement, avec une proportion du sous-type A(H3N2) légèrement supérieure à celle du sous-type A(H1N1)_{pdm09} parmi les prélèvements testés depuis S48. Parmi les virus grippaux séquencés depuis fin septembre, le sous-clade K était majoritaire pour le sous-type A(H3N2) et le sous-clade D.3.1 était majoritaire pour le sous-type A(H1N1)_{pdm09}. En Outre-mer, l'activité grippale était à son niveau de base aux Antilles et à La Réunion. La Guyane est passée en pré-épidémie en S49, avec une circulation active de virus grippaux de type A. Mayotte demeurait en épidémie depuis S47.

L'épidémie de bronchiolite se poursuivait dans l'Hexagone. Les indicateurs syndromiques se stabilisaient en ville, à des niveaux proches de ceux observés la saison précédente à la même période. Une tendance à la stabilisation était également observée à l'hôpital, à un niveau légèrement inférieur à celui de l'année précédente à la même période. Dans l'Hexagone, toutes les régions étaient en épidémie excepté la Corse qui passait en pré-épidémie cette semaine. Dans les départements et régions d'outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique passaient en épidémie. La Réunion et Mayotte passaient en phase pré-épidémique. Le taux de détection du VRS (virus respiratoire syncytial) tous âges était stable dans les prélèvements naso-pharyngés réalisés par les laboratoires de biologie médicale en ville et continuait à augmenter à l'hôpital.

La plupart des indicateurs de la COVID-19 en ville et à l'hôpital étaient stables et à des niveaux faibles. L'indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées était en augmentation pour la deuxième semaine consécutive. La part des décès de COVID-19 certifiés électroniquement poursuivait sa baisse.

Le nombre de nouveaux épisodes d'IRA dans les Établissements médico-sociaux (EMS) était en diminution depuis mi-octobre comme observé en 2024 à la même période. Une majorité des épisodes était attribuée exclusivement à la COVID-19 jusqu'en S48, toutefois une augmentation du nombre d'épisodes attribués exclusivement à la grippe est observée depuis les deux dernières semaines.


La campagne de vaccination contre la grippe et contre la COVID-19 a débuté le 14 octobre 2025. Elle cible toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes à risque de forme grave, les femmes enceintes, les résidents en Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (Unité de soins de longue durée), ainsi que les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l'infection, y compris les professionnels de santé. La campagne d'immunisation des nouveau-nés contre les infections à VRS a débuté le 1^{er} septembre 2025 à l'exception de la Guyane où elle a débuté le 1^{er} août 2025. Deux stratégies sont possibles : soit la vaccination de la femme enceinte pour protéger le nouveau-né ou le nourrisson de moins de 6 mois soit l'immunisation des nouveau-nés et nourrissons par un anticorps monoclonal.

En complément des vaccinations et des traitements préventifs existants, l'adoption des gestes barrières reste indispensable pour se protéger de l'ensemble des maladies de l'hiver : le lavage des mains, l'aération des pièces et le port du masque en cas de symptômes (fièvre, nez qui coule ou toux), dans les lieux fréquentés ou en présence de personnes fragiles.

Médecine de ville

En semaine 49, le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 238 cas pour 100 000 habitants [IC95% : 228 -247] (données non consolidées) vs 189 [181-197] en S48.


Estimation de l'incidence des cas d'IRA vus en consultation de médecine générale*



Source : réseau Sentinelles, IQVIA


En semaine 49, 19 119 actes SOS Médecins correspondant à une IRA basse ont été enregistrés, soit 18,8% de l'ensemble des actes (vs 14,1% en S48). Le nombre d'actes médicaux pour syndrome grippal était de 11 066, soit 10,9% (vs 6,9% en S48). Un total de 352 actes pour bronchiolite a été enregistré chez les moins d'un an, soit 11,1% (vs 11,4% en S48) de l'ensemble des actes dans cette classe d'âge. Le nombre d'actes pour suspicion de COVID-19 était de 506, soit 0,5% des actes SOS Médecins (vs 0,5% en S48).

Part des IRA basses* parmi les actes SOS Médecins



Source : SOS Médecins. * Méthodologie en [annexe](#)

Part des syndromes grippaux, des suspicions de COVID-19 (tous âges) et de la bronchiolite (chez les moins de 1 an) parmi les actes SOS Médecins




Source : SOS Médecins

Grippe

En semaine 49, le taux de consultations tous âges confondus pour syndrome grippal estimé à partir des données du réseau Sentinelles et IQVIA était de 190 pour 100 000 habitants [IC95% : 182-199] (données non consolidées) vs 118 pour 100 000 habitants [112-124] en S48.


En semaine 49, le recours aux soins pour syndrome grippal en médecine de ville était en nette augmentation dans toutes les classes d'âge. La part d'activité pour syndrome grippal SOS Médecins a dépassé le seuil d'intensité faible chez toutes les classes d'âge.

Consultations pour syndrome grippal : pourcentage parmi les actes SOS Médecins et taux de consultations pour 100 000 habitants (réseau Sentinelles, IQVIA*)




Source : réseau Sentinelles, IQVIA, SOS Médecins

Part des syndromes grippaux parmi les consultations SOS Médecins, selon le niveau d'intensité* pour cet indicateur



Source : SOS Médecins. * Méthodologie en [annexe](#)

Part des syndromes grippaux parmi les actes SOS Médecins




Source : SOS Médecins

Bronchiolite


En semaine 49, parmi les 3 166 actes médicaux SOS Médecins réalisés pour des enfants de moins de 1 an, 352 actes (11,1%) étaient liés à la bronchiolite.

La part de la bronchiolite parmi les consultations SOS Médecins se stabilisait en semaine 49 en médecine de ville. Le niveau d'intensité de la part de la bronchiolite était cette semaine à un niveau d'intensité faible.

Part de la bronchiolite parmi les actes SOS Médecins chez les enfants de moins de 1 an



Part de la bronchiolite parmi les consultations SOS Médecins chez les moins de 1 an, selon le niveau d'intensité* pour cet indicateur




COVID-19

En semaine 49, parmi les patients vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë, le taux d'incidence des cas de COVID-19 a été estimé à 9 cas pour 100 000 habitants [IC95% : 7 -11] (données non consolidées) vs 9 [7-11] en S48.

En semaine 49, la part du nombre d'actes pour suspicion de COVID-19 parmi les actes SOS Médecins était stable tous âges confondus. Elle variait peu selon les classes d'âges : 46 actes chez les 65 ans et plus, soit 0,5% (vs 0,4% en S48), 393 actes chez les 15-64 ans soit 0,7% (vs 0,7% en S48), 45 actes chez les 5-14 ans, soit 0,3% (vs 0,5% en S48) et 22 actes chez les 0-4 ans, soit 0,1% (vs 0,1% en S48).

Part des suspicions de COVID-19 parmi les actes SOS Médecins



Milieu hospitalier

En semaine 49, 17 447 passages aux urgences pour IRA basse ont été enregistrés, soit 5,0% de l'ensemble des passages tous âges (vs 3,9% en S48). Le nombre d'hospitalisations après passage


pour IRA basse était de 5 896, soit 8,3% de l'ensemble des hospitalisations tous âges (vs 7,2% en S48). La part des IRA parmi les passages aux urgences était à un niveau d'intensité XXX tous âges confondus.

Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était de 6 060, soit 1,7% des passages (vs 0,8% en S48). Le nombre d'hospitalisations après passage pour syndrome grippal était de 983, soit 1,4% de l'ensemble des hospitalisations (vs 0,7% en S48).

Chez les moins d'un an, 3 010 passages aux urgences pour bronchiolite ont été enregistrés, soit 20,8% des passages dans cette classe d'âge (vs 21,3% en S48). Le nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite était de 965, soit 35,9% des hospitalisations dans cette classe d'âge (vs 36,4% en S48).


En semaine 49, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 était de 594, soit 0,2% de l'ensemble des passages (vs 0,1% en S48). Le nombre d'hospitalisations après passage pour suspicion de COVID-19 était de 251, soit 0,4% de l'ensemble des hospitalisations (vs 0,3% en S48).

Part des IRA basses parmi les passages aux urgences



Source : réseau OSCOUR®


Part des IRA basses parmi les passages aux urgences, selon le niveau d'intensité pour cet indicateur*



Source : réseau OSCOUR®. * Méthodologie en [annexe A et B](#)


Part de la COVID-19/suspicion de COVID-19 et de la grippe/syndrome grippal (tous âges) et part de la bronchiolite (chez les moins de 1 an)

Passages aux urgences



Source : réseau OSCOUR®

Hospitalisations après passage




Source : réseau OSCOUR®

Grippe


En semaine 49, la part de la grippe parmi les hospitalisations après passage aux urgences était en forte augmentation et avait dépassé le seuil d'intensité faible dans toutes les classes d'âge.

Part de la grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations après passage aux urgences



Source : réseau OSCOUR®

Part de la grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations après passage aux urgences, selon le niveau d'intensité pour cet indicateur*



Source : réseau OSCOUR®. * Méthodologie en [annexe](#)

Bronchiolite


En semaine 49, chez les moins de 1 an, la bronchiolite concernait 20,8% des passages aux urgences et 35,9% des hospitalisations dans cette classe d'âge.

Parmi les 3 010 enfants de moins de 1 an vus aux urgences pour bronchiolite en semaine 49, 965 (32,1%) ont été hospitalisés.

La part de la bronchiolite parmi les hospitalisations après passage aux urgences se stabilisait en semaine 49 à l'hôpital. Le niveau d'intensité de la part de la bronchiolite était cette semaine à un niveau d'intensité faible.


Part de la bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an

Passages aux urgences



Source : réseau OSCOUR®


Hospitalisations après passage



Source : réseau OSCOUR®

Une analyse détaillée chez les moins d'un an est disponible [ici](#)

Part de la bronchiolite parmi les hospitalisations après passage aux urgences chez les moins de 1 an, selon le niveau d'intensité pour cet indicateur*




Source : réseau OSCOUR®. * Méthodologie en [annexe](#)

COVID-19

La part des hospitalisations après passage aux urgences pour COVID-19/suspicion de COVID-19 restait faible dans toutes les classes d'âge. Chez les 65 ans et plus, 199 hospitalisations ont été enregistrées, soit 0,6% (vs 0,5% en S48). Chez les 15-64 ans, le nombre d'hospitalisations était de 27, soit 0,1% (vs 0,1% en S48). Chez les 5-14 ans, ce nombre était de 1, soit <0,1% (vs 0,1% en S48). Chez les 0-4 ans, 24 hospitalisations ont été enregistrées, soit 0,4% (vs 0,3% en S48).

Parmi les hospitalisations en service de réanimation après passage aux urgences, 6 l'ont été pour COVID-19/suspicion de COVID-19 en S49, soit 0,2% (vs 0,1% en S48).

Part de la COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations après passage aux urgences



Source : réseau OSCOUR®

Cas graves en réanimation

Depuis la semaine 40, 78 cas de grippe, 87 cas de COVID-19 et 17 cas d'infections à VRS* ont été signalés par les services de réanimation participant à la surveillance (surveillance non exhaustive). Aucun cas de co-infection (grippe/COVID-19, grippe/VRS, COVID-19/VRS) n'a été déclaré.

* La surveillance des infections à VRS concerne uniquement les personnes âgées de 18 ans et plus

Caractéristiques des patients admis en service de réanimation suite à une infection par les virus de la grippe, le SARS-CoV-2 ou le VRS au cours de la saison 2025-2026

	Grippe N = 78 (43%)		COVID-19 N = 87 (48%)		Infection à VRS N = 17 (9%)	
	N	%	N	%	N	%
Sexe						
Femme	25	32%	34	40%	9	53%
Homme	52	67%	52	60%	8	47%
Indéterminé	1	1%	0	0%	0	0%
Non renseigné	0		1		0	
Classes d'âge (années)						
< 2	3	4%	0	0%	-	-
2-17	3	4%	2	2%	-	-
18-64	26	34%	27	31%	3	18%
65 et plus	44	58%	58	67%	14	82%
Non renseigné	2		0		0	
Données virologiques grippales						
À, sans précision	52	83%	-	-	-	-
À(H1N1) _{pdm09}	4	6%	-	-	-	-
À(H3N2)	6	10%	-	-	-	-
B	0	0%	-	-	-	-
Co-infection virus grippaux	1	2%	-	-	-	-
Non renseigné	15		87		17	
Présence de comorbidité(s)						
Vaccination grippe pour la saison en cours	70	90%	75	86%	15	88%
Oui	1	1%	3	3%	3	18%
Non	47	60%	38	44%	7	41%
Ne sait pas/Non renseigné	30	38%	46	53%	7	41%
Syndrome de détresse respiratoire aiguë						
Aucun	30	43%	48	58%	11	69%
Mineur	7	10%	1	1%	0	0%
Modéré	18	26%	19	23%	4	25%
Sévère	15	21%	15	18%	1	6%
Non renseigné	8		4		1	
Assistance ou aide ventilatoire la plus invasive						
Aucune	2	3%	2	2%	0	0%
Ventilation non-invasive	48	62%	54	63%	13	81%
Ventilation invasive	26	33%	30	35%	3	19%
Assistance extracorporelle	2	3%	0	0%	0	0%
Non renseigné	0		1		1	

Source : réseau de services de réanimation sentinelles
 Compte tenu des arrondis, la somme des pourcentages peut être différente de 100%.

Parmi les 78 cas de grippe, 58% avaient 65 ans ou plus. La présence d'au moins une comorbidité était rapportée pour 90% des cas. Un virus de type A a été identifié dans 99% des cas où le virus a été typé (62/63). Parmi les 48 cas pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 98% n'étaient pas vaccinés contre la grippe. Aucun décès n'a été signalé (données non consolidées).

Parmi les 87 cas de COVID-19, 67% avaient 65 ans ou plus. La présence d'au moins une comorbidité était rapportée pour 86% des cas. Au total, 2 décès ont été signalés chez les 65 ans et plus (données non consolidées).

Parmi les 17 cas d'infections à VRS âgés de 18 ans et plus, 82% avaient 65 ans ou plus. La présence d'au moins une comorbidité était rapportée pour 88% des cas. Aucun décès n'a été signalé (données non consolidées).

Bronchiolite

La surveillance des cas graves de bronchiolite chez les moins de 2 ans s'appuie sur des services de réanimation pédiatrique volontaires. Sont signalés les patients de moins de 2 ans avec une bronchiolite nécessitant une prise en charge en réanimation, quel que soit le virus à l'origine de l'infection (identifié ou non). Les services participants peuvent signaler tous les cas admis en réanimation ou les cas admis en réanimation un jour donné de la semaine. Cette surveillance n'est pas exhaustive.

Depuis la semaine 40, 84 cas graves de bronchiolite ont été signalés par les services de réanimation participants. Parmi eux, le VRS et les rhinovirus/entérovirus ont été identifiés respectivement dans 33 cas (soit respectivement 39% des cas pour lesquels un pathogène a été recherché et identifié). Les cas étaient majoritairement âgés de moins de 6 mois (69%) et 31% avaient au moins une comorbidité identifiée ou étaient nés prématurés. Un traitement préventif contre les infections à VRS par anticorps monoclonal avait été administré à 34%.

Caractéristiques des patients admis en service de réanimation pour une bronchiolite en France au cours de la saison 2025-2026, données du 9 décembre 2025


	Bronchiolite N = 84	
	N	%
Sexe		
Fille	34	40%
Garçon	48	57%
Non renseigné	2	2%
Classes d'âge (mois)		
< 1	8	10%
1-2	33	39%
3-5	17	20%
6-11	15	18%
12-24	10	12%
Non renseigné	1	1%
Agent pathogène (seul ou en co-infection)*		
VRS	33	39%
Rhinovirus/Entérovirus	33	39%
Métapneumovirus	7	8%
Parainfluenzae virus	8	10%
Grippe	2	2%
Adénovirus	4	5%
Non identifié/Non recherché	8	10%
Présence de comorbidité(s) et/ou prématurité**		
Prématurité	15	18%
Pathologie cardiaque	7	8%
Pathologie pulmonaire	8	10%
Pathologie rénale	2	2%
Pathologie neuromusculaire	1	1%
Immunodépression	1	1%
Autre(s) comorbidité(s)	7	8%
Traitements préventifs pour le VRS		
Nirsevimab (Beyfortus®)	28	33%
Palivizumab (Synagis®)	1	1%
Non renseigné	3	
Vaccination de la mère contre le VRS		
Oui	7	8%
Aucun	32	38%
Ne sait pas	45	54%

Bronchiolite N = 84		
	N	%
Assistance ou aide ventilatoire la plus invasive		
Ventilation non invasive	42	51%
Oxygénothérapie à haut débit	37	45%
Ventilation invasive	3	4%
Assistance extracorporelle	0	0%
Aucune/Non renseignée	2	2%
Décès	0	0%

Source : réseau de services de réanimation sentinelles pédiatriques. Compte tenu des arrondis, la somme des pourcentages peut être différente de 100%. * Plusieurs agents pathogènes possibles pour un patient (co-infections). Le total est supérieur à 100%. ** Seules les comorbidités les plus fréquentes sont décrites. Plusieurs comorbidités possibles pour un patient.

En semaine 49, 34 hospitalisations en service de réanimation après passage aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an ont été enregistrées, soit 44,7% de l'ensemble des hospitalisations en service de réanimation dans cette classe d'âge (vs 36,6% en S48).

Part de la bronchiolite parmi les hospitalisations en service de réanimation après passage aux urgences chez les enfants de moins de 1 an




Source : réseau OSCOUR®

Établissements médico-sociaux

Depuis la semaine 40, 1 113 épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA) sont survenus dans les établissements médico-sociaux (EMS) et ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention*, dont 1 042 (94%) épisodes survenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Parmi l'ensemble des épisodes d'IRA survenus en EMS, 1 064 (96%) ont fait l'objet d'une recherche étiologique, parmi lesquels 745 (70%) étaient exclusivement attribués à la COVID-19, 57 (8,4%) exclusivement à la grippe et 11 exclusivement au VRS (1%). Le VRS était seul ou associé à un autre pathogène dans 34 épisodes (3%). Un total de 89 nouveaux épisodes de cas groupés d'IRA sont survenus en semaine 48 (données non consolidées) vs 53 en S47. Parmi eux, 36 étaient attribués exclusivement à la COVID-19 (vs 20 en S47), 25 épisodes étaient attribués exclusivement à la grippe (vs 10 en S47) et 1 était attribué exclusivement à une infection à VRS (vs 1 en S47).

Un total de 89 nouveaux épisodes de cas groupés d'IRA sont survenus en semaine 48 (données non consolidées) vs 53 en S47. Parmi eux, 25 épisodes étaient attribués exclusivement à la grippe (vs 10 en S47), 1 était attribué exclusivement à une infection à VRS (vs 1 en S47) et 36 étaient attribués exclusivement à la COVID-19 (vs 20 en S47).

Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA dans les établissements médico-sociaux




Surveillance virologique

En semaine 49, le taux de positivité des prélèvements réalisés en ville par les laboratoires de biologie médicale (réseau RELAB) était de 22,0% (1 211/5 503) pour les virus grippaux (vs 11,8% en S48), 6,4% (329/5 124) pour le VRS (vs 6,3% en S48), 6,6% (363/5 475) pour le SARS-CoV-2 (vs 6,9% en S48).

Le taux de positivité des prélèvements réalisés en ville par les médecins des réseaux Sentinelles, SOS Médecins et DUMG Rouen et Côte d'Azur était de 32,1% (63/196) pour les virus grippaux (vs 22,5% en S48), 9,7% (19/196) pour le VRS (vs 10,7% en S48), 7,1% (14/196) pour le SARS-CoV-2 (vs 5,9% en S48) et 13,4% (26/194) pour le rhinovirus (vs 24,7% en S48).

Le taux de positivité des prélèvements réalisés en milieu hospitalier (réseau RENAL) était de 8,2% (922/11 239) pour les virus grippaux (vs 4,7% en S48), 9,2% (1 012/10 965) pour le VRS (vs 7,8% en S48), 3,9% (434/11 164) pour le SARS-CoV-2 (vs 3,9% en S48) et 17,3% (845/4 887) pour le rhinovirus (vs 18,5% en S48).


Taux de positivité pour différents virus respiratoires des prélèvements réalisés en France hexagonale



Source : réseau RELAB, CNR-VIR

Source : réseau Sentinelles, SOS Médecins, DUMG Rouen et Côte d'Azur, CNR-VIR. Reprise des analyses en S40.

Hôpital




Source : réseau RENAL, CNR-VIR

Virus grippaux

En semaine 49, le taux de positivité était de 32% (196 prélèvements) en médecine de ville et de 8,2% à l'hôpital, se situant à des niveaux supérieurs à ceux observés en S49 lors des deux saisons précédentes. En laboratoires d'analyses médicales (réseau RELAB), le taux de positivité pour grippe était de 22% tous âges confondus, soit supérieur de 10,2 points par rapport à ceux observés en S48/2025 et S49/2024. L'augmentation était observée dans toutes les classes d'âge, et particulièrement chez les enfants, avec un taux de positivité de 42% chez les 6-18 ans et de 29% chez les moins de 6 ans. Depuis la semaine 40, en médecine de ville, sur les 1 499 prélèvements analysés, 155 se sont avérés positifs pour la grippe (taux de positivité 10,3%) : 63 A(H1N1)_{pdm09}, 53 A(H3N2), 38 A non sous-typé et un virus de type B. La part des virus A(H3N2) parmi les virus détectés est devenue légèrement supérieure à celle des virus A(H1N1)_{pdm09} depuis S48.

À l'hôpital (réseau RENAL/CNR), parmi les 102 850 prélèvements testés depuis la semaine 40, 2 513 se sont avérés positifs pour un virus grippal (2,4%), avec une très grande majorité de virus de type A : 2 030 virus de type A non sous-typés, 242 A(H1N1)_{pdm09}, 201 A(H3N2) et 40 virus de type B.


Taux de positivité pour grippe des prélèvements réalisés en France hexagonale



Source : réseau Sentinelles, SOS Médecins, DUMG Rouen et Côte d'Azur, CNR-VIR

Source : réseau RENAL, CNR-VIR

Distribution des types et sous-types de virus grippaux des prélèvements réalisés en France hexagonale



Source : réseau Sentinelles, SOS Médecins, DUMG Rouen et Côte d'Azur, CNR-VIR

Source : réseau RENAL, CNR-VIR

Caractérisations antigénique et génétique des virus grippaux


Entre les semaines 38 et 44, un total de 170 virus A(H1N1) et 35 virus A(H3N2) ont été séquencés par le CNR Virus des infections respiratoires. Le sous-clade majoritaire était le sous-clade K (24/35 ; 68,6%) pour le sous-type A(H3N2) et le sous-clade D.3.1 (166/170 ; 97,6%) pour le sous-type A(H1N1)_{pdm09}. Ces données de séquençage sont préliminaires. Elles seront consolidées et complétées par des analyses de caractérisation antigénique dans les prochaines semaines.

Pour plus d'informations sur les données virologiques issues du réseau RENAL de laboratoires hospitaliers et du réseau RELAB de laboratoires de biologie médicale, consultez [le bulletin hebdomadaire du Centre national de référence Virus des infections respiratoires](#)

VRS

En semaine 49, parmi les 196 prélèvements naso-pharyngés ou salivaires réalisés en ville pour le VRS, 19 (9,7%) étaient positifs pour le VRS. Parmi les 10 965 prélèvements naso-pharyngés réalisés à l'hôpital, 1 012 (9,2%) étaient positifs pour le VRS.


Taux de positivité* pour VRS des prélèvements réalisés en France hexagonale



SARS-CoV-2

En semaine 49, le taux de positivité des prélèvements réalisés en milieu hospitalier (réseau RENAL) était de 3,9% (434/11 164) pour le SARS-CoV-2 (vs 3,9% en S48).


Taux de positivité pour le SARS-CoV-2 des prélèvements réalisés à l'hôpital en France hexagonale



Surveillance dans les eaux usées

En semaine 49, une hausse importante du niveau de SARS-CoV-2 dans les eaux est observée en France. Les 54 stations de traitement des eaux usées disposent de données interprétables.

Moyenne des indicateurs de surveillance des eaux usées pondérée par la taille de population raccordée aux différents sites surveillés




Source : SUM'Eau. Indicateur eaux usées : ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur concentration en azote ammoniacal (Méthodologie en [annexe](#))

Surveillance génomique

Dans l'Hexagone, en octobre, le lignage XFG (recombinant LF.7/LP.8.1.2) est le plus fréquemment détecté, avec une proportion de 43,9% (449/1022, en baisse) sans ses sous-lignages, suivi de XFG.3 avec une proportion de 31,8% (325/1022, en augmentation), puis de NB.1.8.1 (descendant de XDV) avec une proportion de 13,1% (134/1022, en augmentation) et devant XFG.3.1 qui représentait 3,8% (39/1022, en baisse) des séquences détectées. Au total, sur le dernier mois analysé, les lignages XFG et NB.1.8.1 accompagnés de l'ensemble de leurs sous lignages (incluant ceux présents à plus de 5% sur la figure), représentaient respectivement 79,5% (813/1022) et 13.1% (134/1022) de l'ensemble des séquences détectées dans l'Hexagone.

Le graphique représente pour chaque mois les pourcentages des variants SARS-CoV-2 détectés en France hexagonale d'après les données déposées sur la base de données Emergen. Les lignages représentant moins de 5% des variants détectés sont inclus dans le lignage parental ou dans « XXX_Autres ». Le nombre de séquences disponibles pour chaque mois est indiqué au-dessus de l'histogramme. Données produites par le CNR-VIR en s'appuyant notamment sur le réseau RELAB. Le graphique des variants SARS-CoV-2 est mis à jour une fois par mois (troisième semaine du mois), sauf évolution particulière.

Détection des variants SARS-CoV-2, France hexagonale



Source : CNR-VIR


Mortalité

Certification électronique

En semaine 49, parmi les 7 464 décès déclarés par certificat électronique, 1,0% l'ont été avec une mention de grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès (vs 0,5% en S48). La COVID-19 était mentionnée dans 0,7% des décès (vs 0,7% en S48).

En progression, le déploiement du dispositif de certification électronique recouvrait, fin 2024, 50% de la mortalité nationale, variant de 25% (Bourgogne-Franche-Comté) à 67% (Auvergne-Rhône-Alpes) selon les régions de l'Hexagone. La part des décès certifiés électroniquement est également hétérogène selon le type de lieu de décès (environ 70% des décès survenant en établissements hospitaliers, près de 34% en Ehpad et 15% à domicile).

Part des décès avec une mention de grippe et COVID-19 parmi l'ensemble des décès certifiés par voie électronique




Source : Inserm-CépiDc ; Traitement : Santé publique France

Mortalité toutes causes

Au niveau national, le nombre de décès toutes causes confondues transmis par l'Insee était dans les marges de fluctuation habituelle dans toutes les classes d'âge jusqu'en S48.

Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, tous âges, 2018 à 2025 (jusqu'en semaine 48)



Source des données : Insee. Traitement : Santé publique France (Dernière semaine incomplète)

Prévention

Vaccination contre la grippe

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année, à l'automne, pour :

- les personnes de 65 ans et plus,
- les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse ;
- les personnes âgées de plus de 6 mois atteintes de comorbidité à risque élevé de forme grave de la maladie (incluant notamment : asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), emphysème, cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque, maladie des valves cardiaques, troubles du rythme cardiaque, maladie des artères du cœur, angine de poitrine, antécédent d'accident vasculaire cérébral (AVC), d'infarctus ou de pontage ; formes graves des affections neurologiques et musculaires, néphropathie (atteinte du rein) chronique grave, personnes en dialyse, diabète, obésité, les personnes immunodéprimées ...);
- les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l'infection, y compris les professionnels de santé.
- les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge.
- à l'entourage des personnes immunodéprimées.

Les vaccins disponibles sont les vaccins Vaxigrip® (Laboratoire Sanofi-Pasteur) et Influvac® (Laboratoire Viatris) pour les adultes et enfants à partir de 6 mois, le vaccin Flucelvax® (CSL Seqirus) pour les adultes et enfants à partir de 2 ans et les vaccins Efluelda® (Laboratoire Sanofi) et Fluad® (Laboratoire CSL Seqirus) pour les adultes de 65 ans et plus.

La campagne a débuté le 9 septembre 2025 à Mayotte et le 14 octobre 2025 dans l'Hexagone, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane.

La vaccination conjointe contre la COVID-19 et contre la grippe saisonnière est possible. Les deux vaccinations peuvent être pratiquées dans le même temps, sur deux sites d'injection différents.

Vaccination contre la COVID-19

La vaccination contre la Covid-19 est recommandée chaque année, à l'automne, pour :

- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes âgées de plus de 6 mois et atteintes de comorbidités ayant un risque élevé de forme grave de la maladie (hypertension artérielle compliquée, pathologies cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénales, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21, de troubles psychiatriques ou de démence),
- les personnes immunodéprimées,
- les femmes enceintes,
- les résidents en Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (Unité de soins de longue durée),
- Les personnes à très haut risque de formes graves
- ainsi que les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l'infection, y compris les professionnels de santé.

Ces populations sont éligibles à partir de 6 mois après leur dernière infection ou injection de vaccin contre le Covid-19. Ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans ou plus.

Le vaccin disponible est le vaccin Comirnaty®, vaccin à ARN messager, adapté au variant LP.8.1 (Laboratoire Pfizer-BioNTech).

La campagne pour cet automne a débuté le 14 octobre 2025. La vaccination conjointe contre la COVID-19 et contre la grippe saisonnière est possible. Les deux vaccinations peuvent être pratiquées dans le même temps, sur deux sites d'injection différents.

Prévention des infections à virus respiratoire syncytial (VRS) du nouveau-né et du nourrisson

La campagne d'immunisation des nouveau-nés et nourrissons contre les infections à VRS comprend deux stratégies possibles : la vaccination de la femme enceinte ou l'immunisation des nourrissons par un anticorps monoclonal. Les parents informés par les professionnels de santé peuvent décider de la stratégie à suivre pour leur enfant.

La campagne de vaccination et d'immunisation a débuté le 1^{er} août 2025 en Guyane, le 1^{er} septembre 2025 en France hexagonale, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy et le 1^{er} octobre à Mayotte.

1. Vaccination chez la femme enceinte, en vue de protéger le nouveau-né et le nourrisson de moins de 6 mois

La vaccination de la femme enceinte est recommandée selon le schéma à une dose avec le vaccin Abrysvo®, entre la 32^e et la 36^e semaine d'aménorrhée, à compter de la date de début de campagne.

La vaccination contre le VRS chez les femmes enceintes immunodéprimées n'est pas recommandée. Dans ce cas, l'administration d'un anticorps monoclonal (palivizumab - Synagis® ou nirsevimab - Beyfortus®) chez le nouveau-né, dès la naissance, ou chez le nourrisson est privilégiée.

2. Immunisation passive des nouveau-nés et nourrissons par un anticorps monoclonal

Les anticorps monoclonaux disponibles sont :

- 1) nirsevimab (Beyfortus®)
- 2) palivizumab (Synagis®) : la population éligible correspond aux nourrissons nés prématurés et/ou à risque particulier d'infections graves.

L'immunisation par les anticorps monoclonaux s'adresse

- 1) aux enfants nés depuis la date de début de la campagne 2025-26 et sous réserve que la mère n'ait pas été vaccinée par Abrysvo® et
- 2) à ceux nés entre février et août 2025 à titre de rattrapage.

Pour les nourrissons exposés à leur deuxième saison de circulation du VRS, les anticorps monoclonaux sont également indiqués pour les nourrissons de moins de 24 mois vulnérables à une infection sévère due au VRS selon la définition de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Vaccination contre les infections à virus respiratoire syncytial (VRS) chez la personne âgée

Dans le calendrier des vaccinations 2025, il est recommandé la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus, et des personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (notamment bronchopneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (notamment insuffisance cardiaque) susceptibles de fortement s'aggraver lors d'une infection à VRS.

La nécessité d'un rappel chaque année n'a pas été établie.

Les vaccins disponibles sont le vaccin MRESVIA® (non remboursé actuellement), le vaccin Arexvy® (non remboursé actuellement) et le vaccin Abrysvo® (non remboursé actuellement pour les personnes de 60 ans et plus).

Gestes barrières

En complément des vaccinations et des traitements préventifs existants, l'adoption des gestes barrières reste indispensable pour se protéger et protéger son entourage de l'ensemble des maladies de l'hiver :

- Mettre un masque dès les premiers symptômes (fièvre, nez qui coule ou toux), dans les lieux fréquentés ou en présence de personnes fragiles.
- Se laver correctement et régulièrement les mains.
- Aérer régulièrement les pièces.

Depuis le 25 octobre 2025, Santé publique France, aux côtés du Ministère chargé de la Santé et de l'Assurance Maladie, diffuse une campagne visant à encourager l'adoption de ces trois gestes barrière.



Partenaires

Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës : médecine libérale et hospitalière, urgences, Centre national de référence Virus des infections respiratoires, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, surveillance microbiologique des eaux usées, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Chnam, Inserm, Insee.

Pour en savoir plus

Surveillance intégrée des [IRA](#)

Surveillances de la [grippe](#), de la [bronchiolite](#) et de la [COVID-19](#)

Surveillance syndromique [SurSaUD®](#)

Surveillance en [établissements médico-sociaux](#)

Surveillance en médecine de ville : [Réseau Sentinelles](#) (Inserm - Sorbonne Université)

Surveillance virologique (Centre national de référence Virus des infections respiratoires, [Institut Pasteur](#) et [Hospices Civils de Lyon](#))

En région : consultez les [Bulletins régionaux](#)

Indicateurs en open data : [Odissé](#)

Plus d'informations sur l'application de la méthode PISA de l'OMS au regroupement syndromique « Infections respiratoires aiguës basses » [ici](#)

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin hebdomadaire IRA : [Abonnement](#)

Équipe de rédaction

Sibylle Bernard-Stoecklin, Christine Campèse, Bruno Coignard, Anne Fouillet, Anabelle Gilg Soit Ilg, Rémi Hanguéhard, Frédéric Jourdain, Anna Maisa, Damien Mouly, Harold Noël, Isabelle Parent du Châtelet, Florian Ruiz, Laïla Toro, Sophie Vaux, Delphine Viriot, Centre national de référence Virus des infections respiratoires

L'équipe remercie pour leurs contributions les Directions des maladies infectieuses, des régions, d'appui, traitement et analyses de données, et prévention et promotion de la santé.

Pour nous citer : Bulletin Infections respiratoires aiguës. Édition nationale. Semaine 49 (1 au 7 décembre 2025). Saint-Maurice : Santé publique France, 24 p. Directrice de publication : Caroline Semaille. Date de publication : 10 décembre 2025

Contact : presse@santepubliquefrance.fr