

Bulletin épidémiologique

Semaine 52 (du 21 au 27 décembre 2025) - Date de publication : 31 décembre 2025


GRAND EST

NIVEAUX D'ALERTE

Syndromes grippaux



Bronchiolite (moins de 1 an)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie

POINTS CLÉS



Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5

La part de la bronchiolite parmi les passages aux urgences est de 21,2 %, elle se stabilise pour la 1^{ère} fois depuis le début de l'épidémie, et amorce une diminution en ce qui concerne les associations SOS Médecins.



Syndromes grippaux - p.6

L'épidémie se poursuit en semaine 52-2025, avec l'ensemble des indicateurs toujours en augmentation. Les syndromes grippaux représentent 4,4 % des passages aux urgences et 20,8 % des consultations SOS Médecins. L'activité liée à la grippe se stabilise en ville chez les moins de 15 ans.



COVID-19 - p.7

Les recours aux soins pour suspicion de Covid-19 fluctuent à des niveaux faibles, à l'hôpital comme en médecine de ville.



Gastro-entérites aiguës - p.9

Les consultations SOS Médecins et les passages aux urgences fluctuent, mais restent légèrement inférieurs aux niveaux observés à cette période les années précédentes.

ACTUALITÉS

Vaccination contre la grippe

Dans la région Grand Est, au 30 novembre 2025, la couverture vaccinale contre la grippe de l'ensemble des personnes à risque estimée parmi les bénéficiaires du régime général uniquement était de **37 %** (vs 34,8 % à la même date en 2024, +2,2 points)

Elle était de **42,6 %** chez les personnes de 65 ans et plus (vs 40,8 % à la même date en 2024, +1,8 points) et de 21,8 % chez les personnes à risque de moins de 65 ans (vs 19,9 % à la même date en 2024, +1,9 points). Ces couvertures vaccinales sont proches ou inférieures (chez les plus âgés) aux couvertures vaccinales observées en France hexagonale. Il existe des disparités départementales avec, au maximum, un écart de près de 11 points observé pour les plus âgés (Tableau 1).

Les prochaines estimations seront réalisées comme chaque année à l'issue de la campagne de vaccinale et publiées en avril à l'occasion de la semaine européenne de vaccination.

Tableau 1: Couverture vaccinale contre la grippe parmi les bénéficiaires du régime général, en région Grand Est, au 30 novembre 2025. (Source : SNDS-DCIR, Traitement Santé publique France)

Département	CV grippe chez les moins de 65 ans (%) *	CV grippe chez les 65 ans et plus (%)	CV grippe chez l'ensemble des personnes à risque (%)
Ardennes	24,1	45,1	40,0
Aube	20,6	40,4	36,0
Marne	24,2	44,4	40,0
Haute-Marne	21,3	38,7	35,0
Meurthe-et-Moselle	25,0	48,0	42,0
Meuse	22,7	41,7	37,0
Moselle	21,0	43,9	38,0
Bas-Rhin	20,7	41,9	36,0
Haut-Rhin	18,6	37,3	33,0
Vosges	24,0	42,6	39,0
Grand Est	21,8	42,6	37,0
France hexagonale	21,3	44,2	38,1

PRÉVENTION

Gestes barrières



Recommandations vaccinales

Recommandations vaccinales

Bronchiolite

Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncitial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :



- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS des nouveaux nés eux -même.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux



Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination a commencé le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

COVID-19



La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination a commencé le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës



La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines. Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.

BRONCHIOLITE CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 1 AN



Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



SYNDROMES GRIPPAUX



Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



COVID-19



Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)





Figure 7. Evolution de la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en Grand Est depuis la semaine 2025-15. (Source SUM'EAU)*.



* Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau de la région Grand Est à partir d'un suivi réalisé auprès de 5 stations de traitement des eaux usées selon une fréquence hebdomadaire. Les 5 stations suivies sont localisées à proximité des agglomérations de Reims, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse. L'indicateur eaux usées correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.

GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS



Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



MORTALITÉ TOUTES CAUSES

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 51-2025, Grand Est (Source : Insee, au 31/12/2025)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR®,
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes,
- Réseau Sentinelles,
- Systèmes de surveillance spécifiques :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées,
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg,
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
 - Observatoire des urgences Est-RESCUE,
 - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Christine Meffre, Sophie Raguet, Marion Rollin, Justine Trompette, Jenifer Yaï.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 01 janvier. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 pages, 2025.

Directrice de publication : Caroline SEMAILLE

Dépôt légal : 31 décembre 2025

Contact : grandest@santepubliquefrance.fr

Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr