

Bulletin

Surveillance épidémiologique

Date de publication : 14 janvier 2026

ÉDITION CORSE

Semaine 02-2026

Points clés de la semaine

Infections respiratoires aiguës (page 2)

Pour grippe/syndrome grippal, la part d'activité chez SOS Médecins diminuait après un pic enregistré en S52. La part d'activité dans les services d'urgences restait stable. Ces deux activités restaient à un niveau très élevé en S02.

En ce qui concerne la bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an, l'activité était faible chez SOS Médecins et aucun passage n'était enregistré dans les services d'urgence.

En conséquence :

- **grippe et syndromes grippaux** : 5^e semaine d'épidémie ;
- **bronchiolite (moins de 1 an)** : passage en **post-épidémie**.

En S02, l'ensemble des infections respiratoires aiguës basses représentait 25,3 % de l'activité de SOS Médecins et 10,9 % de l'activité des urgences.

Covid-19 : activité en baisse et faible chez SOS Médecins et aux urgences.




Niveau d'alerte régional*

Grippe et syndromes grippaux^{1, 2, 3}




■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Post-épidémie

Bronchiolite^{1, 2}



Taux de passages aux urgences

Covid-19²



<0.25%
0.25-0.5%
0.5-1%
1-2%
2-4%
>4%
ND

Mises à jour le 13/01/2026. * Antilles : niveau d'alerte pour la semaine précédente. ** Données non disponibles pour Mayotte.
Sources : ¹ SOS Médecins, ² OSCOUR®, ³ réseau Sentinelles + IQVIA.

Mortalité (page 10)

Pas de surmortalité observée.

Infections respiratoires aiguës

Synthèse de la semaine 02-2026

Grippe et syndromes grippaux

5^e semaine d'épidémie

Bronchiolite (moins de 1 an)

passage en post-épidémie

Covid-19

activité faible

En France hexagonale, l'ensemble des régions était en phase épidémique pour la grippe. Pour la bronchiolite, sept régions, dont la Corse, étaient en post-épidémie ; l'Ile-de-France était de retour au niveau de base .

Indicateurs clés

Part d'activité pour la pathologie (%)	Actes SOS Médecins			Passages aux urgences			Proportion d'hospitalisation après un passage		
	S01	S02	Variation (S/S-1)	S01	S02	Variation (S/S-1)	S01	S02	Variation (S/S-1)
bronchiolite (moins de 1 an)	8,5	12,0	↗*	8,8	0,0	↘	0,0	NC	NC
grippe/syndrome grippal	20,6	13,9	↘	6,4	6,3	→	23,3	19,3	↘
Covid-19 et suspicions	0,9	0,6	↘	0,3	0,1	↘*	50,0	0,0	↘*
pneumopathie aiguë	4,6	4,7	→	2,6	3,1	↗	78,7	72,2	↘
bronchite aiguë	8,1	6,0	↘	1,9	1,7	↘	25,7	6,7	↘
Total IRA basses**	34,0	25,3	↘	11,1	10,9	↘	36,5	29,8	↘

* évolutions à interpréter avec précaution au vu des faibles effectifs. NC : non calculable.

** les données sont en pourcentages, les valeurs de *Total IRA basses* ne sont donc pas la somme des valeurs par pathologie.

Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

En S02, 12,3 % des hospitalisations après passage aux urgences l'étaient pour un diagnostic d'infection respiratoire aiguë basse (vs 14,7 % la semaine précédente).




Niveau d'alerte régional*

Grippe et syndromes grippaux^{1, 2, 3}




■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Épidémie ■ Post-épidémie

Bronchiolite^{1, 2}



Taux de passages aux urgences**

Covid-19²



Mises à jour le 13/01/2026. * Antilles : niveau d'alerte pour la semaine précédente. ** Données non disponibles pour Mayotte.
 Sources : ¹ SOS Médecins, ² OSCOUR®, ³ réseau Sentinelles + IQVIA.

Grippe et syndromes grippaux

5^e semaine d'épidémie

En S02, la part d'activité de l'association SOS Médecins pour grippe/syndrome grippal diminuait fortement (tableau 1, figure 1). Dans les services d'urgence, l'activité s'est stabilisée. La proportion d'hospitalisation suite à un passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal était en diminution.

Le taux d'incidence pour syndrome grippal relevé par le réseau Sentinelles + IQVIA en S02, non encore consolidé, était de 359 pour 100 000 habitants [IC95% : 248 ; 470] vs 240 pour 100 000 habitants [155 ; 324] en S01.

Situation au niveau national : [cliquez ici](#)


Tableau 1 – Indicateurs de surveillance syndromique de la grippe/syndrome grippal en Corse (point au 13/01/2026)

ASSOCIATIONS SOS MÉDECINS	S52	S01	S02	Variation (S/S-1)
Nombre d'actes médicaux pour grippe/syndrome grippal	631	396	197	-50,3 %*
Proportion d'actes médicaux SOS Médecins pour grippe/syndrome grippal (%)	33,9	20,6	13,9	-6,7 pts*
SERVICES DES URGENCES DU RÉSEAU OSCOUR	S52	S01	S02	Variation (S/S-1)
Nombre de passages aux urgences pour grippe/syndrome grippal	175	116	109	-6,0 %
Proportion de passages aux urgences pour grippe/syndrome grippal (%)	9,1	6,4	6,3	-0,1 pt
Nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal	46	27	21	-22,2 %
Proportion d'hospitalisations après un passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal (%)	26,3	23,3	19,3	-4,0 pts

* différence significative (test du Khi2 ou Fisher selon les effectifs).

Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Figure 1 – Nombre et proportion d'actes médicaux SOS Médecins (A) et de passages aux urgences (B) pour grippe/syndrome grippal en Corse par rapport aux deux années précédentes (point au 13/01/2026)



Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Au 12 janvier, parmi les 86 prélèvements analysés par le laboratoire de virologie de l'Université de Corse depuis le début du mois d'octobre, 20 sont revenus positifs à la grippe (2 A(H₁N₁), 18 A(H₃N₂) et aucun B), dont 2 ont été identifiés en S02. Parmi les 10 prélèvements remontés par les laboratoires de ville du réseau Relab, tous âges confondus, 2 sont revenus positifs à un virus de la grippe en S01 (contre 1 positif sur 8 en S01).

Sur les 8 cas graves de grippe hospitalisés en réanimation et signalés par le CH d'Ajaccio, 2 étaient vaccinés et, pour les six autres, le statut vaccinal n'était pas connu. Il y avait 5 hommes et 3 femmes.

Vaccination antigrippale

Le tableau 2 synthétise les couvertures vaccinales contre la grippe estimées au 31 décembre 2025, au niveau hexagonal, régional et départemental, chez les 65 ans et plus et chez les moins de 65 ans à risque.

Ces estimations ont été réalisées uniquement parmi les bénéficiaires du régime général (les données des autres régimes étant chargées plus tardivement dans le système national des données de santé - SNDS). Les couvertures vaccinales sur l'ensemble des régimes seront produites à l'issue de la campagne de vaccination.

La couverture vaccinale en Corse chez les personnes de 65 ans et plus était de 5 points plus élevée cette année que l'an dernier à la même période et de 4 points plus élevée chez les moins de 65 ans à risque. La Corse restait toutefois la région hexagonale présentant les plus faibles couvertures vaccinales.

Chez les plus de 65 ans, 20 % des personnes ont reçu une dose de vaccin amélioré (Efluelda® ou Fluad®).

Tableau 2 – Estimation de la couverture vaccinale (%) contre la grippe des personnes à risque en Corse et France hexagonale pour la saison 2025-2026 (point au 31/12/2025)

	Moins 65 ans*	65 ans et plus		
		65-74 ans	75 ans et plus	Total
	(%)	(%)	(%)	(%)
2A – Corse-du-Sud	20	38	52	45
2B – Haute-Corse	20	38	53	46
Corse	20	38	53	46
France hexagonale	27	49	59	54

* Personnes de moins de 65 ans à risque.

Source : SNDS-DCIR régime général. Exploitation : Santé publique France

Bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an

Passage en post-épidémie

En S02, chez les enfants de moins de 1 an, l'activité pour bronchiolite dans l'association SOS Médecins d'Ajaccio augmentait légèrement, mais les effectifs étaient très faibles (tableau 3, figure 2). Aux urgences, aucun passage pour bronchiolite chez les moins de 1 an n'a été enregistré en S02. L'intensité était plus faible que celle observée l'an dernier à la même période.

Situation au niveau national : [cliquez ici](#)

Tableau 3 – Indicateurs de surveillance syndromique de la bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an en Corse (point au 13/01/2026)


ASSOCIATIONS SOS MÉDECINS	S52	S01	S02	Variation (S/S-1)
Nombre d'actes médicaux pour bronchiolite	12	5	3	-40,0 %
Proportion d'actes médicaux SOS Médecins pour bronchiolite (%)	20,3	8,5	12,0	+3,5 pts
SERVICES DES URGENCES DU RÉSEAU OSCOUR	S52	S01	S02	Variation (S/S-1)
Nombre de passages aux urgences pour bronchiolite	1	3	0	-100,0 %
Proportion de passages aux urgences pour bronchiolite (%)	2,9	8,8	0,0	-8,8 pts
Nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences pour bronchiolite	1	0	0	NC
Proportion d'hospitalisations après un passage aux urgences pour bronchiolite (%)	100,0	0,0	/	NC

Les pourcentages d'évolution sont à interpréter avec précaution au vu des faibles effectifs.

* NC : non calculable.

Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Figure 2 – Nombre et proportion d'actes médicaux SOS Médecins (A) et de passages aux urgences (B) pour bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an en Corse par rapport aux deux années précédentes (point au 13/01/2026)



Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Covid-19

En S02, l'activité dans l'association SOS Médecins, ainsi que dans les services d'urgences, pour suspicion de Covid-19 était en baisse. L'activité dans les deux réseaux restait inférieure à celle observée la saison dernière (tableau 4, figure 3). Aucune personne n'a été hospitalisée après un passage aux urgences pour suspicion de Covid-19.

Au 12 janvier, parmi les 86 prélevements analysés par le laboratoire de virologie de l'Université de Corse depuis le début du mois d'octobre, 9 sont revenus positifs au SARS-CoV-2 (+ 1 depuis le dernier bilan). Parmi les 10 prélevements remontés par les laboratoires de ville du réseau Relab, aucun n'était positif au SARS-CoV-2 (comme la semaine précédente).

En S02, une légère tendance à la hausse du niveau de circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées était observée. Cependant, ce résultat doit être interprété avec précaution et confirmé dans les semaines à venir (figure 4).


Situation au niveau national : [cliquez ici](#)

Tableau 4 – Indicateurs de surveillance syndromique de la Covid-19 en Corse (point au 13/01/2026)

ASSOCIATIONS SOS MÉDECINS	S52	S01	S02	Variation (S/S-1)
Nombre d'actes médicaux pour suspicion de Covid-19	14	17	9	-47,1 %
Proportion d'actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 (%)	0,8	0,9	0,6	-0,3 pt
SERVICES DES URGENCES DU RÉSEAU OSCOUR	S52	S01	S02	Variation (S/S-1)
Nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19	18	6	1	-83,3 %
Proportion de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 (%)	0,9	0,3	0,1	-0,2 pt
Nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences pour suspicion de Covid-19	3	3	0	-100,0 %
Proportion d'hospitalisations après un passage aux urgences pour suspicion de Covid-19 (%)	16,7	50,0	0,0	-50,0 pts


Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Figure 3 – Nombre et proportion d'actes médicaux SOS Médecins (A) et de passages aux urgences (B) pour suspicion de Covid-19 en Corse par rapport aux deux années précédentes (point au 13/01/2026)



Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Figure 4 – Circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, de S08-2024 à S02-2026, en Corse (point au 12/01/2026)



Prévention

Vaccination

La vaccination contre la grippe et la Covid-19 est recommandée chaque année à l'automne pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans, y compris les enfants dès l'âge de 6 mois, souffrant de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité (IMC ≥ 40), les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge.

La vaccination des soignants et des professionnels en contact régulier avec des personnes présentant un risque de grippe sévère (personnes âgées, nourrissons, malades, etc.) est également vivement recommandée.

La vaccination conjointe contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière est possible. Les deux vaccinations peuvent être pratiquées dans le même temps, sur deux sites d'injection différents.

Dans le calendrier des vaccinations 2025, il est recommandé la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus, et des personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (notamment BPCO) ou cardiaques (notamment insuffisance cardiaque) susceptibles de fortement s'aggraver lors d'une infection à VRS.

Prévention des infections à VRS du nourrisson

La campagne d'immunisation des nouveau-nés et nourrissons contre les infections à VRS comprend deux stratégies possibles : la vaccination de la femme enceinte ou l'immunisation des nourrissons par un anticorps monoclonal.

La vaccination de la femme enceinte est recommandée selon un schéma à une dose entre la 32^e et la 36^e semaine d'aménorrhée, à compter de la date de début de campagne. La vaccination contre le VRS chez les femmes enceintes immunodéprimées n'est pas recommandée. Dans ce cas, l'administration d'un anticorps monoclonal chez le nouveau-né, dès la naissance, ou chez le nourrisson est privilégiée.

Les anticorps monoclonaux disponibles sont :

- nirsevimab (Beyfortus[®])
- palivizumab (Synagis[®]) : la population éligible correspond aux nourrissons nés prématurés et/ou à risque particulier d'infections graves.

L'immunisation par les anticorps monoclonaux s'adresse :

- aux nourrissons nés depuis la date de début de la campagne 2025-26 et sous réserve que la mère n'ait pas été vaccinée et
- à ceux nés entre février et août 2025 à titre de rattrapage.

Pour les nourrissons exposés à leur deuxième saison de circulation du VRS, les anticorps monoclonaux sont également indiqués pour les nourrissons de moins de 24 mois vulnérables à une infection sévère due au VRS selon la Haute Autorité de Santé.

Gestes barrières

En complément des vaccinations et des traitements préventifs existants, l'adoption des gestes barrières reste indispensable pour se protéger et protéger son entourage de l'ensemble des maladies de l'hiver :

- mettre un masque dès les premiers symptômes (fièvre, nez qui coule ou toux), dans les lieux fréquentés ou en présence de personnes fragiles ;
- se laver correctement et régulièrement les mains ;
- aérer régulièrement les pièces.

Depuis le 25 octobre 2025, Santé publique France, aux côtés du ministère chargé de la Santé et de l'Assurance maladie, diffuse une campagne visant à encourager l'adoption de ces trois gestes barrière.



Méthodologie

La surveillance des IRA par Santé publique France est basée sur un dispositif multi sources territorialisé.

Ce bilan a été réalisé à partir des sources de données suivantes : l'association SOS Médecins d'Ajaccio (Covid-19, grippe et bronchiolite), le réseau Sentinelles (grippe uniquement), les services des urgences du réseau OSCOUR® (Covid-19, grippe et bronchiolite), les résultats des tests RT-PCR remontés par les laboratoires de ville (Relab), le laboratoire de virologie de l'université de Corse (Covid-19, grippe et bronchiolite) et le dispositif SUM'EAU (Covid-19 uniquement).

En Corse, l'association SOS Médecins couvre l'agglomération ajaccienne, le réseau RELAB couvre le centre et sud de l'île, et le dispositif SUM'EAU l'agglomération bastiaise.

Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. En Corse, le suivi est réalisé auprès d'une station de traitement des eaux usées, celle de l'agglomération bastiaise selon une fréquence hebdomadaire. L'indicateur 'eaux usées', disponible à partir de cette saison au niveau régional, correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.


À compter de la saison 2025-2026, la surveillance de la bronchiolite jusqu'à présent conduite chez les enfants de moins de 2 ans, est réalisée chez les nourrissons de moins de 1 an. Cette modification, prévue depuis plusieurs années, permet d'être davantage en accord avec les cas de bronchiolite décrits par la HAS. Les changements induits seront peu importants car la grande majorité des cas de bronchiolite sont rapportés chez les nourrissons de moins de 1 an.

Mortalité toutes causes

Synthèse de la semaine 01-2026


Aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé au niveau régional en S01 (figures 5 et 6).

Figure 5 – Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, tous âges confondus, 2019 à 2026, en Corse (point au 13/01/2026)



Source : Insee. Exploitation : Santé publique France.

Figure 6 – Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, chez les 75 ans et plus, 2019 à 2026, en Corse (point au 13/01/2026)



Source : Insee. Exploitation : Santé publique France.

Méthodologie

Dans la région, le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues de 33 communes transmettant leurs données d'état-civil sous forme dématérialisée. La couverture de la mortalité atteint 75 % dans la région. En raison des délais légaux de déclaration d'un décès à la commune et de remontée des informations d'état-civil à l'Insee, les effectifs de décès sont incomplets sur les 10 à 15 derniers jours. Les données de la dernière semaine ne sont pas présentées car en cours de consolidation.

Le nombre hebdomadaire attendu de décès est estimé à partir du modèle européen [EuroMOMO](#) (utilisé par 19 pays). Le modèle s'appuie sur 9 ans d'historique (depuis 2011) et exclut les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies).

Actualités

- **Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 6 janvier 2026, n°1**

Prévalence des troubles psychiatriques chez les hommes et femmes faisant usage de crack à Paris (Étude ANRS-Icone 2) : nécessité d'une adaptation de l'offre de soins

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

Partenaires

Santé publique France Paca-Corse remercie vivement tous ses partenaires pour leur collaboration et le temps consacré à la surveillance épidémiologique : les établissements de santé, notamment les services des urgences participant au réseau OSCOUR®, l'association SOS Médecins d'Ajaccio, les médecins participant au Réseau Sentinelles, les services de réanimation sentinelles, les établissement médico-sociaux, les laboratoires de biologie médicale, le CNR des arbovirus (IRBA - Marseille), le CNR des infections respiratoires dont la grippe et le SARS-CoV-2 (Lyon), l'équipe EA7310 (antenne Corse du Réseau Sentinelles) de l'université de Corse, Météo-France, l'Insee, le CépiDc de l'Inserm, le GRADeS Paca, l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que les équipes de Santé publique France (direction des régions, des maladies infectieuses et la direction appui, traitement et analyse de donnée).



Le point focal régional (PFR)

Alerter, signaler, déclarer

tout événement indésirable sanitaire, médico-social ou environnemental
maladies à déclaration obligatoire, épidémie
24h/24 - 7j/7

Tél 04 95 51 99 88

Fax 04 95 51 99 12

Courriel ars2a-alerte@ars.sante.fr



Participez à la surveillance de 9 indicateurs de santé :

Le réseau Sentinelles réunit plus de 1 300 médecins généralistes et une centaine de pédiatres répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. En partenariat avec Santé Publique France, le réseau **recueille, analyse et redistribue des données épidémiologiques** issues de l'activité des médecins « Sentinelles » à des fins de veille sanitaire.

La **surveillance continue** consiste à déclarer de façon hebdomadaire les cas vus en consultation, pour 10 indicateurs de santé (environ 10 minutes par semaine). **Nous réalisons également une surveillance virologique des IRA permettant de connaître et caractériser les virus circulant sur le territoire.** Cette surveillance est basée sur des **prélèvements salivaires**.

Actuellement une quinzaine de médecins généralistes et 1 pédiatre participent régulièrement à nos activités en **Corse**.

- Infections respiratoires aiguës
- Varicelle
- Diarrhées aiguës
- Zona
- IST bactériennes
- Maladie de Lyme
- Oreillons
- Actes suicidaires
- Coqueluche



Équipe de rédaction

Clémentine CALBA, Joël DENIAU, Florian FRANKE, Guillaume HEUZE, Yasemin INAC, Jean-Luc LASALLE, Quiterie MANO, Isabelle MERTENS-RONDELART, Dr Laurence PASCAL, Lauriane RAMALLI

Rédactrice en chef : Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Édition Corse. 14 janvier 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 11 pages, 2026.

Directrice de publication : Dr Caroline SEMAILLE

Date de publication : 14 janvier 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr