



Bulletin

Bulletin épidémiologique


Semaine 06 (du 02 février au 08 février 2026) - Date de publication : 12 février 2026

ÉDITION GRAND EST

Niveaux d'alerte

Syndromes grippaux

Bronchiolite (moins de 1 an)



Points clés

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5



Dans les services d'urgence, le nombre de passages pour bronchiolite demeure stable pour la cinquième semaine consécutive. En semaine 06-2026, la part des passages pour bronchiolite s'élève à 12,4 % de l'activité totale. Le nombre de consultations pour bronchiolite dans les associations SOS Médecins est quant à lui en baisse, et correspond à 5 % de l'ensemble des consultations.

Syndromes grippaux - p.6



Bien qu'en baisse tant au niveau des services d'urgence que des associations SOS Médecins, les recours aux soins pour syndrome grippal restent néanmoins à un niveau élevé en semaine 06-2026 (2,8 % des passages aux urgences et 13,3 % des consultations), et justifient le maintien de la région en phase épidémique.



COVID-19 - p.7

L'activité liée au Covid-19 fluctue à un niveau faible (moins de 0,5 % des passages aux urgences et des consultations SOS Médecins).



Gastro-entérites aiguës - p.9

Les passages aux urgences et les consultations SOS Médecins fluctuent à des niveaux habituels pour la saison.

Actualités

Cancer colorectal : prévention, dépistage et prise en charge dans les régions

Le BEH n°3-4 du 3 février 2026 est consacré à la prévention, au dépistage et à la prise en charge du cancer colorectal dans les régions.

Avec environ 47 000 nouveaux cas et plus de 17 000 décès chaque année en France, le cancer colorectal demeure un enjeu majeur de santé publique. Néanmoins, une stabilisation de l'incidence et une diminution de la mortalité spécifique ont été observées ces dernières années. Les actions de prévention et le déploiement du dépistage organisé ont probablement contribué à cette amélioration, bien que la participation reste insuffisante (30 à 35 %, en deçà de l'objectif européen de 45 %) et que des disparités territoriales persistent, notamment en matière d'accès au dépistage et de prise en charge.

Ce numéro du BEH présente dresse un panorama des enjeux actuels liés au cancer colorectal, notamment sur sa prévention.

👉 Consulter le BEH n°3-4 à l'adresse suivante :

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-colon-rectum/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-3-fevrier-2026-n-3-4-cancer-colorectal-prevention-depistage-et-prise-en-charge-dans-les-regions>

Prévention

Gestes barrière



**Toux ? Fièvre ? Nez qui coule ?
Mettons un masque.**

**Retrouvons le réflexe
des gestes barrières.**



**Porter
un masque**

+



**Se laver
les mains**

+



**Aérer
les pièces**



Recommandations vaccinales

Bronchiolite

Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :

- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS des nouveaux nés eux – même.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux



Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination a commencé le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

COVID-19



La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination a commencé le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës



La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.

Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an



Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Syndromes grippaux



Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



COVID-19



Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)





Figure 7. Evolution de la circulation du SARS-Cov-2 dans les eaux usées en Grand Est depuis la semaine 2025-21. (Source SUM'EAU).



* Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau de la région Grand Est à partir d'un suivi réalisé auprès de 5 stations de traitement des eaux usées selon une fréquence hebdomadaire. Les 5 stations suivies sont localisées à proximité des agglomérations de Reims, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse. L'indicateur eaux usées correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.

Gastro-entérites aiguës



Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Mortalité toutes causes

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 05-2026, Grand Est (Source : Insee, au 11/02/2026)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR® ;
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes ;
- Réseau Sentinelles ;
- Systèmes de surveillance spécifiques :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ;
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées ;
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg ;
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
 - Observatoire des urgences Est-RESCUE ;
 - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Christine Meffre, Sophie Raguét, Marion Rollin, Justine Trompette.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 12 février. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 pages, 2026. Directrice de publication : Caroline SEMAILLE

Dépôt légal : 12 février 2026

Contact : grandest@santepubliquefrance.fr

Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr