



Bulletin

Surveillance épidémiologique

Date de publication : 18 mars 2026

ÉDITION CORSE



Semaine 11-2026

Points clés de la semaine

Infections respiratoires aiguës (page 2)

Grippe et syndromes grippaux : épidémie terminée. Activité faible chez SOS Médecins et aux urgences.

Bronchiolite (moins de 1 an) : fin de l'épidémie. Activité en diminution chez SOS Médecins et aux urgences.

Covid-19 : activité très faible.

Les épidémies étant désormais terminées, ce point est le dernier de la saison 2025-2026. Un bilan de la surveillance des infections respiratoires aiguës au cours de la saison sera présenté dans le bulletin de la semaine prochaine.

Pollens et allergies (page 9)

L'exposition aux pollens était à un niveau modéré à élevé sur l'est, le centre et le sud de la Corse, faible sur le reste de l'île. L'activité pour allergie chez SOS Médecins restait stable, à un niveau habituel pour la saison.

Mortalité (page 11)

Pas de surmortalité observée.

Infections respiratoires aiguës

Synthèse de la semaine 11-2026

Grippe et syndromes grippaux

épidémie terminée

Bronchiolite (moins de 1 an)

fin de l'épidémie

Covid-19

activité très faible

En France hexagonale, les épidémies de grippe et bronchiolite sont terminées dans l'ensemble des régions.

Indicateurs clés

	Actes SOS Médecins			Passages aux urgences			Proportion d'hospitalisation après un passage		
Part d'activité pour la pathologie (%)	S10	S11	Variation (S/S-1)	S10	S11	Variation (S/S-1)	S10	S11	Variation (S/S-1)
bronchiolite (moins de 1 an)	10,8	7,1	↓	25,9	9,1	↓	28,6	50,0	↑*
grippe/syndrome grippal	4,1	2,0	↓	0,2	0,2	→	50,0	33,3	↓
Covid-19 et suspicions	0,2	0,6	↑*	0,1	0,1	→	100,0	50,0	↓*
pneumopathie aiguë	2,4	1,9	↓	1,3	1,8	↑	73,9	70,0	↓
bronchite aiguë	5,1	4,9	→	0,5	0,7	→	33,3	27,3	↓
Total IRA basses**	12,5	9,9	↓	2,6	3,0	→	55,6	54,2	↓

* évolutions à interpréter avec précaution au vu des faibles effectifs.

** les données sont en pourcentages, les valeurs de *Total IRA basses* ne sont donc pas la somme des valeurs par pathologie.

Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

En S11, 5,7 % des hospitalisations après passage aux urgences l'étaient pour un diagnostic d'infection respiratoire aiguë basse (vs 5,0 % la semaine précédente).




Niveau d'alerte régional*

Grippe et syndromes grippaux^{1, 2, 3}

Bronchiolite^{1, 2}

Taux de passages aux urgences**

Covid-19²



■ Pas d'alerte ■ Epidémie

Mises à jour le 17/03/2026. * Antilles et Guyane : niveau d'alerte pour la semaine précédente. ** Données non disponibles pour Mayotte.

Sources : ¹ SOS Médecins, ² OSCOUR®, ³ réseau Sentinelles + IQVIA.

Grippe et syndromes grippaux

Épidémie terminée

En S11, la part d'activité tous âges liée à la grippe/syndrome grippal diminuait de nouveau dans l'association SOS Médecins et restait faible aux urgences (tableau 1 et figure 1).

Le taux d'incidence pour syndrome grippal relevé par le réseau Sentinelles + IQVIA en S11, non encore consolidé, était de 25 pour 100 000 habitants [IC95% : 0 ; 89] vs 59 pour 100 000 habitants [16 ; 101] en S10.

En S11, comme depuis la S08, tous âges confondus, aucun prélèvement n'est revenu positif à un virus de la grippe parmi ceux analysés par les laboratoires de ville du réseau Relab. Aucun nouveau prélèvement n'a été reçu par le laboratoire de virologie de l'Université de Corse. Depuis début octobre, parmi les 38 prélèvements revenus positifs à la grippe, tous étaient de type A (3 A(H1N1) et 35 A(H3N2)).

Situation au niveau national : [cliquez ici](#)

Tableau 1 – Indicateurs de surveillance syndromique de la grippe/syndrome grippal en Corse (point au 17/03/2026)


ASSOCIATIONS SOS MÉDECINS	S09	S10	S11	Variation (S/S-1)
Nombre d'actes médicaux pour grippe/syndrome grippal	38	49	26	-46,9 %*
Proportion d'actes médicaux SOS Médecins pour grippe/syndrome grippal (%)	2,9	4,1	2,0	-2,1 pts*
SERVICES DES URGENCES DU RÉSEAU OSCOUR	S09	S10	S11	Variation (S/S-1)
Nombre de passages aux urgences pour grippe/syndrome grippal	16	4	3	-25,0 %
Proportion de passages aux urgences pour grippe/syndrome grippal (%)	1,0	0,2	0,2	+0,0 pt
Nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal	5	2	1	-50,0 %
Proportion d'hospitalisations après un passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal (%)	31,2	50,0	33,3	-16,7 pts

Les pourcentages d'évolution sont à interpréter avec précaution au vu des faibles effectifs.

* différence significative (test du Khi2 ou Fisher selon les effectifs).

Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Figure 1 – Nombre et proportion d'actes médicaux SOS Médecins (A) et de passages aux urgences (B) pour grippe/syndrome grippal en Corse par rapport aux deux années précédentes (point au 17/03/2026)



Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an

Épidémie terminée

En S11, l'activité pour bronchiolite chez les moins de 1 an diminuait dans l'association SOS Médecins d'Ajaccio et aux urgences, les effectifs étaient faibles (tableau 2 et figure 2). L'épidémie de bronchiolite est désormais terminée.

En S11, comme depuis la S09, tous âges confondus, aucun prélèvement n'est revenu positif au VRS parmi ceux analysés par les laboratoires de ville du réseau Relab. Aucun nouveau prélèvement n'a été reçu par le laboratoire de virologie de l'Université de Corse.

Situation au niveau national : [cliquez ici](#)


Tableau 2 – Indicateurs de surveillance syndromique de la bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an en Corse (point au 17/03/2026)

ASSOCIATIONS SOS MÉDECINS	S09	S10	S11	Variation (S/S-1)
Nombre d'actes médicaux pour bronchiolite	3	4	2	-50,0 %
Proportion d'actes médicaux SOS Médecins pour bronchiolite (%)	6,4	10,8	7,1	-3,7 pts
SERVICES DES URGENCES DU RÉSEAU OSCOUR	S09	S10	S11	Variation (S/S-1)
Nombre de passages aux urgences pour bronchiolite	5	7	2	-71,4 %
Proportion de passages aux urgences pour bronchiolite (%)	15,2	25,9	9,1	-16,8 pts
Nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences pour bronchiolite	2	2	1	-50,0 %
Proportion d'hospitalisations après un passage aux urgences pour bronchiolite (%)	40,0	28,6	50,0	+21,4 pts

Les pourcentages d'évolution sont à interpréter avec précaution au vu des faibles effectifs.

Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Figure 2 – Nombre et proportion d'actes médicaux SOS Médecins (A) et de passages aux urgences (B) pour bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an en Corse par rapport aux deux années précédentes (point au 17/03/2026)



Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Covid-19

En S11, l'activité pour suspicion de Covid-19 dans l'association SOS Médecins d'Ajaccio et dans les services d'urgences fluctuait à des niveaux très faibles (tableau 3, figure 3).

En S11, tous âges confondus, 1 prélèvement est revenu positif au SARS-CoV-2 parmi les 2 analysés par les laboratoires de ville du réseau Relab (0/4 en S10) et aucun nouveau prélèvement n'a été reçu par le laboratoire de virologie de l'Université de Corse.

La tendance à la baisse du niveau de circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées s'est poursuivie en S11 (à confirmer dans les semaines à venir) (figure 4).


Situation au niveau national : [cliquez ici](#)

Tableau 3 – Indicateurs de surveillance syndromique de la Covid-19 en Corse (point au 17/03/2026)

ASSOCIATIONS SOS MÉDECINS	S09	S10	S11	Variation (S/S-1)
Nombre d'actes médicaux pour suspicion de Covid-19	9	2	8	+300,0 %
Proportion d'actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 (%)	0,7	0,2	0,6	+0,4 pt
SERVICES DES URGENCES DU RÉSEAU OSCOUR	S09	S10	S11	Variation (S/S-1)
Nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19	2	1	2	+100,0 %
Proportion de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 (%)	0,1	0,1	0,1	+0,0 pt
Nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences pour suspicion de Covid-19	1	1	1	+0,0 %
Proportion d'hospitalisations après un passage aux urgences pour suspicion de Covid-19 (%)	50,0	100,0	50,0	-50,0 pts


Les pourcentages d'évolution sont à interpréter avec précaution au vu des faibles effectifs.
Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Figure 3 – Nombre et proportion d'actes médicaux SOS Médecins (A) et de passages aux urgences (B) pour suspicion de Covid-19 en Corse par rapport aux deux années précédentes (point au 17/03/2026)



Sources : SurSaUD® – SOS Médecins, OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

Figure 4 – Circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, de S08-2024 à S11-2026, en Corse (point au 17/03/2026)



Sources : SUM'EAU et OSCOUR®. Exploitation : Santé publique France.

IRA en réanimation

Cas graves de grippe, Covid-19 et VRS

Au 17 mars 2026, aucun nouveau cas grave de grippe, Covid-19 ou VRS n'a été signalé. Le bilan reste le même que celui de la semaine dernière : **16 cas graves de grippe** et **1 de Covid-19** ont été signalés depuis la S40 par les services de réanimation participant à la surveillance. Aucun cas d'infection à VRS n'a été signalé.

Prévention

Vaccination

La vaccination contre la grippe et la Covid-19 est recommandée chaque année à l'automne pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans, y compris les enfants dès l'âge de 6 mois, souffrant de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité ($\text{IMC} \geq 40$), les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial d'hébergement quel que soit leur âge.

La vaccination des soignants et des professionnels en contact régulier avec des personnes présentant un risque de grippe sévère (personnes âgées, nourrissons, malades, *etc.*) est également vivement recommandée.

La vaccination conjointe contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière est possible. Les deux vaccinations peuvent être pratiquées dans le même temps, sur deux sites d'injection différents.

Dans le calendrier des vaccinations 2025, il est recommandé la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus, et des personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (notamment BPCO) ou cardiaques (notamment insuffisance cardiaque) susceptibles de fortement s'aggraver lors d'une infection à VRS.

Prévention des infections à VRS du nourrisson

La campagne d'immunisation des nouveau-nés et nourrissons contre les infections à VRS comprend deux stratégies possibles : la vaccination de la femme enceinte ou l'immunisation des nourrissons par un anticorps monoclonal.

La vaccination de la femme enceinte est recommandée selon un schéma à une dose entre la 32^e et la 36^e semaine d'aménorrhée, à compter de la date de début de campagne. La vaccination contre le VRS chez les femmes enceintes immunodéprimées n'est pas recommandée. Dans ce cas, l'administration d'un anticorps monoclonal chez le nouveau-né, dès la naissance, ou chez le nourrisson est privilégiée.

Les anticorps monoclonaux disponibles sont :

- nirsevimab (Beyfortus®)
- palivizumab (Synagis®) : la population éligible correspond aux nourrissons nés prématurés et/ou à risque particulier d'infections graves.

L'immunisation par les anticorps monoclonaux s'adresse :

- aux nourrissons nés depuis la date de début de la campagne 2025-26 et sous réserve que la mère n'ait pas été vaccinée et
- à ceux nés entre février et août 2025 à titre de rattrapage.

Pour les nourrissons exposés à leur deuxième saison de circulation du VRS, les anticorps monoclonaux sont également indiqués pour les nourrissons de moins de 24 mois vulnérables à une infection sévère due au VRS selon la définition de la Haute Autorité de Santé.

Gestes barrières

En complément des vaccinations et des traitements préventifs existants, l'adoption des gestes barrières reste indispensable pour se protéger et protéger son entourage de l'ensemble des maladies de l'hiver :

- mettre un masque dès les premiers symptômes (fièvre, nez qui coule ou toux), dans les lieux fréquentés ou en présence de personnes fragiles ;
- se laver correctement et régulièrement les mains ;
- aérer régulièrement les pièces.

Depuis le 25 octobre 2025, Santé publique France, aux côtés du ministère chargé de la Santé et de l'Assurance maladie, diffuse une campagne visant à encourager l'adoption de ces trois gestes barrière.



Méthodologie

La surveillance des IRA par Santé publique France est basée sur un dispositif multi sources territorialisé.

Ce bilan a été réalisé à partir des sources de données suivantes : l'association SOS Médecins d'Ajaccio (Covid-19, grippe et bronchiolite), le réseau Sentinelles (grippe uniquement), les services des urgences du réseau OSCOUR® (Covid-19, grippe et bronchiolite), les résultats des tests RT-PCR remontés par les laboratoires de ville (Relab), le laboratoire de virologie de l'université de Corse (Covid-19, grippe et bronchiolite) et le dispositif SUM'EAU (Covid-19 uniquement).

En Corse, l'association SOS Médecins couvre l'agglomération ajaccienne, le réseau RELAB couvre le centre et sud de l'île et le dispositif SUM'EAU l'agglomération bastiaise.

Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. En Corse, le suivi est réalisé auprès d'une station de traitement des eaux usées, celle de l'agglomération bastiaise selon une fréquence hebdomadaire. L'indicateur 'eaux usées', disponible à partir de cette saison au niveau régional, correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.

À compter de la saison 2025-2026, la surveillance de la bronchiolite jusqu'à présent conduite chez les enfants de moins de 2 ans, est réalisée chez les nourrissons de moins de 1 an. Cette modification, prévue depuis plusieurs années, permet d'être davantage en accord avec les cas de bronchiolite décrits par la [HAS](#). Les changements induits seront peu importants car la grande majorité des cas de bronchiolite sont rapportés chez les nourrissons de moins de 1 an.

Exposition aux pollens, pouvant générer un risque allergique

En Corse, l'indice pollens, mis en place par Atmo France et les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, est à un **niveau modéré à élevé sur l'est, le centre et le sud de la Corse**, principalement en lien avec les pollens d'aulne. Dans le reste de l'île, le niveau est faible.

L'activité de l'association SOS Médecins d'Ajaccio relative aux allergies restait globalement stable en S11, à un niveau habituel pour la saison (tableau 4 et figure 5).


Plus d'informations : [site Internet d'AtmoFrance](#)
[site Cartopollen](#)

Tableau 4 - Indicateurs de surveillance syndromique de l'allergie en Corse (point au 17/03/2026)

ASSOCIATIONS SOS MÉDECINS	S09	S10	S11	Variation (S/S-1)
Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour allergie	31	23	26	+13 %
Proportion d'actes médicaux SOS Médecins pour allergie (%)	2,3	1,9	2,0	+0,1 pt

Les pourcentages d'évolution sont à interpréter avec précaution au vu des faibles effectifs.
Source : SOS Médecins. Exploitation : Santé publique France.

Figure 5 - Nombre et proportion d'actes médicaux SOS Médecins pour allergie en Corse par rapport aux 2 années précédentes (point au 17/03/2026)



Source : SOS Médecins. Exploitation : Santé publique France.

Prévention

Retrouvez sur le site du ministère chargé de la santé les conseils de prévention adaptés.

Recommandations pendant une période pollinique

Pour les personnes se sachant allergiques :

À LA MAISON	À L'EXTÉRIEUR
 • Rincez vos cheveux le soir	 • Éviter les activités extérieures qui entraînent une surexposition aux pollens : tonte du gazon, entretien du jardin, activités sportives, etc. En cas de nécessité, privilégiez la fin de journée et le port de lunettes de protection et d'un masque
 • Aérez au moins 10 mn par jour, de préférence avant le lever et après le coucher du soleil	 • Évitez de faire sécher le linge à l'extérieur
 • Évitez d'aggraver vos symptômes en ajoutant des facteurs irritants ou allergisants (tabac, produits d'entretien ou de bricolage, parfums d'intérieur, encens, bougies, etc.)	 • En cas de déplacement en voiture, gardez les vitres fermées

Pour les personnes ne se sachant pas allergiques :

Si vous présentez de façon gêne répétitive et saisonnière un ou plusieurs des symptômes suivants : crises d'éternuement, nez qui gratte, parfois bouché ou qui coule clair, yeux rouges, qui démangent ou qui larmoient, éventuellement une respiration sifflante ou une toux, vous souffrez peut-être d'une allergie aux pollens.

– L'allergie peut bénéficier de mesures de prévention et de soins. Pour cela **demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.**

Source : ministère en charge de la santé

Méthodologie


L'indice pollens, mis en place par Atmo France et les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, indique les seuils de concentration dans l'air de 6 taxons (l'ambroisie, l'aulne, l'armoise, le bouleau, les graminées et l'olivier) et prend en compte le caractère allergisant des différents pollens. Cet indice couvre l'ensemble du territoire hexagonal.

Les données sanitaires proviennent de l'association SOS Médecins d'Ajaccio (actes médicaux pour allergie).

Mortalité toutes causes


Aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé au niveau régional en S10 (figures 6 et 7).

Figure 6 – Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, tous âges confondus, 2019 à 2026, en Corse (point au 17/03/2026)



Source : Insee. Exploitation : Santé publique France.

Figure 7 – Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, chez les 75 ans et plus, 2019 à 2026, en Corse (point au 17/03/2026)



Source : Insee. Exploitation : Santé publique France.

Méthodologie

Dans la région, le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues de 33 communes transmettant leurs données d'état-civil sous forme dématérialisée. La couverture de la mortalité atteint 75 % dans la région. En raison des délais légaux de déclaration d'un décès à la commune et de remontée des informations d'état-civil à l'Insee, les effectifs de décès sont incomplets sur les 10 à 15 derniers jours. Les données de la dernière semaine ne sont pas présentées car en cours de consolidation.

Le nombre hebdomadaire attendu de décès est estimé à partir du modèle européen EuroMOMO (utilisé par 19 pays). Le modèle s'appuie sur 9 ans d'historique (depuis 2011) et exclut les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies).

Actualités

Publications impliquant des auteurs de Santé publique France Paca-Corse :

- **Guillois Y, Gorla S, Prudhomme J, Heuzé G, Roux J, Stempfelet M. Effets des abattoirs sur la dynamique de la Covid-19 : une analyse écologique dans le nord-ouest de la France.** Saint-Maurice : Santé publique France, 2025. 32 p.

Des clusters de Covid-19 sont apparus au début de la pandémie dans les abattoirs de l'Ouest de la France avec un risque de diffusion communautaire. L'étude évalue l'effet de la présence d'abattoirs sur la dynamique épidémique de la Covid-19 en Bretagne et Pays de la Loire entre le 8 juillet 2020 et le 7 décembre 2021.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

- **Ramalli L, Cogordan C, Fressard L, Donato X, Biferi M, Verlomme V et al. Sustained impact of motivational interviewing on reducing vaccine hesitancy among postpartum mothers: A randomized control trial, Southeastern France, 2021 to 2022.** Hum Vaccin Immunother. 2026 Dec;22(1):2611647. doi: 10.1080/21645515.2025.2611647. Epub 2026 Feb 2. PMID: 41628064; PMCID: PMC12867344.

Une étude randomisée menée dans deux maternités de la région Paca confirme l'efficacité des entretiens motivationnels pour réduire la réticence à la vaccination des parents et renforcer leur intention de vacciner leur nourrisson. Les effets positifs de ces entretiens menés par des sage-femmes persistent dans le temps.

Avec cette approche personnalisée et centrée sur l'humain, l'étude démontre qu'il est possible de restaurer durablement la confiance dans la vaccination de parents réticents. C'est une avancée majeure pour la santé publique et l'accompagnement des parents dans la vaccination de leur nourrisson.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

Autres communications :

- **Baromètre de Santé publique France 2026 : lancement de l'enquête.**

Santé publique France lance la 16^e édition du Baromètre de Santé publique France. Près de 80 000 personnes âgées de 18 à 79 ans sont invitées à participer à cette enquête.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

- **Hospitalisations et mortalité en lien avec une chute chez les personnes de 65 ans et plus en France. Données 2015-2024.**

En 2024, 174 824 hospitalisations en lien avec une chute ont été dénombrées chez les personnes âgées ≥65 ans et 20 148 personnes âgées de 65 ans et plus sont décédées en lien avec une chute.

L'augmentation du taux de mortalité entre 2020 et 2024 est plus importante que ce qui était attendu d'après les projections de la tendance 2015-2019, particulièrement pour les âges les plus avancés.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

- **Participation au programme de dépistage organisé du cancer colorectal. Période 2024-2025 et évolution depuis 2010.**

Le taux de participation-population cible est de 30,7 %, en légère hausse depuis la période précédente (29,6 % en 2023-2024) mais toujours inférieur au seuil européen acceptable (45 %).

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)

- **Cas de listériose en lien avec la consommation de produits de charcuterie prêts à manger de l'entreprise Drôme Ardèche Tradition.**

Santé publique France, en lien avec la Direction générale de l'Alimentation (DGAL) et le Centre National de Référence (CNR) des *Listeria*, ont mené des investigations ayant permis d'identifier la source de contamination de 12 patients atteints de listériose.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

Partenaires

Santé publique France Paca-Corse remercie vivement tous ses partenaires pour leur collaboration et le temps consacré à la surveillance épidémiologique :

les établissements de santé, notamment les services des urgences participant au réseau OSCOUR®, l'association SOS Médecins d'Ajaccio, les médecins participant au Réseau Sentinelles, les services de réanimation sentinelles, les établissements médico-sociaux, les laboratoires de biologie médicale, le CNR des arbovirus (IRBA - Marseille), le CNR des infections respiratoires dont la grippe et le SARS-CoV-2 (Lyon), l'équipe EA7310 (antenne Corse du Réseau Sentinelles) de l'université de Corse, Météo-France, l'Insee, le CéciDc de l'Inserm, le GRADeS Paca, l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que les équipes de Santé publique France (direction des régions, des maladies infectieuses et la direction appui, traitement et analyse de donnée).



Le point focal régional (PFR)

Alerter, signaler, déclarer

tout événement indésirable sanitaire, médico-social ou environnemental
maladies à déclaration obligatoire, épidémie
24h/24 - 7j/7

Tél 04 95 51 99 88

Fax 04 95 51 99 12

Courriel ars2a-alerte@ars.sante.fr



Participez à la surveillance de 9 indicateurs de santé :

Le **réseau Sentinelles** réunit plus de 1 300 médecins généralistes et une centaine de pédiatres répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. En partenariat avec Santé Publique France, le réseau **recueille, analyse et redistribue des données épidémiologiques** issues de l'activité des médecins « Sentinelles » à des fins de veille sanitaire.

La **surveillance continue** consiste à déclarer de façon hebdomadaire les cas vus en consultation, pour 10 indicateurs de santé (environ 10 minutes par semaine). **Nous réalisons également une surveillance virologique des IRA permettant de connaître et caractériser les virus circulant sur le territoire.** Cette surveillance est basée sur des prélèvements salivaires.

Actuellement une quinzaine de médecins généralistes et 1 pédiatre participent régulièrement à nos activités en Corse.

VENEZ RENFORCER LA REPRÉSENTATIVITÉ DE VOTRE RÉGION !

Si vous souhaitez participer à ces surveillances et aux travaux du réseau Sentinelles, merci de contacter par mail ou par téléphone :



Shirley MASSE
Réseau Sentinelles

Tél : 04 20 20 22 19

Tél : 01 44 73 84 35

Site Internet : www.sentinweb.fr

Mail : masse_s@univ-corse.fr

Mail : ps-animateurs@iplesp.upmc.fr



- Infections respiratoires aiguës
- Varicelle
- Diarrhées aiguës
- Zona
- IST bactériennes
- Maladie de Lyme
- Oreillons
- Actes suicidaires
- Coqueluche

Équipe de rédaction

Clémentine CALBA, Joël DENIAU, Florian FRANKE, Guillaume HEUZE, Yasemin INAC, Jean-Luc LASALLE, Quiterie MANO, Isabelle MERTENS-RONDELART, Dr Laurence PASCAL, Lauriane RAMALLI

Rédactrice en chef : Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Édition Corse. 18 mars 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 14 pages, 2026.

Directrice de publication : Dr Caroline SEMAILLE

Date de publication : 18 mars 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr