

2026

Spécificités vaccinales chez les enfants dans les DROM

(en plus du calendrier au dos)

| Âge approprié | Naissance | 12 mois | 16-18 mois | 24 mois | 6 à 16 ans |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| GUYANE | | | | | |
| BCG | | | | | |
| Hépatite B | | | | | |
| Fièvre jaune^{(1) (2)} | | | Si non réalisée avant | Si non réalisée avant | Si vaccination réalisée avant 2 ans |
| Dengue⁽³⁾ | | | | | |
| MAYOTTE | | | | | |
| BCG | | | | | |
| Hépatite B | | | | | |
| Dengue⁽³⁾ | | | | | |
| RÉUNION - ANTILLES | | | | | |
| Dengue⁽³⁾ | | | | | |

(1) Les enfants vaccinés entre 9 mois et avant l'âge de 2 ans bénéficieront d'une seconde dose à partir de l'âge de 6 ans et dans un délai maximal de 10 ans.

(2) Obligatoire pour les résidents de la Guyane âgés de plus de 12 mois ou toute personne y séjournant.

(3) Uniquement pour les enfants âgés de 6 à 16 ans résidant dans ces territoires et ayant la preuve d'une infection antérieure à la dengue (si le vaccin est disponible).



2026

Calendrier simplifié des vaccinations enfants et adultes

Vaccinations obligatoires pour les nourrissons

| Âge approprié | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 11 mois | 12 mois | 16-18 mois | 6 ans | 11-13 ans | 14 ans | 25 ans | 65 ans et + |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|-------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| BCG* | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP et Coqueluche | | | | | | | | | | | | | Tous les 20 ans | Tous les 10 ans |
| Hib | | | | | | | | | | | | | | |
| Hépatite B* | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumocoque | | | | | | | | | | | | | | |
| ROR | | | | | | | | | | | | | | |
| Méningocoques ACWY | | | | | | | | | | | | | | |
| Méningocoque B | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotavirus | | | | | | | | | | | | | | |
| HPV | | | | | | | | | | | | | | |
| Grippe | | | | | | | | | | | | | | Tous les ans |
| Covid-19 | | | | | | | | | | | | | | Tous les ans |
| Zona | | | | | | | | | | | | | | |
| VRS** | | | | | | | | | | | | | | 75 ans et + |

*Spécificité Guyane et Mayotte, voir au dos.

**Les nourrissons doivent être immunisés contre le VRS soit par vaccination de la femme enceinte, soit après leur naissance.