

Tableau 5.b. Déterminants cognitifs et affectifs des trois indicateurs d'adoption des mesures de prévention pendant la période postconfinement (associations ; données pondérées).

Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020



Période de recueil des données	Nombre de mesures d'hygiène (parmi 4) systématiquement adoptées <sup>1</sup>									Adoption systématique de la mesure "Garder une distance d'1 mètre"									Adoption systématique du port du masque en public								
	13-15 mai	18-20 mai	27-29 mai	8-10 juin	22-24 juin	6-8 juillet	20-22 juillet	24-26 août	21-23 sept.	13-15 mai	18-20 mai	27-29 mai	8-10 juin	22-24 juin	6-8 juillet	20-22 juillet	24-26 août	21-23 sept.	13-15 mai	18-20 mai	27-29 mai	8-10 juin	22-24 juin	6-8 juillet	20-22 juillet	24-26 août	21-23 sept.
Numéro de vague d'enquête	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15
Nombre de personnes interrogées	2000	2000	2000	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2002	2000	2000	2000	2000	
Bonne connaissance sur la transmission du SARS-CoV-2			**		*	**		--	--								--	--								--	--
Approbation et adoption des mesures par les proches	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**	***	***	***	***	***	***	***	***
Faible confiance dans les pouvoirs publics		***	*	**			***					*	*		***				**		*				*		
Mesures perçues comme efficaces <sup>a</sup>	**	*		*	*		***	*	*	*					***	*	*		**						**	**	
Mesures perçues comme peu contraignantes <sup>a</sup>	*				***	**	**		***					***			***		*			*		*	***	***	
Capacité à adopter les mesures mises en place	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**	***	***	***	***	***	***	***	**
Inquiétude à l'égard de l'épidémie de COVID-19				***									**					**					*	**		*	
Gravité perçue de la COVID-19	*	***	*		**																	**	***	*		**	
Se sentir vulnérable au risque d'infection par le Coronavirus (SARS-CoV-2)												*					*		*	***	***	*	***		*		

Notes : Pour chaque vague, l'association entre le facteur cognitif ou affectif et chacun des 3 indicateurs d'adoption des mesures de prévention a été testée, après ajustement sur l'ensemble des variables sociodémographiques, des variables liées à la situation épidémique et des autres facteurs cognitifs et affectifs (modèle de régression linéaire pour le nombre de mesures d'hygiène et de régression logistique pour l'adoption systématique des mesures "Garder une distance d'1 mètre" et "Porter un masque en public", test de Wald), \*\*\*: p<0,001 ; \*\*: p<0,01 ; \*: p<0,05 ; -- : données non disponibles. <sup>a</sup>De la Vague 2 à la Vague 13, la variable "Mesures perçues comme efficaces" (resp., "Mesures perçues comme contraignantes") correspond à la moyenne des réponses à 2 items : scores d'efficacité perçue (resp., de contrainte perçue) des mesures d'hygiène renforcée et de distanciation physique. A partir de la Vague 14, la variable d'efficacité perçue (resp. de contrainte perçue) est adaptée à l'indicateur d'adoption et mesuré par un seul item : efficacité (cout) des mesures d'hygiène (pour le nombre de mesures d'hygiène adoptées systématiquement), des mesures de distanciation physique (pour l'adoption systématique de la distance d'1 mètre) et du port du masque en public (pour l'adoption systématique du port du masque en public).

<sup>1</sup> 4 mesures d'hygiène : Se laver régulièrement les mains ; Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades ; Tousser dans son coude ; Utiliser un mouchoir à usage unique.

**Lecture du tableau :**

**Ex. 1 :** En vague 9, la vulnérabilité perçue à la COVID-19 était significativement associée (au seuil de 0,001) à l'adoption systématique du port du masque en public, après ajustement sur toutes les autres variables (sociodémographiques, liées à la situation épidémique, et cognitives et affectives).

**Ex. 2 :** Durant la période postconfinement et quelle que soit la vague, l'inquiétude à l'égard de l'épidémie de COVID-19 n'est associée à aucun des 3 indicateurs d'adoption systématique des mesures de prévention.

**Ex. 3 :** Durant la période postconfinement et quelle que soit la vague, la variable "Approbation et adoption des mesures par les proches" est associée aux 3 indicateurs d'adoption systématique des mesures de prévention. Les répondants percevant leurs proches comme adoptant et approuvant les mesures de prévention adoptent plus systématiquement ces mesures que les répondant déclarant que leurs proches ne les approuvent et ne les adoptent pas.