

Tableau 2. Moyennes et évolutions du nombre de mesures d'hygiène systématiquement adoptées selon les profils sociodémographiques et les conditions de vie liées à l'épidémie (données pondérées).

Source : *Enquête CoviPrev*, France métropolitaine, 2021

	Nombre de mesures d'hygiène adoptées systématiquement (parmi 4) <sup>1</sup>			
	Période de confinement 2			Postconfinement 2
	4-6 nov.	23-25 nov.	14-16 déc.	18-20 janv.
Période de recueil des données	4-6 nov.	23-25 nov.	14-16 déc.	18-20 janv.
Numéro de vague d'enquête	V17	V18	V19	V20
Nombre de personnes interrogées	2000	2000	2000	2000
<b>Profils sociodémographiques</b>	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.
<b>Ensemble</b>	<b>2,52</b>	<b>2,51</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>
<b>Sexe</b>	***	***	***	***
Homme	2,29	2,22	2,16	2,18
Femme	2,73	2,76	<b>2,63</b>	2,63
<b>Age</b>		*		**
De 18 à 24 ans	2,55	2,42	2,21	2,15
De 25 à 34 ans	2,35	2,42	2,30	2,31
De 35 à 49 ans	2,50	2,64	<b>2,42</b>	2,38
De 50 à 64 ans	2,62	2,55	2,49	2,48
65 ans et plus	2,54	2,41	2,45	2,56
<b>CSP en 2 classes (avec retraités et chômeurs recodés)</b>				
CSP +	2,47	2,44	2,36	2,46
CSP -	2,58	2,56	2,42	2,38
<b>Situation professionnelle</b>		**	***	*
Travail	2,52	2,55	<b>2,33</b>	2,43
Etudes	2,32	2,33	2,09	2,02
Chômage	2,47	2,41	2,46	2,29
Retraite	2,50	2,39	2,47	2,44
Inactif	2,78	2,79	2,83	2,53
<b>Situation financière perçue</b>		***	**	
Bonne situation financière	2,49	2,40	2,32	2,43
Situation financière juste	2,54	2,54	2,52	<b>2,32</b>
Situation financière très difficile	2,58	2,71	<b>2,50</b>	2,50
<b>Littératie en santé (évaluation de l'information en santé)<sup>2</sup></b>	***	***	***	***
Faible (< médiane)	2,35	2,36	<b>2,20</b>	2,20
Bonne (≥ médiane)	2,68	2,62	2,60	2,58
<b>Vit seul</b>		**		**
Non	2,55	2,55	<b>2,41</b>	2,47
Oui	2,42	2,33	2,38	2,23
<b>Parent d'enfant(s) de 16 ans ou moins</b>		**		
Non	2,52	2,44	2,39	2,39
Oui	2,53	2,65	<b>2,44</b>	2,48
<b>Présente un risque de développer une forme grave de COVID-19<sup>3</sup></b>			**	
Non	2,48	<b>2,50</b>	<b>2,35</b>	2,40
Oui	2,60	<b>2,52</b>	2,51	2,45
<b>Antécédents de trouble psychologique</b>				
Non	2,54	2,51	<b>2,40</b>	2,44
Oui	2,45	2,46	2,42	2,32
<b>Conditions de vie liées à l'épidémie</b>	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.
<b>Condition de travail (population active)</b>	*			*
En télétravail	2,26	2,42	2,37	2,59
En entreprise	2,56	2,55	<b>2,32</b>	2,42
Au chômage partiel	2,63	2,79	2,50	2,61
En arrêt de travail	2,70	2,75	2,26	1,94
<b>Logement avec forte promiscuité</b>				
Non	2,51	2,49	<b>2,39</b>	2,42
Oui	2,64	2,67	2,56	2,33
<b>Avoir un soutien moral ou affectif</b>	*	*	***	***
Non	2,45	2,43	<b>2,28</b>	2,29
Oui	2,59	2,58	2,57	2,52
<b>Avoir ou avoir eu des symptômes de la COVID-19</b>		*		
Non	--	2,48	2,42	2,41
Oui	--	2,62	<b>2,34</b>	2,43
<b>Anxiété<sup>4</sup></b>				
Pas d'anxiété	2,48	2,48	2,42	2,39
Anxiété probable	2,54	2,46	2,31	2,36
Anxiété certaine	2,63	2,64	2,46	2,54
<b>Dépression<sup>4</sup></b>	*	*	*	*
Pas de dépression	2,59	2,51	2,47	2,48
Dépression probable	2,36	2,42	2,32	2,27
Dépression certaine	2,51	2,60	<b>2,31</b>	2,42

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de 5%). **Les moyennes en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les moyennes en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.**

Les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables sociodémographiques et liées aux conditions de vie pendant l'épidémie (colonne de gauche) et le nombre moyen de mesures d'hygiène systématiquement adoptées pour chacune des vagues : \*\*\* : p<0,001 ; \*\* : p<0,01 ; \* : p<0,05.

<sup>1</sup> 4 mesures d'hygiène : se laver régulièrement les mains ; tousser dans son coude ; utiliser un mouchoir à usage unique ; aérer son logement au moins 2 fois par jour pendant 10 à 15 minutes.

<sup>2</sup> La littératie en santé désigne la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information pour prendre des décisions concernant leur santé (échelle *Health Literacy Questionnaire*)

<sup>3</sup> Facteurs de risque de développer une forme grave de COVID-19 : diabète ; hypertension artérielle ; problème respiratoire ou pulmonaire : bronchite chronique, BPCO, asthme, apnée du sommeil, mucoviscidose, insuffisance, emphysème ; problème cardiaque ou cardiovasculaire : insuffisance, angine de poitrine, antécédent d'infarctus, de pontage ou d'AVC, trouble du rythme cardiaque, cardiopathie congénitale, maladie des valves cardiaques, maladie des artères du cœur ; problème rénal : néphropathie, dialyse, syndrome néphrotique ; cancer avec traitement en cours ; obésité (IMC>30).

<sup>4</sup> HAD : *Hospital Anxiety and Depression scale*.

#### Lecture du tableau :

**Ex.** : En vague 17, le nombre moyen de mesures d'hygiène systématiquement adoptées (parmi 4 : se laver régulièrement les mains ; tousser dans son coude ; utiliser un mouchoir à usage unique ; aérer son logement au moins 2 fois par jour pendant 10 à 15 minutes) est différent selon le sexe. Les hommes adoptent en moyenne un nombre moins important de mesures d'hygiène que les femmes (2,29 vs 2,73).