

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 46 - Lot

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 4 286 | 1 937 | 2 349 | 1 335 | 1 589 | 602 | 760 |
| | 55-59 ans | 3 712 | 1 664 | 2 048 | 406 | 476 | 1 258 | 1 572 |
| | 60-64 ans | 4 309 | 1 947 | 2 362 | 478 | 486 | 1 469 | 1 876 |
| | 65-69 ans | 4 655 | 2 239 | 2 416 | 408 | 335 | 1 831 | 2 081 |
| | 70-74 ans | 3 264 | 1 513 | 1 751 | 202 | 182 | 1 311 | 1 569 |
| | 50-74 ans | 20 226 | 9 300 | 10 926 | 2 829 | 3 068 | 6 471 | 7 858 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 352 | 154 | 198 | 118 | 134 | 36 | 64 |
| | 55-59 ans | 320 | 161 | 159 | 42 | 43 | 119 | 116 |
| | 60-64 ans | 353 | 151 | 202 | 41 | 39 | 110 | 163 |
| | 65-69 ans | 356 | 177 | 179 | 31 | 30 | 146 | 149 |
| | 70-74 ans | 300 | 139 | 161 | 26 | 19 | 113 | 142 |
| | 50-74 ans | 1 681 | 782 | 899 | 258 | 265 | 524 | 634 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 287 | 123 | 164 | 90 | 109 | 33 | 55 |
| | 55-59 ans | 245 | 126 | 119 | 29 | 25 | 97 | 94 |
| | 60-64 ans | 298 | 125 | 173 | 28 | 28 | 97 | 145 |
| | 65-69 ans | 295 | 141 | 154 | 18 | 19 | 123 | 135 |
| | 70-74 ans | 225 | 107 | 118 | 17 | 11 | 90 | 107 |
| | 50-74 ans | 1 350 | 622 | 728 | 182 | 192 | 440 | 536 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 65 | 31 | 34 | 28 | 25 | 3 | 9 |
| | 55-59 ans | 75 | 35 | 40 | 13 | 18 | 22 | 22 |
| | 60-64 ans | 55 | 26 | 29 | 13 | 11 | 13 | 18 |
| | 65-69 ans | 61 | 36 | 25 | 13 | 11 | 23 | 14 |
| | 70-74 ans | 75 | 32 | 43 | 9 | 8 | 23 | 35 |
| | 50-74 ans | 331 | 160 | 171 | 76 | 73 | 84 | 98 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4 221 | 1 906 | 2 315 | 1 307 | 1 564 | 599 | 751 |
| | 55-59 ans | 3 637 | 1 629 | 2 008 | 393 | 458 | 1 236 | 1 550 |
| | 60-64 ans | 4 254 | 1 921 | 2 333 | 465 | 475 | 1 456 | 1 858 |
| | 65-69 ans | 4 594 | 2 203 | 2 391 | 395 | 324 | 1 808 | 2 067 |
| | 70-74 ans | 3 189 | 1 481 | 1 708 | 193 | 174 | 1 288 | 1 534 |
| | 50-74 ans | 19 895 | 9 140 | 10 755 | 2 753 | 2 995 | 6 387 | 7 760 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 150 | 86 | 64 | 58 | 48 | 28 | 16 |
| | 55-59 ans | 127 | 73 | 54 | 22 | 16 | 51 | 38 |
| | 60-64 ans | 165 | 101 | 64 | 34 | 11 | 67 | 53 |
| | 65-69 ans | 225 | 145 | 80 | 39 | 14 | 106 | 66 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 46 - Lot

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 177 | 92 | 85 | 16 | 10 | 76 | 75 |
| | 50-74 ans | 844 | 497 | 347 | 169 | 99 | 328 | 248 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 150 | 86 | 64 | 58 | 48 | 28 | 16 |
| | 55-59 ans | 127 | 73 | 54 | 22 | 16 | 51 | 38 |
| | 60-64 ans | 164 | 101 | 63 | 34 | 11 | 67 | 52 |
| | 65-69 ans | 225 | 145 | 80 | 39 | 14 | 106 | 66 |
| | 70-74 ans | 176 | 91 | 85 | 15 | 10 | 76 | 75 |
| | 50-74 ans | 842 | 496 | 346 | 168 | 99 | 328 | 247 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 138 | 81 | 57 | 54 | 42 | 27 | 15 |
| | 55-59 ans | 125 | 72 | 53 | 21 | 16 | 51 | 37 |
| | 60-64 ans | 156 | 96 | 60 | 32 | 10 | 64 | 50 |
| | 65-69 ans | 217 | 140 | 77 | 35 | 12 | 105 | 65 |
| | 70-74 ans | 170 | 88 | 82 | 13 | 9 | 75 | 73 |
| | 50-74 ans | 806 | 477 | 329 | 155 | 89 | 322 | 240 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 132 | 78 | 54 | 52 | 41 | 26 | 13 |
| | 55-59 ans | 123 | 71 | 52 | 20 | 16 | 51 | 36 |
| | 60-64 ans | 151 | 93 | 58 | 31 | 9 | 62 | 49 |
| | 65-69 ans | 214 | 139 | 75 | 35 | 11 | 104 | 64 |
| | 70-74 ans | 162 | 84 | 78 | 13 | 7 | 71 | 71 |
| | 50-74 ans | 782 | 465 | 317 | 151 | 84 | 314 | 233 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 46 - Lot

3/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 136 | 81 | 55 | 54 | 42 | 27 | 13 |
| | 55-59 ans | 125 | 72 | 53 | 21 | 16 | 51 | 37 |
| | 60-64 ans | 152 | 93 | 59 | 31 | 10 | 62 | 49 |
| | 65-69 ans | 215 | 139 | 76 | 35 | 11 | 104 | 65 |
| | 70-74 ans | 167 | 86 | 81 | 13 | 8 | 73 | 73 |
| | 50-74 ans | 795 | 471 | 324 | 154 | 87 | 317 | 237 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 138 | 81 | 57 | 54 | 42 | 27 | 15 |
| | 55-59 ans | 125 | 72 | 53 | 21 | 16 | 51 | 37 |
| | 60-64 ans | 156 | 96 | 60 | 32 | 10 | 64 | 50 |
| | 65-69 ans | 217 | 140 | 77 | 35 | 12 | 105 | 65 |
| | 70-74 ans | 170 | 88 | 82 | 13 | 9 | 75 | 73 |
| | 50-74 ans | 806 | 477 | 329 | 155 | 89 | 322 | 240 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 138 | 81 | 57 | 54 | 42 | 27 | 15 |
| | 55-59 ans | 125 | 72 | 53 | 21 | 16 | 51 | 37 |
| | 60-64 ans | 156 | 96 | 60 | 32 | 10 | 64 | 50 |
| | 65-69 ans | 217 | 140 | 77 | 35 | 12 | 105 | 65 |
| | 70-74 ans | 171 | 89 | 82 | 14 | 9 | 75 | 73 |
| | 50-74 ans | 807 | 478 | 329 | 156 | 89 | 322 | 240 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 36 | 21 | 15 | 13 | 13 | 8 | 2 |
| | 55-59 ans | 33 | 14 | 19 | 6 | 4 | 8 | 15 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 46 - Lot

4/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 38 | 13 | 25 | 5 | 4 | 8 | 21 |
| | 65-69 ans | 49 | 28 | 21 | 8 | 4 | 20 | 17 |
| | 70-74 ans | 38 | 17 | 21 | 3 | 2 | 14 | 19 |
| | 50-74 ans | 194 | 93 | 101 | 35 | 27 | 58 | 74 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 15 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| | 65-69 ans | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| | 70-74 ans | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | 50-74 ans | 79 | 43 | 36 | 15 | 6 | 28 | 30 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 18 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 24 | 14 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 |
| | 60-64 ans | 21 | 17 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 |
| | 65-69 ans | 35 | 25 | 10 | 7 | 2 | 18 | 8 |
| | 70-74 ans | 33 | 18 | 15 | 2 | 1 | 16 | 14 |
| | 50-74 ans | 131 | 83 | 48 | 28 | 12 | 55 | 36 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 45 | 30 | 15 | 18 | 11 | 12 | 4 |
| | 55-59 ans | 43 | 31 | 12 | 7 | 5 | 24 | 7 |
| | 60-64 ans | 59 | 43 | 16 | 14 | 3 | 29 | 13 |
| | 65-69 ans | 95 | 65 | 30 | 14 | 3 | 51 | 27 |
| | 70-74 ans | 59 | 32 | 27 | 3 | 2 | 29 | 25 |
| | 50-74 ans | 301 | 201 | 100 | 56 | 24 | 145 | 76 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 46 - Lot

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| | 65-69 ans | 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| | 70-74 ans | 20 | 14 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 |
| | 50-74 ans | 84 | 51 | 33 | 19 | 16 | 32 | 17 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 63 | 39 | 24 | 27 | 17 | 12 | 7 |
| | 55-59 ans | 67 | 45 | 22 | 13 | 8 | 32 | 14 |
| | 60-64 ans | 80 | 60 | 20 | 18 | 3 | 42 | 17 |
| | 65-69 ans | 130 | 90 | 40 | 21 | 5 | 69 | 35 |
| | 70-74 ans | 92 | 50 | 42 | 5 | 3 | 45 | 39 |
| | 50-74 ans | 432 | 284 | 148 | 84 | 36 | 200 | 112 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 46 - Lot

6/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 45 | 30 | 15 | 18 | 11 | 12 | 4 |
| | 55-59 ans | 43 | 31 | 12 | 7 | 5 | 24 | 7 |
| | 60-64 ans | 59 | 43 | 16 | 14 | 3 | 29 | 13 |
| | 65-69 ans | 95 | 65 | 30 | 14 | 3 | 51 | 27 |
| | 70-74 ans | 59 | 32 | 27 | 3 | 2 | 29 | 25 |
| | 50-74 ans | 301 | 201 | 100 | 56 | 24 | 145 | 76 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 41 | 28 | 13 | 17 | 10 | 11 | 3 |
| | 55-59 ans | 41 | 30 | 11 | 7 | 5 | 23 | 6 |
| | 60-64 ans | 50 | 34 | 16 | 10 | 3 | 24 | 13 |
| | 65-69 ans | 84 | 56 | 28 | 14 | 3 | 42 | 25 |
| | 70-74 ans | 52 | 29 | 23 | 3 | 1 | 26 | 22 |
| | 50-74 ans | 268 | 177 | 91 | 51 | 22 | 126 | 69 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 46 | 31 | 15 | 20 | 11 | 11 | 4 |
| | 55-59 ans | 44 | 32 | 12 | 8 | 5 | 24 | 7 |
| | 60-64 ans | 55 | 39 | 16 | 12 | 3 | 27 | 13 |
| | 65-69 ans | 95 | 64 | 31 | 16 | 3 | 48 | 28 |
| | 70-74 ans | 63 | 33 | 30 | 4 | 2 | 29 | 28 |
| | 50-74 ans | 303 | 199 | 104 | 60 | 24 | 139 | 80 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| | 65-69 ans | 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| | 70-74 ans | 20 | 14 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 |
| | 50-74 ans | 84 | 51 | 33 | 19 | 16 | 32 | 17 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 19 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| | 65-69 ans | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| | 70-74 ans | 18 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 46 - Lot

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 77 | 47 | 30 | 18 | 15 | 29 | 15 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 19 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| | 65-69 ans | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| | 70-74 ans | 18 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 77 | 47 | 30 | 18 | 15 | 29 | 15 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| | 70-74 ans | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| | 50-74 ans | 47 | 29 | 18 | 13 | 10 | 16 | 8 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 30 | 18 | 12 | 5 | 5 | 13 | 7 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 17 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 46 - Lot

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 15 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 19 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| | 65-69 ans | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| | 70-74 ans | 18 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 76 | 46 | 30 | 18 | 15 | 28 | 15 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 27 | 16 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 |

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 46 - Lot

9/14

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 6,0 | 8,4 |
| | 55-59 ans | 8,6 | 9,7 | 7,8 | 10,3 | 9,0 | 9,5 | 7,4 |
| | 60-64 ans | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 8,6 | 8,0 | 7,5 | 8,7 |
| | 65-69 ans | 7,6 | 7,9 | 7,4 | 7,6 | 9,0 | 8,0 | 7,2 |
| | 70-74 ans | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 12,9 | 10,4 | 8,6 | 9,1 |
| | 50-74 ans | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 8,1 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 3,8 | 1,7 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 2,7 | 2,3 | 0,9 | 1,0 |
| | 65-69 ans | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 3,2 | 3,3 | 1,3 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 4,5 | 4,4 | 1,8 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 1,3 | 1,2 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 81,5 | 79,9 | 82,8 | 76,3 | 81,3 | 91,7 | 85,9 |
| | 55-59 ans | 76,6 | 78,3 | 74,8 | 69,0 | 58,1 | 81,5 | 81,0 |
| | 60-64 ans | 84,4 | 82,8 | 85,6 | 68,3 | 71,8 | 88,2 | 89,0 |
| | 65-69 ans | 82,9 | 79,7 | 86,0 | 58,1 | 63,3 | 84,2 | 90,6 |
| | 70-74 ans | 75,0 | 77,0 | 73,3 | 65,4 | 57,9 | 79,6 | 75,4 |
| | 50-74 ans | 80,3 | 79,5 | 81,0 | 70,5 | 72,5 | 84,0 | 84,5 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,6 | 4,5 | 2,8 | 4,4 | 3,1 | 4,7 | 2,1 |
| | 55-59 ans | 3,5 | 4,5 | 2,7 | 5,6 | 3,5 | 4,1 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 3,9 | 5,3 | 2,7 | 7,3 | 2,3 | 4,6 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 6,6 | 3,3 | 9,9 | 4,3 | 5,9 | 3,2 |
| | 70-74 ans | 5,6 | 6,2 | 5,0 | 8,3 | 5,7 | 5,9 | 4,9 |
| | 50-74 ans | 4,2 | 5,4 | 3,2 | 6,1 | 3,3 | 5,1 | 3,2 |
| 50-74 ans ** | 4,1 | 5,2 | 3,2 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 99,4 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,1 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 70-74 ans | 99,4 | 98,9 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 50-74 ans | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 99,6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 46 - Lot

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 92,0 | 94,2 | 89,1 | 93,1 | 87,5 | 96,4 | 93,8 |
| | 55-59 ans | 98,4 | 98,6 | 98,1 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 97,4 |
| | 60-64 ans | 95,1 | 95,0 | 95,2 | 94,1 | 90,9 | 95,5 | 96,2 |
| | 65-69 ans | 96,4 | 96,6 | 96,3 | 89,7 | 85,7 | 99,1 | 98,5 |
| | 70-74 ans | 96,6 | 96,7 | 96,5 | 86,7 | 90,0 | 98,7 | 97,3 |
| | 50-74 ans | 95,7 | 96,2 | 95,1 | 92,3 | 89,9 | 98,2 | 97,2 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 95,7 | 96,3 | 94,7 | 96,3 | 97,6 | 96,3 | 86,7 |
| | 55-59 ans | 98,4 | 98,6 | 98,1 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 97,3 |
| | 60-64 ans | 96,8 | 96,9 | 96,7 | 96,9 | 90,0 | 96,9 | 98,0 |
| | 65-69 ans | 98,6 | 99,3 | 97,4 | 100,0 | 91,7 | 99,0 | 98,5 |
| | 70-74 ans | 95,3 | 95,5 | 95,1 | 100,0 | 77,8 | 94,7 | 97,3 |
| | 50-74 ans | 97,0 | 97,5 | 96,4 | 97,4 | 94,4 | 97,5 | 97,1 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 55-59 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 60-64 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 65-69 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 70-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 50-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 88 | 89 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 |
| | 55-59 ans | 96 | 107 | 82 | 143 | 69 | 92 | 88 |
| | 60-64 ans | 82 | 86 | 75 | 97 | 81 | 81 | 74 |
| | 65-69 ans | 83 | 85 | 77 | 94 | 89 | 83 | 75 |
| | 70-74 ans | 85 | 91 | 78 | 121 | 63 | 86 | 80 |
| | 50-74 ans | 86 | 91 | 80 | 102 | 81 | 85 | 79 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 79 (60-103) | 80 (60-100) | 77 (60-109) | 79,5 (59-97) | 77,5 (55-109) | 81 (61-114) | 77 (64-114) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 46 - Lot

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 75 (56-95) | 76 (59,5-98) | 71 (54-88) | 74 (61-117) | 70,5 (51-82) | 76 (59-97) | 75 (54-94) |
| | 60-64 ans | 73 (53-95) | 74,5 (53,5-98) | 71 (52-93) | 79,5 (54,5-115,5) | 88,5 (74-98) | 72 (52,5-90) | 66 (49-84) |
| | 65-69 ans | 76 (56-97) | 76,5 (58-97,5) | 75 (49-94) | 67 (48-94) | 82,5 (36-114) | 79 (60-98) | 74 (52-90) |
| | 70-74 ans | 71 (55-96) | 72 (54,5-97) | 69 (55-95) | 85 (78-154) | 61 (41-67) | 70 (54-93) | 71 (56-96) |
| | 50-74 ans | 75 (55-97) | 76 (56-98) | 72 (53,5-95) | 79 (56-103) | 74 (52-98) | 75 (56-97) | 71 (54-94) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 6,0 | 4,7 | 7,8 | 5,2 | 10,4 | 3,6 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 5,9 | 9,1 | 4,5 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 3,1 | 3,4 | 2,5 | 10,3 | 14,3 | 0,9 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 6,5 | 8,1 | 1,5 | 1,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 50-74 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 26,1 | 25,9 | 26,3 | 24,1 | 31,0 | 29,6 | 13,3 |
| | 55-59 ans | 26,4 | 19,4 | 35,8 | 28,6 | 25,0 | 15,7 | 40,5 |
| | 60-64 ans | 24,4 | 13,5 | 41,7 | 15,6 | 40,0 | 12,5 | 42,0 |
| | 65-69 ans | 22,6 | 20,0 | 27,3 | 22,9 | 33,3 | 19,0 | 26,2 |
| | 70-74 ans | 22,2 | 19,1 | 25,6 | 21,4 | 22,2 | 18,7 | 26,0 |
| | 50-74 ans | 24,0 | 19,5 | 30,7 | 22,4 | 30,3 | 18,0 | 30,8 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 10,9 | 12,3 | 8,8 | 13,0 | 7,1 | 11,1 | 13,3 |
| | 55-59 ans | 11,2 | 9,7 | 13,2 | 0,0 | 6,3 | 13,7 | 16,2 |
| | 60-64 ans | 10,9 | 10,4 | 11,7 | 12,5 | 0,0 | 9,4 | 14,0 |
| | 65-69 ans | 8,3 | 7,9 | 9,1 | 8,6 | 0,0 | 7,6 | 10,8 |
| | 70-74 ans | 8,8 | 5,6 | 12,2 | 7,1 | 22,2 | 5,3 | 11,0 |
| | 50-74 ans | 9,8 | 9,0 | 10,9 | 9,6 | 6,7 | 8,7 | 12,5 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 2,4 | 3,7 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 46 - Lot

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,8 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 13,0 | 11,1 | 15,8 | 16,7 | 14,3 | 0,0 | 20,0 |
| | 55-59 ans | 19,2 | 19,4 | 18,9 | 28,6 | 18,8 | 15,7 | 18,9 |
| | 60-64 ans | 13,5 | 17,7 | 6,7 | 12,5 | 0,0 | 20,3 | 8,0 |
| | 65-69 ans | 16,1 | 17,9 | 13,0 | 20,0 | 16,7 | 17,1 | 12,3 |
| | 70-74 ans | 19,3 | 20,2 | 18,3 | 14,3 | 11,1 | 21,3 | 19,2 |
| | 50-74 ans | 16,2 | 17,4 | 14,6 | 17,9 | 13,5 | 17,1 | 15,0 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 32,6 | 37,0 | 26,3 | 33,3 | 26,2 | 44,4 | 26,7 |
| | 55-59 ans | 34,4 | 43,1 | 22,6 | 33,3 | 31,3 | 47,1 | 18,9 |
| | 60-64 ans | 37,8 | 44,8 | 26,7 | 43,8 | 30,0 | 45,3 | 26,0 |
| | 65-69 ans | 43,8 | 46,4 | 39,0 | 40,0 | 25,0 | 48,6 | 41,5 |
| | 70-74 ans | 34,5 | 36,0 | 32,9 | 21,4 | 22,2 | 38,7 | 34,2 |
| | 50-74 ans | 37,3 | 42,1 | 30,4 | 35,9 | 27,0 | 45,0 | 31,7 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 14,5 | 12,3 | 17,5 | 13,0 | 16,7 | 11,1 | 20,0 |
| | 55-59 ans | 7,2 | 8,3 | 5,7 | 9,5 | 12,5 | 7,8 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 10,3 | 10,4 | 10,0 | 6,3 | 30,0 | 12,5 | 6,0 |
| | 65-69 ans | 8,8 | 7,9 | 10,4 | 8,6 | 25,0 | 7,6 | 7,7 |
| | 70-74 ans | 11,7 | 15,7 | 7,3 | 35,7 | 11,1 | 12,0 | 6,8 |
| | 50-74 ans | 10,4 | 10,7 | 10,0 | 12,2 | 18,0 | 9,9 | 7,1 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,4 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,4 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 2,7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 46 - Lot

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 1,7 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 14,9 | 20,5 | 10,4 | 20,7 | 10,9 | 20,0 | 9,3 |
| | 55-59 ans | 18,4 | 27,6 | 11,0 | 33,1 | 17,5 | 25,9 | 9,0 |
| | 60-64 ans | 18,8 | 31,2 | 8,6 | 38,7 | 6,3 | 28,8 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 28,3 | 40,9 | 16,7 | 53,2 | 15,4 | 38,2 | 16,9 |
| | 70-74 ans | 28,8 | 33,8 | 24,6 | 25,9 | 17,2 | 34,9 | 25,4 |
| | 50-74 ans | 21,7 | 31,1 | 13,8 | 30,5 | 12,0 | 31,3 | 14,4 |
| | 50-74 ans ** | 21,0 | 29,4 | 13,3 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 10,7 | 15,7 | 6,5 | 13,8 | 7,0 | 20,0 | 5,3 |
| | 55-59 ans | 11,8 | 19,0 | 6,0 | 17,8 | 10,9 | 19,4 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 13,9 | 22,4 | 6,9 | 30,1 | 6,3 | 19,9 | 7,0 |
| | 65-69 ans | 20,7 | 29,5 | 12,5 | 35,4 | 9,3 | 28,2 | 13,1 |
| | 70-74 ans | 18,5 | 21,6 | 15,8 | 15,5 | 11,5 | 22,5 | 16,3 |
| | 50-74 ans | 15,1 | 22,0 | 9,3 | 20,3 | 8,0 | 22,7 | 9,8 |
| | 50-74 ans ** | 14,5 | 20,8 | 8,8 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,7 | 14,7 | 5,6 | 13,0 | 6,4 | 18,4 | 4,0 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 18,4 | 5,5 | 17,8 | 10,9 | 18,6 | 3,9 |
| | 60-64 ans | 11,8 | 17,7 | 6,9 | 21,5 | 6,3 | 16,5 | 7,0 |
| | 65-69 ans | 18,3 | 25,4 | 11,7 | 35,4 | 9,3 | 23,2 | 12,1 |
| | 70-74 ans | 16,3 | 19,6 | 13,5 | 15,5 | 5,7 | 20,2 | 14,3 |
| | 50-74 ans | 13,5 | 19,4 | 8,5 | 18,5 | 7,3 | 19,7 | 8,9 |
| | 50-74 ans ** | 13,0 | 18,5 | 8,0 | - | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 46 - Lot

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 10,9 | 16,3 | 6,5 | 15,3 | 7,0 | 18,4 | 5,3 |
| | 55-59 ans | 12,1 | 19,6 | 6,0 | 20,4 | 10,9 | 19,4 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 12,9 | 20,3 | 6,9 | 25,8 | 6,3 | 18,5 | 7,0 |
| | 65-69 ans | 20,7 | 29,1 | 13,0 | 40,5 | 9,3 | 26,5 | 13,5 |
| | 70-74 ans | 19,8 | 22,3 | 17,6 | 20,7 | 11,5 | 22,5 | 18,3 |
| | 50-74 ans | 15,2 | 21,8 | 9,7 | 21,8 | 8,0 | 21,8 | 10,3 |
| | 50-74 ans ** | 14,7 | 20,7 | 9,1 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,7 | 5,2 | 4,3 | 5,4 | 4,5 | 5,0 | 4,0 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 3,7 | 1,5 | 5,1 | 4,4 | 3,2 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 3,8 | 5,2 | 2,6 | 4,3 | 6,3 | 5,5 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 5,0 | 3,3 | 7,6 | 9,3 | 4,4 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 6,3 | 9,5 | 3,5 | 25,9 | 5,7 | 7,0 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 4,2 | 5,6 | 3,1 | 6,9 | 5,3 | 5,0 | 2,2 |
| | 50-74 ans ** | 4,1 | 5,4 | 3,0 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)