

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 15 - Cantal

1/14

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|--|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 2 613 | 1 177 | 1 436 | 722 | 855 | 455 | 581 |
| | 55-59 ans | 2 797 | 1 282 | 1 515 | 207 | 209 | 1 075 | 1 306 |
| | 60-64 ans | 3 220 | 1 445 | 1 775 | 208 | 177 | 1 237 | 1 598 |
| | 65-69 ans | 3 486 | 1 576 | 1 910 | 142 | 134 | 1 434 | 1 776 |
| | 70-74 ans | 2 693 | 1 168 | 1 525 | 94 | 82 | 1 074 | 1 443 |
| | 50-74 ans | 14 809 | 6 648 | 8 161 | 1 373 | 1 457 | 5 275 | 6 704 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 186 | 84 | 102 | 64 | 80 | 20 | 22 |
| | 55-59 ans | 195 | 94 | 101 | 27 | 26 | 67 | 75 |
| | 60-64 ans | 207 | 100 | 107 | 17 | 21 | 83 | 86 |
| | 65-69 ans | 206 | 92 | 114 | 17 | 11 | 75 | 103 |
| | 70-74 ans | 153 | 67 | 86 | 10 | 5 | 57 | 81 |
| | 50-74 ans | 947 | 437 | 510 | 135 | 143 | 302 | 367 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 148 | 67 | 81 | 48 | 61 | 19 | 20 |
| | 55-59 ans | 163 | 83 | 80 | 22 | 18 | 61 | 62 |
| | 60-64 ans | 164 | 75 | 89 | 10 | 17 | 65 | 72 |
| | 65-69 ans | 168 | 72 | 96 | 12 | 8 | 60 | 88 |
| | 70-74 ans | 111 | 50 | 61 | 7 | 2 | 43 | 59 |
| | 50-74 ans | 754 | 347 | 407 | 99 | 106 | 248 | 301 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 38 | 17 | 21 | 16 | 19 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 32 | 11 | 21 | 5 | 8 | 6 | 13 |
| | 60-64 ans | 43 | 25 | 18 | 7 | 4 | 18 | 14 |
| | 65-69 ans | 38 | 20 | 18 | 5 | 3 | 15 | 15 |
| | 70-74 ans | 42 | 17 | 25 | 3 | 3 | 14 | 22 |
| | 50-74 ans | 193 | 90 | 103 | 36 | 37 | 54 | 66 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 2 575 | 1 160 | 1 415 | 706 | 836 | 454 | 579 |
| | 55-59 ans | 2 765 | 1 271 | 1 494 | 202 | 201 | 1 069 | 1 293 |
| | 60-64 ans | 3 177 | 1 420 | 1 757 | 201 | 173 | 1 219 | 1 584 |
| | 65-69 ans | 3 448 | 1 556 | 1 892 | 137 | 131 | 1 419 | 1 761 |
| | 70-74 ans | 2 651 | 1 151 | 1 500 | 91 | 79 | 1 060 | 1 421 |
| | 50-74 ans | 14 616 | 6 558 | 8 058 | 1 337 | 1 420 | 5 221 | 6 638 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 84 | 47 | 37 | 28 | 20 | 19 | 17 |
| | 55-59 ans | 89 | 49 | 40 | 13 | 6 | 36 | 34 |
| | 60-64 ans | 103 | 50 | 53 | 11 | 7 | 39 | 46 |
| | 65-69 ans | 147 | 92 | 55 | 7 | 8 | 85 | 47 |
| | 70-74 ans | 144 | 88 | 56 | 11 | 7 | 77 | 49 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 15 - Cantal

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 567 | 326 | 241 | 70 | 48 | 256 | 193 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 84 | 47 | 37 | 28 | 20 | 19 | 17 |
| | 55-59 ans | 89 | 49 | 40 | 13 | 6 | 36 | 34 |
| | 60-64 ans | 101 | 49 | 52 | 11 | 7 | 38 | 45 |
| | 65-69 ans | 147 | 92 | 55 | 7 | 8 | 85 | 47 |
| | 70-74 ans | 143 | 87 | 56 | 11 | 7 | 76 | 49 |
| | 50-74 ans | 564 | 324 | 240 | 70 | 48 | 254 | 192 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 82 | 47 | 35 | 28 | 18 | 19 | 17 |
| | 55-59 ans | 86 | 47 | 39 | 11 | 6 | 36 | 33 |
| | 60-64 ans | 92 | 42 | 50 | 8 | 6 | 34 | 44 |
| | 65-69 ans | 142 | 90 | 52 | 7 | 8 | 83 | 44 |
| | 70-74 ans | 134 | 81 | 53 | 10 | 6 | 71 | 47 |
| | 50-74 ans | 536 | 307 | 229 | 64 | 44 | 243 | 185 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 82 | 47 | 35 | 28 | 18 | 19 | 17 |
| | 55-59 ans | 85 | 46 | 39 | 11 | 6 | 35 | 33 |
| | 60-64 ans | 90 | 41 | 49 | 8 | 6 | 33 | 43 |
| | 65-69 ans | 137 | 87 | 50 | 7 | 7 | 80 | 43 |
| | 70-74 ans | 132 | 80 | 52 | 9 | 6 | 71 | 46 |
| | 50-74 ans | 526 | 301 | 225 | 63 | 43 | 238 | 182 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 82 | 47 | 35 | 28 | 18 | 19 | 17 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 15 - Cantal

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|--|------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 86 | 47 | 39 | 11 | 6 | 36 | 33 |
| | 60-64 ans | 92 | 42 | 50 | 8 | 6 | 34 | 44 |
| | 65-69 ans | 139 | 88 | 51 | 7 | 8 | 81 | 43 |
| | 70-74 ans | 133 | 81 | 52 | 10 | 6 | 71 | 46 |
| | 50-74 ans | 532 | 305 | 227 | 64 | 44 | 241 | 183 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 82 | 47 | 35 | 28 | 18 | 19 | 17 |
| | 55-59 ans | 86 | 47 | 39 | 11 | 6 | 36 | 33 |
| | 60-64 ans | 92 | 42 | 50 | 8 | 6 | 34 | 44 |
| | 65-69 ans | 138 | 88 | 50 | 7 | 7 | 81 | 43 |
| | 70-74 ans | 132 | 80 | 52 | 9 | 6 | 71 | 46 |
| | 50-74 ans | 530 | 304 | 226 | 63 | 43 | 241 | 183 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 82 | 47 | 35 | 28 | 18 | 19 | 17 |
| | 55-59 ans | 86 | 47 | 39 | 11 | 6 | 36 | 33 |
| | 60-64 ans | 92 | 42 | 50 | 8 | 6 | 34 | 44 |
| | 65-69 ans | 142 | 90 | 52 | 7 | 8 | 83 | 44 |
| | 70-74 ans | 134 | 81 | 53 | 10 | 6 | 71 | 47 |
| | 50-74 ans | 536 | 307 | 229 | 64 | 44 | 243 | 185 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 37 | 18 | 19 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| | 55-59 ans | 34 | 13 | 21 | 4 | 4 | 9 | 17 |
| | 60-64 ans | 41 | 12 | 29 | 2 | 4 | 10 | 25 |
| | 65-69 ans | 46 | 27 | 19 | 1 | 2 | 26 | 17 |
| | 70-74 ans | 44 | 19 | 25 | 1 | 1 | 18 | 24 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 15 - Cantal

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 202 | 89 | 113 | 17 | 21 | 72 | 92 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 37 | 26 | 11 | 8 | 3 | 18 | 8 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| | 60-64 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| | 65-69 ans | 32 | 22 | 10 | 2 | 1 | 20 | 9 |
| | 70-74 ans | 26 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 |
| | 50-74 ans | 92 | 60 | 32 | 10 | 3 | 50 | 29 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 21 | 15 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 |
| | 55-59 ans | 28 | 22 | 6 | 5 | 2 | 17 | 4 |
| | 60-64 ans | 25 | 15 | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 |
| | 65-69 ans | 43 | 28 | 15 | 3 | 2 | 25 | 13 |
| | 70-74 ans | 46 | 31 | 15 | 5 | 2 | 26 | 13 |
| | 50-74 ans | 163 | 111 | 52 | 27 | 11 | 84 | 41 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 15 - Cantal

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 34 | 18 | 16 | 1 | 5 | 17 | 11 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 30 | 20 | 10 | 13 | 5 | 7 | 5 |
| | 55-59 ans | 40 | 27 | 13 | 7 | 2 | 20 | 11 |
| | 60-64 ans | 38 | 23 | 15 | 5 | 2 | 18 | 13 |
| | 65-69 ans | 75 | 50 | 25 | 5 | 3 | 45 | 22 |
| | 70-74 ans | 72 | 51 | 21 | 7 | 2 | 44 | 19 |
| | 50-74 ans | 255 | 171 | 84 | 37 | 14 | 134 | 70 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 21 | 15 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 |
| | 55-59 ans | 28 | 22 | 6 | 5 | 2 | 17 | 4 |
| | 60-64 ans | 25 | 15 | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 |
| | 65-69 ans | 43 | 28 | 15 | 3 | 2 | 25 | 13 |
| | 70-74 ans | 46 | 31 | 15 | 5 | 2 | 26 | 13 |
| | 50-74 ans | 163 | 111 | 52 | 27 | 11 | 84 | 41 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 15 - Cantal

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 18 | 12 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 20 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 |
| | 60-64 ans | 22 | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| | 65-69 ans | 31 | 23 | 8 | 2 | 2 | 21 | 6 |
| | 70-74 ans | 33 | 24 | 9 | 3 | 1 | 21 | 8 |
| | 50-74 ans | 124 | 87 | 37 | 22 | 9 | 65 | 28 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 21 | 14 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| | 55-59 ans | 26 | 21 | 5 | 4 | 1 | 17 | 4 |
| | 60-64 ans | 25 | 14 | 11 | 4 | 2 | 10 | 9 |
| | 65-69 ans | 42 | 31 | 11 | 3 | 2 | 28 | 9 |
| | 70-74 ans | 39 | 29 | 10 | 4 | 1 | 25 | 9 |
| | 50-74 ans | 153 | 109 | 44 | 25 | 10 | 84 | 34 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| | 50-74 ans | 34 | 18 | 16 | 1 | 5 | 17 | 11 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| | 50-74 ans | 32 | 17 | 15 | 1 | 5 | 16 | 10 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 15 - Cantal

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| | 50-74 ans | 31 | 16 | 15 | 1 | 5 | 15 | 10 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 23 | 11 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 15 - Cantal

| Effectifs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| | 50-74 ans | 32 | 17 | 15 | 1 | 5 | 16 | 10 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 20 | 11 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 |

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 15 - Cantal

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 8,9 | 9,4 | 4,4 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 13,0 | 12,4 | 6,2 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 6,4 | 6,9 | 6,0 | 8,2 | 11,9 | 6,7 | 5,4 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 12,0 | 8,2 | 5,2 | 5,8 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 10,6 | 6,1 | 5,3 | 5,6 |
| | 50-74 ans | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 9,8 | 9,8 | 5,7 | 5,5 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 3,8 | 0,6 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 3,4 | 2,3 | 1,5 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 3,5 | 2,2 | 1,0 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 3,2 | 3,7 | 1,3 | 1,5 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 2,5 | 1,0 | 1,0 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 79,6 | 79,8 | 79,4 | 75,0 | 76,3 | 95,0 | 90,9 |
| | 55-59 ans | 83,6 | 88,3 | 79,2 | 81,5 | 69,2 | 91,0 | 82,7 |
| | 60-64 ans | 79,2 | 75,0 | 83,2 | 58,8 | 81,0 | 78,3 | 83,7 |
| | 65-69 ans | 81,6 | 78,3 | 84,2 | 70,6 | 72,7 | 80,0 | 85,4 |
| | 70-74 ans | 72,5 | 74,6 | 70,9 | 70,0 | 40,0 | 75,4 | 72,8 |
| | 50-74 ans | 79,6 | 79,4 | 79,8 | 73,3 | 74,1 | 82,1 | 82,0 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,3 | 4,1 | 2,6 | 4,0 | 2,4 | 4,2 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 3,2 | 3,9 | 2,7 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 2,6 |
| | 60-64 ans | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,2 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 4,3 | 5,9 | 2,9 | 5,1 | 6,1 | 6,0 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 5,4 | 7,6 | 3,7 | 12,1 | 8,9 | 7,3 | 3,4 |
| | 50-74 ans | 3,9 | 5,0 | 3,0 | 5,2 | 3,4 | 4,9 | 2,9 |
| 50-74 ans ** | 3,8 | 4,6 | 2,9 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 98,1 | 98,0 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 97,8 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 70-74 ans | 99,3 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 100,0 |
| | 50-74 ans | 99,5 | 99,4 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,5 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 97,6 | 100,0 | 94,6 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 96,6 | 95,9 | 97,5 | 84,6 | 100,0 | 100,0 | 97,1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 15 - Cantal

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|--|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 91,1 | 85,7 | 96,2 | 72,7 | 85,7 | 89,5 | 97,8 |
| | 65-69 ans | 96,6 | 97,8 | 94,5 | 100,0 | 100,0 | 97,6 | 93,6 |
| | 70-74 ans | 93,7 | 93,1 | 94,6 | 90,9 | 85,7 | 93,4 | 95,9 |
| | 50-74 ans | 95,0 | 94,8 | 95,4 | 91,4 | 91,7 | 95,7 | 96,4 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 98,8 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,2 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 97,8 | 97,6 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 97,7 |
| | 65-69 ans | 96,5 | 96,7 | 96,2 | 100,0 | 87,5 | 96,4 | 97,7 |
| | 70-74 ans | 98,5 | 98,8 | 98,1 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 97,9 |
| | 50-74 ans | 98,1 | 98,0 | 98,3 | 98,4 | 97,7 | 97,9 | 98,4 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| | 65-69 ans | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| | 50-74 ans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-5) |
| | 55-59 ans | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-8) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| | 60-64 ans | 2 (2-4) | 2 (2-6) | 2 (2-3) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-5) | 2 (2-3) |
| | 65-69 ans | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 2 (2-6) | 2 (2-4) | 2 (2-3) |
| | 70-74 ans | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-8) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| | 50-74 ans | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 84 | 83 | 87 | 87 | 80 | 77 | 94 |
| | 55-59 ans | 100 | 107 | 91 | 135 | 85 | 98 | 92 |
| | 60-64 ans | 86 | 97 | 77 | 73 | 69 | 103 | 79 |
| | 65-69 ans | 102 | 101 | 102 | 80 | 130 | 103 | 97 |
| | 70-74 ans | 85 | 83 | 87 | 71 | 55 | 85 | 92 |
| | 50-74 ans | 92 | 94 | 89 | 90 | 85 | 95 | 90 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 70,5 (53-94) | 71 (51-93) | 66 (59-94) | 74,5 (53,5-100,5) | 64 (59-88) | 59 (51-78) | 74 (62-114) |
| | 55-59 ans | 74 (49-124) | 77 (50-128) | 70 (47-102) | 78 (48-133) | 79,5 (65-126) | 77 (53-115,5) | 69 (47-98) |
| | 60-64 ans | 68,5 (52,5-101) | 75,5 (54-106) | 65 (50-84) | 72 (53,5-88,5) | 65,5 (62-75) | 81 (60-121) | 65 (49,5-85,5) |
| | 65-69 ans | 77 (55-109) | 77 (55-109) | 76,5 (57-113) | 77 (37-96) | 76 (52,5-195) | 77 (55-111) | 77 (60-103) |
| | 70-74 ans | 70 (52-93) | 69 (54-89) | 72 (50-98) | 68 (60-83) | 58,5 (51-68) | 70 (52-89) | 80 (48-102) |
| | 50-74 ans | 73 (53-99,5) | 74 (54-101) | 70 (52-98) | 74,5 (53-100) | 65,5 (54,5-88,5) | 74 (54-102) | 73 (50-100) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 15 - Cantal

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 2,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 6,8 | 10,0 | 3,8 | 18,2 | 14,3 | 7,7 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 2,7 | 2,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 4,3 |
| | 70-74 ans | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 4,1 |
| | 50-74 ans | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 6,3 | 3,1 | 3,1 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 65-69 ans | 97,2 | 97,8 | 96,2 | 100,0 | 87,5 | 97,6 | 97,7 |
| | 70-74 ans | 98,5 | 98,8 | 98,1 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 97,9 |
| | 50-74 ans | 98,9 | 99,0 | 98,7 | 98,4 | 97,7 | 99,2 | 98,9 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 45,1 | 38,3 | 54,3 | 32,1 | 55,6 | 47,4 | 52,9 |
| | 55-59 ans | 39,5 | 27,7 | 53,8 | 36,4 | 66,7 | 25,0 | 51,5 |
| | 60-64 ans | 44,6 | 28,6 | 58,0 | 25,0 | 66,7 | 29,4 | 56,8 |
| | 65-69 ans | 32,4 | 30,0 | 36,5 | 14,3 | 25,0 | 31,3 | 38,6 |
| | 70-74 ans | 32,8 | 23,5 | 47,2 | 10,0 | 16,7 | 25,4 | 51,1 |
| | 50-74 ans | 37,7 | 29,0 | 49,3 | 26,6 | 47,7 | 29,6 | 49,7 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 12,2 | 14,9 | 8,6 | 17,9 | 5,6 | 10,5 | 11,8 |
| | 55-59 ans | 5,8 | 8,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 3,0 |
| | 60-64 ans | 7,6 | 11,9 | 4,0 | 12,5 | 0,0 | 11,8 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 6,7 | 5,8 | 14,3 | 25,0 | 6,0 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 4,5 | 4,9 | 3,8 | 10,0 | 0,0 | 4,2 | 4,3 |
| | 50-74 ans | 6,9 | 8,5 | 4,8 | 12,5 | 6,8 | 7,4 | 4,3 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 11,0 | 10,6 | 11,4 | 10,7 | 11,1 | 10,5 | 11,8 |
| | 55-59 ans | 14,0 | 10,6 | 17,9 | 18,2 | 0,0 | 8,3 | 21,2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 15 - Cantal

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 14,1 | 19,0 | 10,0 | 12,5 | 0,0 | 20,6 | 11,4 |
| | 65-69 ans | 22,5 | 24,4 | 19,2 | 28,6 | 12,5 | 24,1 | 20,5 |
| | 70-74 ans | 19,4 | 24,7 | 11,3 | 20,0 | 0,0 | 25,4 | 12,8 |
| | 50-74 ans | 17,2 | 19,5 | 14,0 | 15,6 | 6,8 | 20,6 | 15,7 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 25,6 | 31,9 | 17,1 | 35,7 | 16,7 | 26,3 | 17,6 |
| | 55-59 ans | 32,6 | 46,8 | 15,4 | 45,5 | 33,3 | 47,2 | 12,1 |
| | 60-64 ans | 27,2 | 35,7 | 20,0 | 50,0 | 33,3 | 32,4 | 18,2 |
| | 65-69 ans | 30,3 | 31,1 | 28,8 | 42,9 | 25,0 | 30,1 | 29,5 |
| | 70-74 ans | 34,3 | 38,3 | 28,3 | 50,0 | 33,3 | 36,6 | 27,7 |
| | 50-74 ans | 30,4 | 36,2 | 22,7 | 42,2 | 25,0 | 34,6 | 22,2 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,9 | 4,3 | 5,7 | 3,6 | 11,1 | 5,3 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 5,8 | 4,3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 9,1 |
| | 60-64 ans | 5,4 | 4,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 6,8 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 6,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 6,8 |
| | 70-74 ans | 8,2 | 7,4 | 9,4 | 0,0 | 50,0 | 8,5 | 4,3 |
| | 50-74 ans | 6,3 | 5,9 | 7,0 | 1,6 | 11,4 | 7,0 | 5,9 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,2 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 15 - Cantal

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1,4 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 0,0 | 0,5 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 11,7 | 17,2 | 7,1 | 18,4 | 6,0 | 15,4 | 8,6 |
| | 55-59 ans | 14,5 | 21,2 | 8,7 | 34,7 | 10,0 | 18,7 | 8,5 |
| | 60-64 ans | 12,0 | 16,2 | 8,5 | 24,9 | 11,6 | 14,8 | 8,2 |
| | 65-69 ans | 21,8 | 32,1 | 13,2 | 36,5 | 22,9 | 31,7 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 27,2 | 44,3 | 14,0 | 76,9 | 25,3 | 41,5 | 13,4 |
| | 50-74 ans | 17,4 | 26,1 | 10,4 | 27,7 | 9,9 | 25,7 | 10,5 |
| | 50-74 ans ** | 16,5 | 23,9 | 9,8 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 8,2 | 12,9 | 4,2 | 14,2 | 3,6 | 11,0 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 10,1 | 17,3 | 4,0 | 24,8 | 10,0 | 15,9 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 7,9 | 10,6 | 5,7 | 19,9 | 11,6 | 9,0 | 5,1 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 18,0 | 7,9 | 21,9 | 15,3 | 17,6 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 17,4 | 26,9 | 10,0 | 54,9 | 25,3 | 24,5 | 9,1 |
| | 50-74 ans | 11,2 | 16,9 | 6,5 | 20,2 | 7,7 | 16,1 | 6,2 |
| | 50-74 ans ** | 10,8 | 16,1 | 5,9 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 7,0 | 10,3 | 4,2 | 12,7 | 3,6 | 6,6 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 7,2 | 12,6 | 2,7 | 19,8 | 5,0 | 11,2 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 6,9 | 8,5 | 5,7 | 19,9 | 11,6 | 6,6 | 5,1 |
| | 65-69 ans | 9,0 | 14,8 | 4,2 | 14,6 | 15,3 | 14,8 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 12,4 | 20,9 | 6,0 | 33,0 | 12,7 | 19,8 | 5,6 |
| | 50-74 ans | 8,5 | 13,3 | 4,6 | 16,5 | 6,3 | 12,4 | 4,2 |
| | 50-74 ans ** | 8,3 | 12,6 | 4,4 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 8,2 | 12,1 | 4,9 | 14,2 | 4,8 | 8,8 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 9,4 | 16,5 | 3,3 | 19,8 | 5,0 | 15,9 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 7,9 | 9,9 | 6,3 | 19,9 | 11,6 | 8,2 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 12,2 | 19,9 | 5,8 | 21,9 | 15,3 | 19,7 | 5,1 |
| | 70-74 ans | 14,7 | 25,2 | 6,7 | 44,0 | 12,7 | 23,6 | 6,3 |
| | 50-74 ans | 10,5 | 16,6 | 5,5 | 18,7 | 7,0 | 16,1 | 5,1 |
| | 50-74 ans ** | 10,2 | 15,6 | 5,2 | - | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 15 - Cantal

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents† | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 3,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 5,2 | 3,3 | 0,0 | 38,0 | 5,7 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 0,7 | 3,5 | 3,3 | 1,7 |
| | 50-74 ans ** | 2,2 | 2,4 | 1,9 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)