

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/4

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	117	71	46	54	33	17	13
	55-59 ans	119	71	48	31	17	40	31
	60-64 ans	217	134	83	43	24	91	59
	65-69 ans	253	165	88	47	15	118	73
	70-74 ans	260	165	95	38	21	127	74
	50-74 ans	966	606	360	213	110	393	250
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	17	9	8	5	5	4	3
	55-59 ans	14	7	7	1	4	6	3
	60-64 ans	21	14	7	3	0	11	7
	65-69 ans	22	17	5	6	1	11	4
	70-74 ans	33	21	12	8	2	13	10
	50-74 ans	107	68	39	23	12	45	27
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	100	62	38	49	28	13	10
	55-59 ans	105	64	41	30	13	34	28
	60-64 ans	196	120	76	40	24	80	52
	65-69 ans	231	148	83	41	14	107	69
	70-74 ans	227	144	83	30	19	114	64
	50-74 ans	859	538	321	190	98	348	223
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	56	30	26	23	20	7	6
	55-59 ans	63	39	24	16	8	23	16
	60-64 ans	129	74	55	24	18	50	37
	65-69 ans	156	96	60	31	12	65	48
	70-74 ans	161	101	60	25	14	76	46
	50-74 ans	565	340	225	119	72	221	153
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	44	32	12	26	8	6	4
	55-59 ans	42	25	17	14	5	11	12
	60-64 ans	67	46	21	16	6	30	15
	65-69 ans	75	52	23	10	2	42	21
	70-74 ans	66	43	23	5	5	38	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/4

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	294	198	96	71	26	127	70
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	29	17	12	12	11	5	1
	55-59 ans	25	14	11	8	3	6	8
	60-64 ans	56	35	21	9	9	26	12
	65-69 ans	70	42	28	8	4	34	24
	70-74 ans	71	51	20	7	5	44	15
	50-74 ans	251	159	92	44	32	115	60
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	10	4	6	4	3	0	3
	55-59 ans	17	9	8	1	1	8	7
	60-64 ans	29	15	14	6	6	9	8
	65-69 ans	41	21	20	10	5	11	15
	70-74 ans	43	25	18	9	3	16	15
	50-74 ans	140	74	66	30	18	44	48
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	9	3	6	2	5	1	1
	55-59 ans	15	11	4	3	3	8	1
	60-64 ans	31	17	14	8	1	9	13
	65-69 ans	29	22	7	9	1	13	6
	70-74 ans	34	17	17	6	3	11	14
	50-74 ans	118	70	48	28	13	42	35
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	13	7	6	1	2	6	4
	65-69 ans	16	11	5	4	2	7	3
	70-74 ans	13	8	5	3	3	5	2
	50-74 ans	56	37	19	17	9	20	10

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,5	12,7	17,4	9,3	15,2	23,5	23,1
	55-59 ans	11,8	9,9	14,6	3,2	23,5	15,0	9,7
	60-64 ans	9,7	10,4	8,4	7,0	0,0	12,1	11,9
	65-69 ans	8,7	10,3	5,7	12,8	6,7	9,3	5,5
	70-74 ans	12,7	12,7	12,6	21,1	9,5	10,2	13,5
	50-74 ans	11,1	11,2	10,8	10,8	10,9	11,5	10,8
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	44,0	51,6	31,6	53,1	28,6	46,2	40,0
	55-59 ans	40,0	39,1	41,5	46,7	38,5	32,4	42,9
	60-64 ans	34,2	38,3	27,6	40,0	25,0	37,5	28,8
	65-69 ans	32,5	35,1	27,7	24,4	14,3	39,3	30,4
	70-74 ans	29,1	29,9	27,7	16,7	26,3	33,3	28,1
	50-74 ans	34,2	36,8	29,9	37,4	26,5	36,5	31,4
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	56,0	48,4	68,4	46,9	71,4	53,8	60,0
	55-59 ans	60,0	60,9	58,5	53,3	61,5	67,6	57,1
	60-64 ans	65,8	61,7	72,4	60,0	75,0	62,5	71,2
	65-69 ans	67,5	64,9	72,3	75,6	85,7	60,7	69,6
	70-74 ans	70,9	70,1	72,3	83,3	73,7	66,7	71,9
	50-74 ans	65,8	63,2	70,1	62,6	73,5	63,5	68,6
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	51,8	56,7	46,2	52,2	55,0	71,4	16,7
	55-59 ans	39,7	35,9	45,8	50,0	37,5	26,1	50,0
	60-64 ans	43,4	47,3	38,2	37,5	50,0	52,0	32,4
	65-69 ans	44,9	43,8	46,7	25,8	33,3	52,3	50,0
	70-74 ans	44,1	50,5	33,3	28,0	35,7	57,9	32,6
	50-74 ans	44,4	46,8	40,9	37,0	44,4	52,0	39,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/4

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	17,9	13,3	23,1	17,4	15,0	0,0	50,0
	55-59 ans	27,0	23,1	33,3	6,3	12,5	34,8	43,8
	60-64 ans	22,5	20,3	25,5	25,0	33,3	18,0	21,6
	65-69 ans	26,3	21,9	33,3	32,3	41,7	16,9	31,3
	70-74 ans	26,7	24,8	30,0	36,0	21,4	21,1	32,6
	50-74 ans	24,8	21,8	29,3	25,2	25,0	19,9	31,4
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,1	10,0	23,1	8,7	25,0	14,3	16,7
	55-59 ans	23,8	28,2	16,7	18,8	37,5	34,8	6,3
	60-64 ans	24,0	23,0	25,5	33,3	5,6	18,0	35,1
	65-69 ans	18,6	22,9	11,7	29,0	8,3	20,0	12,5
	70-74 ans	21,1	16,8	28,3	24,0	21,4	14,5	30,4
	50-74 ans	20,9	20,6	21,3	23,5	18,1	19,0	22,9
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	14,3	20,0	7,7	21,7	5,0	14,3	16,7
	55-59 ans	9,5	12,8	4,2	25,0	12,5	4,3	0,0
	60-64 ans	10,1	9,5	10,9	4,2	11,1	12,0	10,8
	65-69 ans	10,3	11,5	8,3	12,9	16,7	10,8	6,3
	70-74 ans	8,1	7,9	8,3	12,0	21,4	6,6	4,3
	50-74 ans	9,9	10,9	8,4	14,3	12,5	9,0	6,5

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire