

Tableau 1 : Caractéristiques des cas d'infection à *Chlamydia trachomatis*, de gonococcie et de syphilis récente diagnostiqués dans les CeGIDD, France, 2024

Caractéristiques des cas	Chlamydiose (N=22 231) %	Gonococcie (N=13 533) %	Syphilis récente (N=2 486) %
Type de CeGIDD*			
Hospitalier	67,4	66,2	69,9
Non hospitalier	32,6	33,8	30,1
Genre			
Homme cis	64,1	84,9	83,3
Femme cis	35,6	14,2	14,8
Personnes trans	0,4	0,9	1,9
Données manquantes	0,8	0,9	1,7
Age médian (année)			
Tous	24	28	33
Hommes cis	26	29	35
Femmes cis	22	22	24
Personnes trans	29	30	34
Données manquantes	0,8	0,1	1,7
Classe d'âge			
< 18 ans	3,9	2,5	3,7
18 - 25 ans	55,9	36,9	22,3
26 - 49 ans	35,2	52,5	55,0
≥ 50 ans	5,1	8,1	19,0
Données manquantes	0,1	0,1	0,0
Lieu de naissance			
France	80,3	77,4	73,6
Etranger	19,7	22,6	26,4
Afrique subsaharienne	6,6	5,3	4,3
Amérique	5,5	6,6	11,1
Europe (hors France)	3,2	4,1	4,4
Autres	4,4	6,6	6,7
Données manquantes	15,5	14,5	18,2
Pratiques sexuelles au cours des 12 derniers mois			
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	23,0	56,4	65,5
Hommes hétérosexuels	36,3	21,2	16,8
Femmes hétérosexuelles	34,8	14,4	12,1
Femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes	2,0	1,6	1,4
Pas de RS	4,0	6,3	4,1
Données manquantes	41,0	50,3	52,3
Au moins 2 partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois			
Oui	82,3	88,7	83,9
Non	17,7	11,3	16,2
Données manquantes	46,0	58,3	61,4
Signes cliniques d'IST lors de la consultation			
Oui	20,6	31,4	32,7
Non	79,4	68,6	67,3
Données manquantes	16,2	19,0	24,3
Antécédents d'IST bactérienne au cours des 12 derniers mois			
Oui	28,4	46,0	43,7
Non	71,6	54,0	56,3
Données manquantes	20,4	25,3	30,5
Découverte concomitante de séropositivité VIH			
Oui	0,4	0,8	1,6
Non	99,6	99,2	98,4
Données manquantes	0,0	0,0	0,0

Les pourcentages sont calculés sans prise en compte des données manquantes.

Source : SurCeGIDD, Santé publique France, données au 05/07/2025