

Répartition des méthodes de diagnostic* des cas légionelloses notifiés en France, 1996 - 2018

	1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Nombre de cas	80		206		381		440		610		807		1021		1044		1202		1527		1443		1428	
Culture	29	36	60	29	98	26	68	16	134	22	157	20	195	19	173	17	217	18	276	18	220	15	231	16
Sérologie			119	58	189	50	161	37	235	39	237	29	250	25	240	23	217	18	163	11	100	7	92	6
Antigène urinaire			53	26	148	39	267	61	396	65	602	74	820	80	858	82	1037	86	1412	92	1362	95	1325	95

	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2017	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Nombre de cas	1244		1206		1540		1170		1298		1262		1348		1389		1218		1630		2133	
Culture	213	17	220	18	282	18	263	22	307	24	323	26	341	25	345	25	300	25	377	23	489	23
Sérologie	40	3	29	2	37	2	24	2	19	2	29	2	18	1	8	1	7	1	4	<1	11	<1
Antigène urinaire	1187	95	1158	96	1488	97	1130	97	1245	96	1206	96	1292	96	1324	95	1149	94	1571	96	2048	96
PCR									41	3	52	4	112	8	126	9	109	9	128	8	169	8

* un cas peut être diagnostiqué par plusieurs méthodes

Source : données de la déclaration obligatoire