

Comparaison des taux d'incidence régionaux standardisés\* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national standardisé (comparative morbidity figure) selon le sexe, tous âges confondus, France, 2022

Région	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Auvergne-Rhône-Alpes	1,06	[1,03-1,08]	1,02	[1,00-1,04]	1,03	[1,01-1,05]
Bourgogne-Franche-Comté	1,18	[1,13-1,22]	1,16	[1,13-1,20]	1,17	[1,14-1,20]
Bretagne	0,87	[0,83-0,91]	0,83	[0,80-0,86]	0,85	[0,82-0,87]
Centre-Val de Loire	1,28	[1,23-1,33]	1,25	[1,21-1,29]	1,26	[1,23-1,29]
Corse	0,57	[0,49-0,67]	0,57	[0,50-0,65]	0,57	[0,51-0,63]
Grand Est	1,33	[1,29-1,37]	1,33	[1,30-1,36]	1,33	[1,30-1,35]
Guadeloupe	0,39	[0,32-0,47]	0,60	[0,54-0,67]	0,53	[0,48-0,59]
Guyane	0,29	[0,20-0,42]	0,49	[0,39-0,61]	0,41	[0,34-0,50]
Hauts-de-France	1,07	[1,03-1,10]	1,16	[1,13-1,19]	1,12	[1,10-1,14]
Ile-de-France	0,63	[0,61-0,65]	0,74	[0,73-0,76]	0,70	[0,69-0,71]
La Réunion	0,17	[0,14-0,22]	0,21	[0,19-0,25]	0,20	[0,18-0,22]
Martinique	0,56	[0,47-0,65]	1,00	[0,91-1,10]	0,85	[0,79-0,92]
Normandie	1,29	[1,25-1,34]	1,34	[1,30-1,38]	1,32	[1,29-1,35]
Nouvelle-Aquitaine	1,10	[1,07-1,14]	1,02	[1,00-1,05]	1,06	[1,04-1,08]
Occitanie	0,99	[0,96-1,02]	0,88	[0,86-0,90]	0,92	[0,91-0,94]
Pays de la Loire	1,14	[1,10-1,18]	1,15	[1,11-1,18]	1,14	[1,12-1,17]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,96	[0,93-0,99]	0,97	[0,94-0,99]	0,97	[0,95-0,99]

CMF (Comparative Morbidity Figure): rapport du taux d'incidence standardisé de la région sur le taux d'incidence standardisé national

\* Standardisation sur l'âge de la population française

Source: SNDS - PMSI-MCO (ATIH)

Exploitation Santé publique France - Juillet 2023