



Date de publication : 22 juillet 2026

ÉDITION HEXAGONALE

Synthèse nationale relative à l'excès de mortalité toutes causes observé durant l'épisode de canicule du 17 juin au 2 juillet 2026

SOMMAIRE

Points clés	1
Situation météorologique	2
Mortalité en population générale	3
Méthodologie	6

Points clés

- Le deuxième épisode de canicule de 2026, défini pour chaque département par le dépassement des seuils d'alerte départementaux de températures consécutivement durant au moins 3 jours, a débuté le 17 juin 2026.
- **Ce point sur l'excès de mortalité toutes causes se concentre sur la période du 17 juin au 02 juillet.** Au cours de cette période, 92 départements ont été concernés par cet épisode de canicule, soit 98,5 % de la population hexagonale. Cet épisode inédit, caractérisé par sa précocité, son intensité et sa durée, a exposé la quasi-totalité de la population à de très fortes chaleurs dans une période encore importante d'activités scolaires et professionnelles.
- Pour l'ensemble des 92 départements, lors des jours concernés par une canicule, au moins **5 764 décès toutes causes en excès** (+ 36,2 %) ont été estimés sur la base des 21 674 décès toutes causes observés et des 15 910 décès toutes causes attendus. Cet excès de mortalité toutes causes pendant un épisode de canicule est le plus élevé observé depuis 2003, sans toutefois en atteindre les niveaux. Plus de la moitié (56 %) des excès de décès sont concentrés sur les journées du 25 au 27 juin.
- **Un excès de mortalité toutes causes a été observé de manière inédite pour toutes les classes d'âge à partir de 15 ans**, soulignant l'intensité remarquable et la durée de l'exposition à la chaleur de la population sur le territoire hexagonal. Les personnes âgées de 75 ans et plus constituent les deux tiers de ce bilan provisoire avec au moins 3 719 décès en excès (+ 33,3 %).

- **Toutes les régions ont été concernées par un excès de mortalité toutes causes à l'exception des régions Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur**, exposées à la chaleur de manière moins intense sur cette période. **La région la plus concernée par les excès de mortalité toutes causes est la région Ile-de-France avec 1 999 décès en excès (+ 81,2 %).**
- Ces premières estimations sont établies 3 semaines après la fin de la période de canicule étudiée (17/06 au 02/07) et sont issues de données de mortalité toutes causes et non consolidées. (Données arrêtées le 20/07).
- Les décès toutes causes, observés durant cet épisode de canicule, ont augmenté pour tous les types de lieux : établissement hospitaliers, domicile et EHPAD/Maison de retraite.
- Ces impacts soulignent l'importance de mettre en place des mesures de gestion et de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur sur les populations, sans attendre d'observer des impacts sanitaires.

Situation météorologique

Le deuxième épisode de canicule de l'été 2026 touche la France Hexagonale depuis le 17 juin. Depuis, dans au moins un département en France hexagonale, des températures minimales et maximales dépassant les seuils d'alerte canicule ont été observées sur une période d'au moins 3 jours consécutifs.

Ce point sur l'excès de mortalité se concentre sur la période du 17 juin au 2 juillet. Au cours de cette période, 92 départements ont été concernés par une canicule, représentant 98,5 % de la population hexagonale. La durée moyenne de l'épisode de canicule par département est de 7,8 jours. Par ailleurs, la vigilance rouge canicule a été activée du 21 au 28 juin, et a concerné un nombre inédit de 72 départements soit 77 % de la population.

D'après Météo-France, il s'agit d'une canicule d'une sévérité exceptionnelle, dont l'intensité dépasse celle d'août 2003¹. Mercredi 24 juin et jeudi 25 juin ont été les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France, atteignant pour la première fois les 30 °C en moyenne sur 24h et devançant les 29,9 °C du mardi 23 juin. Cet épisode de canicule de 2026 est également marquant par sa précocité, avec des contextes d'exposition à la chaleur de la population particuliers au mois de juin (à l'école et lors d'examens, au travail ou lors de grands rassemblements festifs et sportifs plus fréquents).

Le changement climatique augmente la probabilité de subir de tels épisodes de canicule très intenses, et de plus en plus tôt dans l'année.

¹ <https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/canicule-de-juin-2026-un-episode-historique>

Mortalité en population générale

Mortalité toutes causes en excès

Pour les périodes et départements concernés par la canicule, au moins 5 764 décès en excès (+ 36,2 %) ont été estimés (données mortalité arrêtées le 20/07) (Tableau 1). Cet excès de mortalité toutes causes, observé pendant un épisode de canicule, est le plus élevé depuis 2003, sans toutefois en atteindre les niveaux. Plus de la moitié (56 %) des excès de décès sont observés sur les journées du 25 au 27 juin.

Cet excès de mortalité toutes causes a été observé de manière inédite pour toutes les classes d'âge à partir de 15 ans, soulignant l'intensité remarquable et la durée de l'exposition à la chaleur de la population sur le territoire hexagonal. Les personnes âgées de 75 ans et plus constituent les deux tiers de ce bilan provisoire avec au moins 3 719 décès en excès (+ 33,3 %).

Tableau 1. Estimation non consolidée de l'excès de mortalité toutes causes par classe d'âge pendant la période de canicule du 17/06/2026 au 02/07/2026 dans les départements concernés

Classe d'âge	Nombre de décès observés	Nombre de décès attendus	Nombre de décès en excès	% de décès en excès
0-14 ans	99	102	-	-
15-44 ans	516	398	118	29,6 %
45-64 ans	2 747	1 768	979	55,4 %
65-74 ans	3 430	2 494	936	37,5 %
75 ans et plus	14 882	11 163	3 719	33,3 %
Tous âges	21 674	15 910	5 764 ²	36,2 %

Source : Insee, Santé publique France

² Le total tous âges peut ne pas correspondre à la somme par classe d'âges, d'une part du fait d'arrondis et d'autre part la mortalité attendue par classe d'âge étant modélisée séparément de la mortalité attendue tous âges.

Toutes les régions ont été concernées par un excès de mortalité toutes causes à l'exception des régions Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont la population a été exposée de manière moins intense à la chaleur entre le 17 juin et le 02 juillet (Tableau 2, Figure 2). La région la plus concernée par un excès de mortalité toutes causes est la région Ile-de-France avec 1 999 décès toutes causes en excès (+ 81,2 %). Les autres régions les plus concernées sont Grand-Est (635 décès toutes causes en excès, + 38,9 %), Pays de la Loire (553 décès toutes causes en excès, + 55,2 %) et Centre-Val-de-Loire (511 décès toutes causes en excès, + 62,6 %).


Tableau 2. Estimation non consolidée de l'excès de mortalité toutes causes par région pendant l'épisode de canicule du 17/06/2026 au 02/07/2026 dans les départements concernés

Classe d'âge	Nombre de décès observés	Nombre de décès attendus	Nombre de décès en excès	% de décès en excès
Ile-de-France	4 462	2 463	1 999	81,2 %
Grand-Est	2 268	1 633	635	38,9 %
Pays de la Loire	1 554	1 001	553	55,2 %
Centre-Val-de-Loire	1 327	816	511	62,6 %
Nouvelle-Aquitaine	2 334	1 889	445	23,6 %
Normandie	1 318	892	426	47,8 %
Hauts-de-France	1 672	1 248	424	34,0 %
Bourgogne-Franche Comté	1 325	952	373	39,2 %
Bretagne	1 178	953	225	23,6 %
Auvergne-Rhône-Alpes	2 091	1 877	214	11,4 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre au total national du fait d'arrondis.

Source : Insee, Santé publique France

Figure 2. Estimation non consolidée de l'excès relatif de mortalité toutes causes, par département, pendant l'épisode de canicule du 17/06/2026 au 02/07/2026




Source : GEOFLA-IGN, 2016, Insee, Santé publique France

Descriptif de la mortalité toutes causes, observée entre le 17 juin et le 2 juillet, selon le type de lieu de décès

Pour l'ensemble des 92 départements, lors des jours concernés par une canicule, 21 674 décès toutes causes ont été observés (données mortalité arrêtées le 20/07), près de la moitié (46 %) sont survenus en établissement hospitalier, 34 % à domicile et 16 % en EHPAD/Maison de retraite.

Le nombre observé de décès en France hexagonale est en hausse très marquée à partir du 22 juin par rapport aux jours précédents et a atteint un pic le 26 juin (Figure 1). Cette hausse était visible pour tous les lieux de décès mais restait plus limitée pour les décès survenus en établissement hospitalier et EHPAD/Maison de retraite. A noter qu'il convient de rester prudent sur l'interprétation des résultats du fait notamment qu'il peut subsister une confusion de déclaration entre le domicile et l'EHPAD/Maison de retraite. De plus certains décès peuvent survenir en établissement hospitalier suite à une exposition au domicile ou en EHPAD/Maison de retraite.

Figure 1. Nombre quotidien de décès toutes causes par type de lieu de décès, de 2024 au 02 juillet 2026, France hexagonale



Méthodologie

Données météorologiques

Les données météorologiques utilisées pour la production de ce point épidémiologique proviennent de Météo-France. Cependant, ces données seront validées en fin d'été. Par conséquent le nombre de départements ou les périodes considérés comme canicule peuvent évoluer à la marge dans le bilan final qui sera produit après la fin de la période de surveillance.

Données de mortalité issues des bureaux d'état-civil, transmises par l'Insee

Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues d'un échantillon d'environ 5 000 communes transmettant leurs données d'état-civil (données administratives sans information sur les causes médicales de décès) sous forme dématérialisée à l'Insee. Ce réseau couvre 84 % de la mortalité nationale. Les résultats présentés dans ce bulletin à partir de cette source sont produits uniquement à partir des données de cet échantillon de communes et ont été extrapolés à l'ensemble de la population.

Compte tenu des délais légaux de déclaration d'un décès à l'état-civil (24h, hors week-end et jour férié) et du délai pris par le bureau d'état-civil pour saisir les informations, un délai entre la survenue du décès et l'arrivée des informations à Santé publique France est observé. On note ainsi, au niveau national et en moyenne sur l'ensemble de l'année, que les informations de 50% des décès survenus un jour J sont disponibles à Santé publique France à J+3. Cette part est de près de 95% à 10 jours. Les délais de transmission peuvent être allongés ponctuellement ; c'est notamment le cas lors de vacances scolaires, jours fériés, week-ends prolongés, forte période épidémique, etc.

A partir des données issues des bureaux d'état-civil transmises par l'Insee, Santé publique France dispose d'une information sur l'âge ou encore le type de lieu de décès (domicile, EHPAD/Maison de retraite, établissement hospitalier, autres). Cette information est collectée par l'officier d'état-civil au moment de la déclaration du décès à la mairie. Elle doit être considérée avec prudence car il peut subsister une confusion entre le domicile et l'EHPAD/Maison de retraite. De plus certains décès peuvent survenir en établissement hospitalier suite à une exposition au domicile ou en EHPAD/Maison de retraite.

Méthode de calcul de l'excès de risque pendant les canicules

Le nombre hebdomadaire de décès est comparé à un nombre attendu de décès, estimé à partir du modèle statistique développé dans le cadre du projet Européen EuroMomo et utilisé par 28 pays ou régions européens. Ce modèle a été adapté pour être utilisé à un pas de temps quotidien. Ce modèle prend en compte les données historiques sur 6 années, la tendance générale et les fluctuations saisonnières. Il exclut les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies). Le modèle est appliqué au niveau départemental, tous âges et par classes d'âge, mais il n'est pas appliqué par type de lieu de décès.

L'estimation finale de l'excès de mortalité consolidée sur l'ensemble de l'été et détaillée par vague de chaleur sera présentée dans le bilan estival produit après la période de surveillance, rallongée de la période de consolidation des données de mortalité.

En savoir plus

Dossiers et rapports de Santé publique France

Dossier fortes chaleurs et canicules

Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique

Changement climatique

Ressources méthodologiques

Canicule : dispositif d'alerte et de surveillance et dispositif de prévention de Santé publique France

Le projet Européen Euromomo

Dossiers Météo France

Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France

Pour nous citer : Canicule et santé. Synthèse nationale relative à l'excès de mortalité toutes causes observé durant l'épisode de canicule du 17 juin au 2 juillet 2026. Édition hexagonale. Bulletin. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2026

Directrice de publication : Aude de Viviès, directrice générale par intérim

Date de publication : 22 juillet 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr