



Bulletin

Santé périnatale
et petite enfance



Date de publication : 08.07.2026

EDITION NOUVELLE-AQUITAINE

Surveillance de la santé périnatale

Edito

La santé périnatale constitue un enjeu prioritaire de santé publique en raison de son impact durable sur la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi des disparités sociales et territoriales qu'elle met en évidence. La surveillance de la santé périnatale s'inscrit pleinement dans l'un des axes stratégiques de Santé publique France, visant à innover et à faire progresser les connaissances afin de mieux cibler sur le territoire l'investissement dans des interventions dont l'efficacité a été démontrée. Pour la première fois, l'agence met à disposition des indicateurs de périnatalité décrivant l'état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né, de la grossesse au post-partum aux échelles régionale et départementale, constituant à ce titre une avancée majeure. Ce rapport présentant des indicateurs issus de différentes sources de données (SNDS, ENP, Etat civil...) permet d'enrichir les connaissances au niveau local, de mieux appréhender les disparités territoriales et d'identifier les enjeux spécifiques à chaque territoire.

En Nouvelle-Aquitaine, comme dans le reste de la France, la santé périnatale est marquée par une situation contrastée et des enjeux variés parmi lesquels : baisse de la natalité, hausse de l'âge des mères, hausse du diabète gestationnel et défis liés à la santé mentale des femmes en période périnatale. La mortalité infantile observée reste également un enjeu majeur : malgré un taux régional parmi les plus bas de l'Hexagone et inférieur à celui observé au niveau national, la situation reste préoccupante en France en 2024, avec une tendance à la hausse et un classement au 21^{ème} rang européen sur 27 (du plus faible au plus élevé). En outre, la région se distingue positivement par une bonne mise en œuvre des entretiens prénataux et postnataux précoces offrant ainsi un levier pour améliorer l'accompagnement des parents et renforcer la prévention autour de la santé physique, psychologique, sociale et environnementale de la femme, de l'enfant et de la famille.

Ces travaux constituent ainsi un appui pour les décideurs publics, les institutions et les professionnels de santé. Ils apportent des éléments d'aide à la décision pour la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies territoriales adaptées. Ce panorama de la santé périnatale vise ainsi à accompagner la mise en œuvre d'actions ciblées et adaptées, au service de l'amélioration durable de la santé des femmes et des nouveau-nés à l'échelle régionale.

Laurent Filleul,

Délégué régional, Santé publique France Nouvelle-Aquitaine

SOMMAIRE

Edito 1

8 chiffres-clés en Nouvelle-Aquitaine 2

Autres points-clés en Nouvelle-Aquitaine 3

Caractéristiques socio-démographiques 4

Facteurs de risque et comportementaux 7

Grossesse et accouchement 10

Naissances vivantes 21

Post-partum 23


Mortalité 29

Prévention et promotion de la santé périnatale 39

Méthodologie 45

L'ensemble de ces données, accompagnées de leurs métadonnées incluant une description des requêtes utilisées, est accessible en open data sur la plateforme ODISSE de Santé publique France. Cette mise à disposition permet à chacun de consulter, réutiliser et analyser librement ces informations. Les sources de données et les analyses statistiques sont décrites à la fin de ce document.

8 chiffres-clés en Nouvelle-Aquitaine en 2024



Points-clés en Nouvelle-Aquitaine

Caractéristiques socio-démographiques

- **Le taux de natalité** est en baisse en Nouvelle-Aquitaine, atteignant 7,8 naissances pour 1 000 habitants en 2024 (10,3 pour 1 000 habitants en 2012) et reste plus faible que le taux France entière (9,6 pour 1 000 habitants).
- **La part des femmes de 35 ans ou plus** à l'accouchement a progressé et atteint 25,5 % en 2024, contre 19,7 % en 2012. A l'inverse, **les grossesses chez les jeunes femmes de moins de 20 ans** ont reculé (1,7 % en 2024 contre 2,7 % en 2012).
- Les bénéficiaires de **l'Aide Médicale d'Etat (AME)** ou de la **Complémentaire santé solidaire (C2S)** étaient en augmentation et représentaient 14,5 % des femmes ayant accouché en 2024 (contre 12,5 % en 2014) en Nouvelle-Aquitaine.

Grossesse et accouchement

- Plus d'un tiers des femmes étaient en situation de **surpoids** avant la grossesse (34,9 % en 2021 contre 25,8 % en 2010) et la prévalence du **diabète** préexistant a doublé entre 2012 et 2024 atteignant 0,72 % en 2024 (0,36 % en 2012) ; cette évolution défavorable est observée dans la région comme en France entière et nécessite une vigilance renforcée.
- La part de **fumeuses** un an avant leur grossesse (32,9 % en 2021) est plus élevée que celle observée en France entière (26,8 %) ; néanmoins la part des fumeuses au 3^{ème} trimestre de grossesse a diminué d'un tiers entre 2016 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine, passant de 19,9 % à 13,5 %.
- La part des **épisiotomies** pratiquées lors des accouchements par voie basse non instrumentale (VBNI) a fortement diminué entre 2012 (18,1 %) et 2024 (3,0 %) reflétant une évolution vers des pratiques plus physiologiques. Cependant, comme au niveau national, une augmentation - dans une moindre proportion - des **déchirures périnéales sévères** est observée (1,3 % en 2024 *versus* 0,7 % en 2012).

Santé mentale

- En 2021, plus d'une femme sur 10 (11,6 %) en Nouvelle-Aquitaine déclarait un **mauvais vécu psychologique** de la grossesse (contre 6,9 % en 2010) ; à 2 mois du post-partum, près d'un quart des femmes présentaient des symptômes d'**anxiété** (24,4 %) et 14,0 % présentaient des symptômes de **dépression**. A noter que ces données, recueillies en 2021, correspondaient au contexte de grossesses en période Covid-19.

Mortalité

- Le **taux de mortalité maternelle** atteignait 9,8 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2024, valeur proche de celle observée en France (11,1 décès pour 100 000 naissances).
- Si le **taux de mortalité infantile** régional (3,4 décès avant l'âge d'un an pour 1 000 naissances vivantes) restait inférieur à celui observé au niveau national (4,1 pour 1 000), cet indicateur restait particulièrement élevé en France en 2024, avec une tendance nationale à la hausse et un classement au 21^{ème} rang européen sur 27 (du plus faible au plus élevé).

Prévention

- Moins d'un tiers des femmes ont déclaré avoir bénéficié d'une supplémentation en acide folique avant leur grossesse en Nouvelle-Aquitaine (27,8 %) comme au national (27,2 %). Bien qu'une progression soit observée dans la région par rapport à 2016 (23,9 %), ce taux reste insuffisant.
- **La réalisation de l'entretien prénatal précoce** (69,1% des femmes en 2024 contre 62,1 % au national) et de **l'entretien postnatal précoce récemment mis en place** (31,4 % des femmes en 2024 contre 24,9 % au national) progresse positivement dans la région.

Caractéristiques socio-démographiques

Tableau 1. Caractéristiques socio-démographiques des mères – Nouvelle-Aquitaine

Indicateurs	Source	Nouvelle-Aquitaine	France	p-value
Nombre de naissances	Etat civil (2024)	48 075	659 731	
Taux de natalité (pour 1 000 habitants)	Etat civil (2024)	7,8	9,6	***
Caractéristiques démographiques des mères				
Femmes ayant un âge inférieur à 20 ans (%)	SNDS (2024)	1,7	1,8	
Femmes ayant un âge supérieur ou égal à 35 ans (%)	SNDS (2024)	25,5	25,8	*
Femmes avec un niveau d'étude supérieur au Baccalauréat (%)	ENP (2021)	61,9 [58,6 - 65,1]	58,0 [57,1 - 58,9]	**
Femmes nées à l'étranger (%)	Etat civil (2024)	17,0	26,2	***
Cadre de vie				
Femmes vivant en couple (%)	ENP (2021)	92,0 [90,0 - 93,7]	90,6 [90,1 - 91,1]	
Exercice d'un emploi de la mère pendant la grossesse (%)	ENP (2021)	75,7 [72,7 - 78,5]	68,1 [67,3 - 68,9]	***
Bon sentiment d'aisance financière ¹ (%)	ENP (2021)	55,5 [52,1 - 58,8]	57,7 [56,8 - 58,6]	
Bénéficiaire AME ou C2S (%)	SNDS (2024)	14,5	17,4	***
Bénéficiaire AME (%)	SNDS (2024)	1,1	2,5	***
Bénéficiaire C2S (%)	SNDS (2024)	13,4	14,9	***

¹ Sentiment d'aisance financière = "ça va" ou "plutôt à l'aise" ou "vraiment à l'aise"

* : p<0,1 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

SNDS : Système national des données de santé


ENP : Enquête nationale périnatale

Natalité

Selon les données de l'Etat civil, plus de 48 000 naissances ont été enregistrées en 2024 en Nouvelle-Aquitaine, soit un taux de natalité de 7,8 naissances pour 1 000 habitants (7,8 ‰). Ce taux était significativement inférieur au taux de natalité en France (9,6 ‰) et suivait la même évolution à la baisse. Sur la période de 2012 à 2024, le taux de natalité régional est passé de 10,3 ‰ à 7,8 ‰ (Figure 1).


Au niveau départemental, en 2024, les taux de natalité variaient entre 6,2 ‰ en Creuse et 9,0 ‰ en Gironde, département de la région qui se démarquait avec un taux de natalité proche de la moyenne nationale (Figure 2).

Figure 1. Evolution du taux de natalité (pour 1 000 habitants), France entière et Nouvelle-Aquitaine, par lieu de domicile, période 2012-2024



Source : Etat civil

Figure 2. Taux de natalité (pour 1 000 habitants), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), par lieu de domicile, 2024



Source : Etat civil ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Caractéristiques démographiques

Selon les données du Système National des Données de Santé (SNDS), un quart des femmes résidant en Nouvelle-Aquitaine en 2024 (25,5 %) étaient âgées de 35 ans ou plus lors de l'accouchement. Cette proportion, comparable au niveau national, est en constante progression depuis 2012 (**Figure 3**).


Au niveau départemental, la proportion de mères âgées de 35 ans ou plus variait entre 20,5 % en Charente et 29,4 % dans les Pyrénées-Atlantiques (**Figure 4**).

Sur la même période (2012-2024), la part des mères âgées de moins de 20 ans était en diminution, passant de 2,7 % à 1,7 % (**Tableau 1**).

L'âge maternel est un facteur de risque de plusieurs complications de la grossesse


La survenue d'événements périnataux défavorables, y compris faible poids à la naissance, prématurité, anomalies congénitales et mortalité infantile, est plus fréquente lorsque les mères sont adolescentes ou âgées de plus de 35 ans, avec un risque accru au-delà de 40 ans.

Figure 3. Evolution de la part des femmes âgées de 35 ans ou plus lors de l'accouchement (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Figure 4. Part des femmes âgées de 35 ans ou plus lors de l'accouchement (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024



Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

En 2021, selon les données de l'Enquête Nationale Périnatale (ENP), 61,9 % des femmes ayant accouché en Nouvelle-Aquitaine avaient un niveau d'étude supérieur au Bac (58,0 % au niveau national) (**Tableau 1**). Cette proportion est en hausse par rapport aux précédentes éditions de l'ENP.

En 2024, d'après les données de l'Etat civil, 17,0 % des femmes ayant accouché en Nouvelle-Aquitaine étaient nées à l'étranger (26,2 % au niveau national) (**Tableau 1**). En 2018, elles étaient 15,1 %.

Cadre de vie

D'après les données de la dernière ENP de 2021, la situation conjugale des femmes ayant accouché en Nouvelle-Aquitaine était identique à celle observée au niveau national : une large majorité d'entre elles (92,0 %) se déclarait en couple, dans le même logement (France : 90,6 %, **Tableau 1**). Cette proportion a légèrement baissé par rapport à la précédente enquête de 2016 (93,5 %).

En revanche, l'exercice d'un emploi durant la grossesse était plus fréquent en Nouvelle-Aquitaine qu'au niveau national : 75,7 % des femmes déclaraient occuper un emploi pendant leur grossesse contre 68,1 % au niveau national.

En 2021, le sentiment d'aisance financière des mères en Nouvelle-Aquitaine (55,5 %) était proche de celui observé au niveau national (57,7 %).

En France, deux dispositifs permettent l'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité

- La Complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite (ex CMU-C) offre une prise en charge gratuite des soins de santé aux résidents légaux dont les revenus annuels sont inférieurs à 60 % du seuil de pauvreté.
- L'Aide Médicale de l'Etat (AME) permet de bénéficier d'une couverture médicale gratuite pour les personnes étrangères en situation irrégulière, notamment pour les soins urgents et essentiels.

Les indicateurs issus du SNDS concernant l'AME et la C2S gratuite doivent être interprétés avec prudence. Plusieurs tables sources existent, et leur combinaison peut varier selon les approches. Dans ce bulletin, nous avons retenu les femmes ayant bénéficié de ces dispositifs à tout moment entre le début de la grossesse et deux mois après l'accouchement.

Il est important de noter que l'accès effectif à ces dispositifs dépend de démarches administratives, ce qui peut influencer les disparités observées et leur évolution dans le temps.

En 2024, en Nouvelle-Aquitaine, 14,5 % des femmes ayant accouché étaient en situation de faibles revenus, bénéficiaires soit de la Complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite, soit de l'Aide Médicale de l'Etat (AME). Cette proportion était de 12,5 % en 2014 et restait chaque année inférieure au niveau national (France : 17,4 % en 2024) (**Figure 5**).


En 2024, elle variait de 9,8 % dans les Pyrénées-Atlantiques à 23,9 % en Haute-Vienne (**Figure 6**).

Figure 5. Evolution de la part des femmes bénéficiaires de la C2S ou de l'AME lors de l'accouchement (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2014-2024



Source : SNDS

Figure 6. Part des femmes bénéficiaires de la C2S ou de l'AME lors de l'accouchement (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024



Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

La précarité socio-économique aggrave les risques pour la mère et le nourrisson

Chez la mère, elle est associée à un accès limité aux soins prénatals, une alimentation déséquilibrée, un stress chronique et une exposition accrue aux facteurs de risque (tabagisme, environnement défavorable), augmentant les complications (hypertension, dépression post-partum). Pour le nourrisson, elle se traduit par un risque élevé de prématurité, de retard de croissance in utero et de mortalité infantile.

Concernant l'AME, 1,1 % des femmes qui ont accouché en Nouvelle-Aquitaine étaient en situation irrégulière sur le territoire français et en étaient bénéficiaires en 2024 (significativement inférieur au niveau national : 2,5 %). La part des femmes bénéficiaires de l'AME en Nouvelle-Aquitaine a peu évolué ces dernières années, elle était de 0,8 % en 2014 (**Tableau 1**).

Concernant la C2S gratuite (ex CMU-C), la proportion de femmes bénéficiaires en Nouvelle-Aquitaine était de 13,4 % en 2024, significativement inférieure au niveau national (14,9 %) et tend à augmenter (11,8 % en 2014). A noter que le plafond maximal de ressources annuelles pour bénéficier de la C2S a également augmenté sur la même période, passant de 8 645 € pour une personne seule en 2014 à 10 166 € pour une personne seule en 2024 (**Tableau 1**).

Facteurs de risque et comportementaux

Tableau 2. Facteurs de risque et comportementaux des mères – Nouvelle-Aquitaine

Indicateurs	Source	Nouvelle-Aquitaine	France	p-value
Traitement de l'infertilité				
Traitement de l'infertilité (%)	ENP (2021)	6,8 [5,2 - 8,7]	6,5 [6,0 - 6,9]	
Facteur de risque				
Femme en surpoids ou obésité pré-conception (%)	ENP (2021)	34,9 [31,8 - 38,2]	37,9 [37,0 - 38,7]	*
Femme présentant un diabète préexistant à la conception (%)	SNDS (2024)	0,72	0,92	***
Femme présentant une hypertension artérielle chronique (%)	SNDS (2024)	1,48	1,63	**
Tabagisme				
Fumeuses 1 an avant la grossesse (%)	ENP (2021)	32,9 [29,8 - 36,1]	26,8 [26,0 - 27,6]	***
Fumeuses au 3 ^{ème} trimestre de grossesse (%)	ENP (2021)	13,5 [11,4 - 16,0]	11,8 [11,3 - 12,4]	
Fumeuses 2 mois post-partum (%)	ENP (2021)	17,6 [14,5 - 21,2]	15,1 [14,2 - 16,0]	*

* : p<0,1 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Traitement de l'infertilité

Selon les données de l'ENP 2021, 6,8 % des femmes venant d'accoucher en Nouvelle-Aquitaine déclaraient avoir suivi un traitement contre l'infertilité avant leur grossesse (exemples : fécondation in vitro, insémination artificielle), taux proche de celui observé France entière (6,5 %) (**Tableau 2**).


Facteurs de risque

Entre 2010 et 2021, la prévalence des femmes en situation de surpoids ou obésité (indice de masse corporelle supérieur à 25) avant la grossesse a augmenté en Nouvelle-Aquitaine, passant de 25,8 % à 34,9 %, mais restait inférieure à celle observée en France hexagonale (**Figure 7, Carte 1**).

Le surpoids chez la femme enceinte est un facteur de risque de plusieurs complications de la grossesse


Le surpoids ou l'obésité chez la femme enceinte exposent à des risques accrus de complications, tant pour la mère que pour l'enfant. Chez la mère, ces conditions favorisent notamment : l'hypertension artérielle gravidique, le diabète gestationnel, les thromboses veineuses (comme les phlébites). Pour le nourrisson, les risques incluent la prématurité, les anomalies congénitales, un poids de naissance élevé (macrosomie), un risque accru de mort fœtale in utero.

Figure 7. Evolution de la part des femmes en situation de surpoids ou obésité avant la grossesse (en %) par lieu d'accouchement, France entière, France hexagonale et Nouvelle-Aquitaine, 2010, 2016 et 2021



Source : ENP

Carte 1. Part des femmes en situation de surpoids ou obésité avant la grossesse (en %) par région du lieu d'accouchement, 2021



Source : ENP ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001 ; ND = non disponible

La prévalence du diabète préexistant (type 1 ou 2) a doublé en 12 ans en Nouvelle-Aquitaine, passant de 0,36 % en 2012 à 0,72 % en 2024 (**Figure 8**). Cette même tendance était observée en France entière (0,92 % en 2024), avec une hausse accélérée depuis 2020.


Au niveau départemental, sur la période 2020-2024, cette proportion variait entre 0,51 % dans les Landes et 0,89 % en Haute-Vienne (**Figure 9**).

Figure 8. Evolution de la part des femmes présentant un diabète (type I ou II) préexistant à la conception (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Figure 9. Part des femmes présentant un diabète (type I ou II) préexistant à la conception (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024




Source : SNDS ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$;

La prévalence des femmes enceintes présentant une hypertension artérielle (HTA) chronique restait relativement stable depuis 2012 (de 1,49 % à 1,48 % en 2024). En 2024, la prévalence était significativement plus faible en Nouvelle-Aquitaine qu'en France entière (1,63 %) (**Figure 10**).


Au niveau départemental sur la période 2020-2024, cette proportion variait entre 0,97 % dans les Pyrénées-Atlantiques et 2,00 % dans les Deux-Sèvres (**Figure 11**).

Figure 10. Evolution de la part des femmes enceintes ayant une hypertension artérielle chronique (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Figure 11. Part des femmes enceintes ayant une hypertension artérielle chronique (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024



Source : SNDS ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$;

Tabagisme

Les indicateurs présentés ici concernent la consommation de tabac (cigarettes industrielles et tabac à rouler), à l'exclusion des cigarettes électroniques et autres produits du vapotage.


La consommation de tabac durant la grossesse est un facteur de risque majeur de morbidité materno-fœtale

Les effets néfastes, tels que placenta prævia, grossesse extra-utérine, faible poids à la naissance, prématurité, sur la santé de la mère et de l'enfant sont bien documentés.

En 2021, 32,9 % des femmes déclaraient fumer un an avant leur grossesse en Nouvelle-Aquitaine (*versus* 26,8 % en France entière) (**Tableau 2**). Cette proportion diminuait au 3^{ème} trimestre de grossesse avec un taux de fumeuses de 13,5 % (*versus* 11,8 % en France entière), pour remonter légèrement à 2 mois du post-partum (17,6 %) (*versus* 15,1 % en France entière). Les parts des fumeuses un an avant leur grossesse et à 2 mois du post-partum étaient significativement plus élevées que celles observées en France entière. La part des fumeuses au 3^{ème} trimestre de grossesse était proche du niveau national (**Carte 2**).


Entre 2010 et 2021, la part des fumeuses au 3^{ème} trimestre de grossesse a fortement diminué passant de 19,6 % à 13,5 % (-6,1 points) (**Figure 12**).

Figure 12. Evolution de la part des femmes fumeuses au 3^{ème} trimestre de grossesse (en %), par lieu d'accouchement, France entière, France hexagonale et Nouvelle-Aquitaine, 2010, 2016 et 2021



Source : ENP

Carte 2. Part des femmes fumeuses au 3^{ème} trimestre de grossesse (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021



Source : ENP ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible

Grossesse et accouchement

Tableau 3. Indicateurs relatifs à la grossesse et l'accouchement – Nouvelle-Aquitaine

Indicateurs	Source	Nouvelle-Aquitaine	France	p-value
Suivi de la grossesse				
Préparation à la naissance chez les primipares (%)	ENP (2021)	88,9 [85,4 - 91,8]	79,5 [78,3 - 80,6]	***
Préparation à la naissance chez les multipares (%)	ENP (2021)	41,5 [37,0 - 46,1]	34,4 [33,3 - 35,6]	***
Entretien prénatal précoce (%)	SNDS (2024)	69,1	62,1	***
Prévention				
Prise d'acide folique avant la grossesse (%)	ENP (2021)	27,8 [24,8 - 30,9]	27,2 [26,4 - 28,1]	
Conseil pour limiter la transmission du cytomégalo virus (CMV) (%)	ENP (2021)	17,9 [15,5 - 20,6]	15,7 [15,1 - 16,4]	*
Vaccination grippe proposée (%)	ENP (2021)	66,8 [63,6 - 69,9]	56,4 [55,6 - 57,3]	***
Vaccination grippe effectuée (%)	ENP (2021)	33,4 [30,3 - 36,6]	29,0 [28,2 - 29,8]	**
Vaccination coqueluche au cours des 10 dernières années (%)	ENP (2021)	75,1 [71,1 - 78,8]	66,7 [65,5 - 68,0]	***
Pathologies de la grossesse				
Femmes à risque pour le diabète gestationnel (à dépister) (%)	ENP (2021)	59,6 [56,3 - 62,8]	64,1 [63,2 - 64,9]	**
Dépistage du diabète gestationnel (%)	SNDS (2024)	90,7	89,6	***
Diabète gestationnel (%)	SNDS (2024)	12,7	15,0	***
Désordres hypertensifs de la grossesse (%)	SNDS (2024)	5,3	5,5	**
HTA gestationnelle (%)	SNDS (2024)	2,1	2,2	
Prééclampsie (%)	SNDS (2024)	2,5	2,5	
Santé mentale				
Grossesse non souhaitée ou non planifiée ¹ (%)	ENP (2021)	15,3 [12,9 - 17,8]	17,1 [16,5 - 17,8]	
Mauvais vécu de la grossesse ² (%)	ENP (2021)	11,6 [9,6 - 13,9]	12,5 [11,9 - 13,1]	
Tristesse ou anhédonie pendant la grossesse (%)	ENP (2021)	32,2 [29,1 - 35,4]	31,9 [31,1 - 32,8]	
Consultation d'un professionnel pour difficultés psychologiques pendant la grossesse (%)	ENP (2021)	11,2 [9,2 - 13,5]	8,8 [8,3 - 9,3]	**
Lieu d'accouchement				
Maternité de type 1 (%)	SNDS (2023)	30,1	16,1	***
Maternité de type 2A (%)	SNDS (2023)	17,6	28,4	***
Maternité de type 2B (%)	SNDS (2023)	23,7	24,3	**
Maternité de type 3 (%)	SNDS (2023)	28,6	31,2	***
Accouchement dans une maternité ayant moins de 1 000 accouchements par an	SNDS (2024)	25,9	19,2	***
Temps de transport pour aller accoucher supérieur à 45 minutes (% accouchements à terme)	ENP (2021)	11,1 [9,0 - 13,4]	7,7 [7,2 - 8,2]	***
Mode d'accouchement				
Accouchement par césarienne (%)	SNDS (2024)	21,4	22,0	***
Césarienne programmée (%)	SNDS (2024)	6,7	7,0	**
Accouchement par voie basse (%)	SNDS (2024)	78,6	78,0	***
Voie basse non instrumentale (VBNI) (%)	SNDS (2024)	68,3	66,9	***
Episiotomie sur VBNI (% VBNI)	SNDS (2024)	3,0	2,8	**
Episiotomie sur VBNI primipare (% VBNI primipare)	SNDS (2024)	5,4	5,5	
Episiotomie sur VBNI multipare (% VBNI multipare)	SNDS (2024)	1,3	1,1	**
Complications				
Hémorragie du post-partum (HPP) (%)	SNDS (2024)	7,1	7,3	*
HPP sévère (%)	SNDS (2024)	1,28	1,00	***
Déchirure sévère (%)	SNDS (2024)	1,32	1,36	

¹ Réaction à la découverte de la grossesse = "non souhaitée" ou "souhaitée plus tard"

² Vécu psychologique pendant la grossesse = "assez mal" ou "mal"

* : p<0,1 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Suivi de la grossesse

Un suivi de grossesse régulier et de qualité, incluant des temps dédiés comme l'Entretien Prénatal Précoce (EPP) et la préparation à la naissance, est un levier clé pour réduire les risques maternels et néonataux.

En 2024, selon les données du SNDS, 69,1 % des femmes ayant accouché dans la région ont bénéficié d'un Entretien Prénatal Précoce (EPP), plaçant la Nouvelle-Aquitaine parmi les régions pour lesquelles ce taux était significativement supérieur au niveau national (62,1 %). La réalisation de l'EPP a augmenté de 14,1 points depuis 2014 (55,0 %) (**Figure 13**).

Au niveau départemental en 2024, le taux de réalisation de l'EPP variait de 57,9 % en Haute-Vienne à 78,6 % dans les Landes. Le département des Pyrénées-Atlantiques se démarquait également avec un taux supérieur à 75 % (**Figure 14**).


Il est à noter l'écart important avec les données autodéclarées dans l'ENP 2021, puisque 50,6 % des femmes ayant accouché en Nouvelle-Aquitaine déclaraient avoir bénéficié d'un EPP (données non présentées), *versus* 64,2 % selon le SNDS pour la même année. Cet écart pourrait s'expliquer par une méconnaissance de l'EPP par les femmes, qui ne l'identifient pas comme une consultation spécifique parmi leurs suivis prénataux, et un codage différent dans le SNDS, où des consultations standards pourraient être enregistrées à tort comme des EPP.

Figure 13. Evolution de la part des femmes ayant eu un entretien prénatal précoce (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2014-2024



Source : SNDS

Figure 14. Part des femmes ayant eu un entretien prénatal précoce (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024



Source : SNDS ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$

En 2021, les femmes primipares effectuaient la préparation à la naissance dans 88,9 % des cas contre 41,5 % parmi les multipares. Ces valeurs sont plus élevées que celles observées au niveau national, avec 79,5 % chez les primipares et 34,4 % chez les multipares (**Tableau 3**).

Prévention

Une prescription systématique de folates par voie orale au moins 4 semaines avant la conception est recommandée en prévention des anomalies de fermeture du tube neural (AFTN) (HAS 2009).

En 2021, 27,8 % des femmes en Nouvelle-Aquitaine déclaraient avoir pris de l'acide folique avant la grossesse. Si ce chiffre a progressé par rapport à 2016 (23,9 %), il demeurerait faible au regard des recommandations actuelles, comme dans le reste de la France. Ce résultat pourrait refléter un manque d'anticipation ou d'information pré-conceptionnelle (**Tableau 3**).

La prévention du cytomégalo­virus (CMV), basée sur des mesures d'hygiène simples mais cruciales, devrait systématiquement être expliquée à toutes les femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse (HCSP 2018 ; CNGOF 2019). Cette infection représente la première cause infectieuse de handicap non génétique chez l'enfant (surdit , retard psychomoteur).

En 2021, seulement 17,9 % des femmes ayant accouch  en Nouvelle-Aquitaine d claraient avoir re u les conseils de pr vention contre le CMV, une proportion toutefois sup rieure   la moyenne nationale (15,7 %) (**Tableau 3**).

En 2026, quatre vaccins sont recommand s aux femmes enceintes (coqueluche, grippe, Covid-19 et VRS) afin de prot ger la m re, le f etus et le nourrisson des infections (HAS 2025).

Au moment de l'ENP 2021, seules les vaccinations contre la coqueluche et la grippe  taient disponibles et recommand es. En 2021, en Nouvelle-Aquitaine, la vaccination contre la grippe a  t  propos e   66,8 % des femmes enceintes (proportion significativement sup rieure   la moyenne nationale), mais seulement 33,4 % ont effectivement  t  vaccin es, r v lant un d calage entre la proposition et l'adh sion (**Tableau 3**).

La proportion de femmes enceintes vaccin es contre la coqueluche au cours des 10 derni res ann es  tait plus  lev e (75,1 %), ce qui t moigne d'une meilleure int gration de cette recommandation ; cette proportion  tait sup rieure   celle observ e en France hexagonale (**Tableau 3**).

Pathologies de la grossesse

En France, le d pistage cibl  chez les femmes pr sentant au moins un des facteurs de risque de diab te gestationnel ( ge sup rieur   35 ans, surpoids ou ob s t , ant c dent familial de diab te au premier degr , ant c dent personnel de diab te gestationnel ou d'enfant macrosome) est recommand  depuis 2010 (CNGOF 2010).

En 2021, selon les donn es de l'ENP, 59,6 % des femmes ayant accouch  en Nouvelle-Aquitaine r pondaient   ces crit res de risque. Cependant, selon les donn es du SNDS, en 2024, plus de 9 femmes sur 10 (90,7 %) ont b n fici  d'un d pistage du diab te gestationnel au cours de la grossesse, soit un pourcentage proche d'un d pistage universel et non sur facteurs de risque (**Tableau 3**). Ce taux figurait parmi les plus  lev s de l'Hexagone et demeurerait relativement stable au cours du temps (87,4 % en 2012).

Entre 2012 et 2021, la pr valence du diab te gestationnel a presque doubl  en Nouvelle-Aquitaine, passant de 7,2 %   12,7 %, avant de diminuer   partir de 2022 (**Figure 15**). Cette tendance d favorable  tait  galement observ e dans le reste de la France.


En 2024, la pr valence du diab te gestationnel en Nouvelle-Aquitaine  tait significativement plus faible qu'au niveau national (12,7 % contre 15,0 %). Le niveau r gional masquait toutefois des contrastes importants entre d partements, avec une pr valence du diab te gestationnel variant de 9,7 % en Creuse   16,0 % dans le Lot-et-Garonne (**Figure 16**).

Figure 15. Evolution de la part des femmes avec un diabète gestationnel (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Figure 16. Part des femmes avec un diabète gestationnel (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024




Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

En 2024, 5,3 % des accouchements en Nouvelle-Aquitaine étaient associés à un désordre hypertensif de la grossesse (HTA chronique, HTA gestationnelle ou prééclampsie), *versus* 5,0 % en 2019. Une évolution similaire était observable en France entière (**Figure 17**).


Ces troubles présentaient une répartition géographique départementale contrastée en 2024 avec le département des Pyrénées-Atlantiques présentant le taux le plus bas (3,9 %) et la Haute-Vienne le taux le plus élevé (7,0 %). La part des accouchements en Nouvelle-Aquitaine associés à une désordre hypertensif restait plus faible que le niveau constaté en France (**Figure 18**).

Figure 17. Evolution de la part des femmes avec un désordre hypertensif (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2019-2024



Source : SNDS

Figure 18. Part des femmes avec un désordre hypertensif (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024




Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001


L'HTA gestationnelle (dite aussi « gravidique ») se définit par une élévation de la pression artérielle (supérieure à 140/90 mmHg) après la 20^{ème} semaine d'aménorrhée.

En 2024, la part des femmes en Nouvelle-Aquitaine présentant une HTA gestationnelle (2,1 %) était proche du niveau national (2,2 %) (**Figure 19**).

A l'échelle départementale, la Haute-Vienne présentait la prévalence d'une HTA gestationnelle la plus élevée (3,7 %) (**Figure 20**).

Figure 19. Evolution de la part des femmes avec une HTA gestationnelle (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2019-2024


Source : SNDS

Figure 20. Part des femmes avec une HTA gestationnelle (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024


Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

La prééclampsie, associant une HTA et une protéinurie après la 20^{ème} semaine d'aménorrhée, a vu sa prévalence augmenter modérément entre 2012 (1,8 %) et 2024 (2,5 %) (**Figure 21**).

Le département de la Gironde présentait une prévalence plus élevée (3,1 %) que la prévalence régionale (2,5 %) ainsi que nationale (2,5 %) (**Figure 22**).

Figure 21. Evolution de la part des femmes avec une prééclampsie (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024

Source : SNDS

Figure 22. Part des femmes avec une prééclampsie (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024


Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Santé mentale

En 2021, 15,3 % des femmes en Nouvelle-Aquitaine déclaraient qu'elles auraient aimé être enceintes plus tard ou ne pas être enceintes, un résultat proche de celui de la France entière (17,1 %). Cette part a évolué à la hausse avec une augmentation de 3,4 points entre 2010 et 2021 (**Tableau 3**).


Toujours en 2021, 11,6 % des femmes en Nouvelle-Aquitaine déclaraient un mauvais vécu psychologique de la grossesse. Depuis 2010, ce sentiment d'un mauvais vécu psychologique de la grossesse a progressé de 4,7 points passant de 6,9 % en 2010 à 11,6 % en 2021 soit, une dynamique plus rapide par rapport à la France hexagonale (**Figure 23, Carte 3**).

Figure 23. Evolution de la part des femmes déclarant un « mauvais vécu de leur grossesse » (en %), par lieu d'accouchement, France entière, France hexagonale et Nouvelle-Aquitaine, 2010, 2016 et 2021



Source : ENP


Carte 3. Part des femmes déclarant un « mauvais vécu de leur grossesse » (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021



Source : ENP ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible


En 2021, près d'une femme sur 3 en Nouvelle-Aquitaine (32,2 %) déclarait un sentiment de tristesse ou d'anhédonie pendant au moins deux semaines durant la grossesse soit un résultat proche de celui en France entière (31,9 %) (**Carte 4**). En parallèle, 11,2 % des femmes ont déclaré avoir consulté un professionnel pendant la grossesse pour des difficultés psychologiques, soit un recours plus important que celui observé en France entière (8,8 %) (**Carte 5**).

Carte 4. Part des femmes ayant déclaré un sentiment de tristesse ou d'anhédonie pendant la grossesse (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021



Source : ENP ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible

Carte 5. Part des femmes ayant consulté un professionnel pour difficultés psychologiques pendant la grossesse (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021




Source : ENP ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible

Lieu d'accouchement

Types de maternités

Depuis des décrets de 1998, les maternités sont définies en 4 types de maternités selon le niveau de soins néonataux (**Carte 6**) :

- Type 1 : obstétrique seule ;
- Type 2A : obstétrique et néonatalogie ;
- Type 2B : obstétrique, néonatalogie et soins intensifs de néonatalogie ;
- Type 3 : obstétrique, néonatalogie, soins intensifs de néonatalogie et réanimation néonatale.

Carte 6. Répartition des maternités en Nouvelle-Aquitaine, selon le type, au 31 décembre 2024

Source : DREES


Réduction du nombre de maternités

Entre 2013 et 2023, le nombre de maternités dans l'Hexagone a diminué passant de 514 à 443 établissements [2].

En 2023, la répartition des accouchements selon le type de maternité était la suivante chez les femmes résidant en Nouvelle-Aquitaine : 30,1 % en type 1, 17,6 % en type 2A, 23,7 % en type 2B et 28,6 % en type 3. La part des accouchements en maternités de type 1 a diminué (-9,9 points depuis 2013), tandis que les maternités de type 3 (+5,2 points) et de type 2B (+3,3 points) ont vu leur part augmenter (**Figure 24**).


La région Nouvelle-Aquitaine affichait des proportions d'accouchements en maternités de type 3 inférieures à la moyenne nationale (31,2 %) (**Figure 25**).

Figure 24. Evolution de la répartition des accouchements selon le type de maternité en Nouvelle-Aquitaine (en %), période 2013-2023



Source : SNDS


Figure 25. Part d'accouchements par lieu de domicile et par type de maternité (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2023



Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001


En 2024 pour la Nouvelle-Aquitaine, plus d'un accouchement sur quatre (25,9 %) avait lieu dans une maternité réalisant moins de 1 000 accouchements par an (19,2 % au niveau national), avec une tendance à la baisse observée entre 2012 et 2019, un plateau, puis une hausse ces dernières années (**Figure 26**). Dans l'Hexagone, cette proportion variait de 11,4 % en Ile-de-France à 45,4 % en Corse, et de 0,3 % à Mayotte à 96,9 % à Saint-Martin (**Carte 7**).

Figure 26. Evolution de la part des accouchements réalisés dans une maternité enregistrant moins de 1 000 accouchements sur l'année (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Carte 7. Part d'accouchements réalisés dans une maternité enregistrant moins de 1 000 accouchements sur l'année (en %), par région de domicile, 2024



Source : SNDS ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible

Maternité éloignée : hébergement et transport

Depuis 2022, les femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité peuvent bénéficier d'un dispositif appelé « Engagement maternité » : la prise en charge d'un hébergement temporaire à proximité de la maternité à l'approche du terme de l'accouchement et la prise en charge des transports correspondants.


En 2021, pour la région Nouvelle-Aquitaine, plus d'une femme sur 10 (11,1 %) déclarait avoir mis au moins 45 minutes de temps de trajet pour atteindre la maternité (**Tableau 3**). Le dispositif « Engagement maternité » (voir encadré ci-dessus), qui permet aux futurs parents de bénéficier de 5 nuitées hôtelières à proximité du lieu d'accouchement, a été mis en place par 36 maternités sur les 42 que compte la région.

Dans l'Hexagone (hors Corse), cette proportion variait significativement de 4,5 % [3,3 - 6,1] en Hauts-de-France à 14,3 % [11,0 - 18,1] en Bourgogne-Franche-Comté. Dans les DROM, elle variait de 8,7 % à la Réunion [6,9 - 10,8] à 12,9 % [10,1 - 16,2] en Guadeloupe.


Mode d'accouchement

En Nouvelle-Aquitaine, entre 2012 et 2024, la part des césariennes a augmenté pour passer de 18,9 % à 21,4 % (**Figure 27**). En 2024, le niveau de césariennes dans la région était équivalent à celui de la France (22,0 %). Cette hausse récente résulte de l'augmentation conjointe des césariennes non programmées et des césariennes programmées (**Tableau 3**).

En 2024, au niveau départemental (**Figure 28**), la part des césariennes variait de 20,0 % dans les Pyrénées-Atlantiques à 26,4 % pour la Creuse. Ces écarts peuvent refléter en partie l'hétérogénéité des pratiques entre les établissements [3].

Figure 27. Evolution de la part des césariennes (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024

Source : SNDS


Figure 28. Part des césariennes (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024

Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001


La pratique de l'épisiotomie a beaucoup diminué depuis 2012 en Nouvelle-Aquitaine, suivant la même dynamique qu'au niveau national. En effet, 18,1 % des femmes qui accouchaient par voie basse non instrumentale (VBNI) avaient eu une épisiotomie en 2012, *versus* seulement 3,0 % en 2024 (**Figure 29**). La diminution a été la plus rapide entre 2016 et 2020.

En 2024, la proportion d'épisiotomie parmi les accouchements VBNI était plus faible dans le département de la Vienne (1,8 %) et elle était la plus élevée (7,5 %) dans le département de la Haute-Vienne (**Figure 30**).

Des études complémentaires sont nécessaires pour explorer un éventuel lien entre taux d'épisiotomie sur VBNI et sur VBI (non présenté ici) et taux de déchirure sévère à partir des données régionales. Les pratiques de repérage et de codage des déchirures sévères pourraient varier selon les établissements de santé, entraînant une hétérogénéité importante entre eux.

Figure 29. Evolution de la part des épisiotomies parmi les accouchements par VBNI (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024

Source : SNDS

Figure 30. Part des épisiotomies parmi les accouchements par VBNI (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024

Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

L'épisiotomie est plus fréquemment réalisée chez les primipares : en 2024, 5,4 % des primipares avec un accouchement VBNI avaient eu une épisiotomie *versus* 1,3 % chez les multipares avec un accouchement VBNI (**Tableau 3**).

Complications de l'accouchement

Hémorragie du post-partum (HPP)

L'HPP correspond à des pertes sanguines égales ou supérieures à 500 mL, survenant lors de l'accouchement ou dans les 24 heures qui suivent, indépendamment de la voie d'accouchement (voie basse ou césarienne).

Cette complication, fréquente en obstétrique, présente une incidence estimée à environ 5 % des accouchements lorsque les pertes sanguines sont évaluées de manière approximative. Cependant, ce taux atteint 10 % lorsque la quantification est réalisée par des méthodes plus précises, telles que l'utilisation d'un sac collecteur, la pesée des compresses ou le recours à des marqueurs biologiques.

En France, les HPP étaient responsables de 7,4 % des décès maternels (parmi les décès pendant la grossesse, l'accouchement ou les 365 jours suivant la fin de la grossesse) (source : ENCM 2016-2018).

Les critères de l'HPP sévère sont :


- transfusion > ½ masse sanguine,
- chirurgie (ligature, hystérectomie),
- embolisation artérielle,
- passage en unité médicale de soins critiques.

En Nouvelle-Aquitaine, la proportion de séjours pour accouchement codés comme hémorragie du post-partum (HPP) était estimée à 7,1 %, proche du niveau national (7,3 %) en 2024, avec une hausse plus marquée depuis 2022. Cette hausse doit cependant être interprétée avec prudence, car elle pourrait refléter une amélioration de la détection et du codage hospitalier plutôt qu'une augmentation réelle de l'incidence (**Tableau 3**).

Dans la région, l'HPP sévère (HPP associé à un acte d'embolisation, de ligature des artères iliaques internes, d'hystérectomie totale ou subtotale, de transfusion sanguine ou de passage dans une unité de réanimation, de soins intensifs, ou de soins continus) a également augmenté de 0,8 % en 2022 à 1,3 % en 2024 (**Figure 31**).


Sur la période 2020-2024, ce taux variait à l'échelle départementale de 0,54 % en Corrèze à 1,71 % pour la Gironde. Trois départements dépassaient significativement la moyenne nationale : la Gironde, la Vienne et la Haute-Vienne (**Figure 32**).

Figure 31. Evolution de la part des hémorragies du post-partum sévères (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Figure 32. Part des hémorragies du post-partum sévères (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024




Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Le taux de déchirures du périnée complet et complet-complicqué (3^{ème} et 4^{ème} degrés) était de 0,70 % en 2012 et 1,32 % en 2024, avec une forte augmentation annuelle moyenne de +6,0 % (**Figure 33**).


Sur la période 2020-2024, cette proportion variait selon les départements de 0,49 % dans le Lot-et-Garonne à 1,50 % dans la Vienne (**Figure 34**). Des études complémentaires sont nécessaires pour explorer un éventuel lien entre taux d'épisiotomie et taux de déchirure sévère à partir des données régionales.

Figure 33. Evolution de la part des déchirures sévères (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Figure 34. Part des déchirures sévères (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024



Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Naissances vivantes

Tableau 4. Indicateurs relatifs aux naissances vivantes – Nouvelle-Aquitaine

Indicateurs	Source	Nouvelle-Aquitaine	France	p-value
Prématurité selon l'âge gestationnel				
Prématurité (< 37 semaines d'aménorrhée (SA)) (%)	SNDS (2024)	6,3	6,7	***
Très grande prématurité (< 28 SA) (%)	SNDS (2024)	0,35	0,43	**
Grande prématurité (28-31 SA) (%)	SNDS (2024)	0,59	0,70	**
Prématurité modérée (32-36 SA) (%)	SNDS (2024)	5,32	5,56	**
Autres marqueurs de risque				
Naissances issues d'une grossesse multiple (%)	SNDS (2024)	2,9	3,0	
Poids à la naissance < 2500 g (%)	SNDS (2024)	7,2	7,4	**
Petit poids pour l'âge gestationnel (PAG) (%)	SNDS (2024)	10,0	9,6	**
Gros poids pour l'âge gestationnel (GAG) (%)	SNDS (2024)	8,5	8,8	**
Hospitalisation du nouveau-né à la naissance (%)	ENP (2021)	8,8 [7,1 - 10,8]	11,5 [11,0 - 12,0]	**

* : p<0,1 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001


Prématurité selon l'âge gestationnel

La prématurité constitue un facteur de risque majeur de mortalité infantile

De plus, les enfants nés avant 32 SA nécessitent une surveillance médicale renforcée (Réseaux de suivi d'enfant vulnérables (RSEV), etc.), en raison d'un risque accru de troubles du neurodéveloppement et de handicap. Un certain nombre de facteurs de risque maternels augmentent le risque de prématurité : l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, le tabagisme, les infections, l'âge maternel (< 18 ans ou > 40 ans), l'assistance médicale à la procréation (AMP), les grossesses multiples, ainsi que les grossesses trop rapprochées.


En Nouvelle-Aquitaine, 6,3 % des naissances vivantes étaient prématurées en 2024 (moins de 37 semaines d'aménorrhée, SA), contre 6,9 % en 2012 (**Figure 35**). Cette tendance à la baisse était aussi observée en France entière (6,7 % en 2024). Au niveau départemental, le taux de prématurité variait de 5,7 % dans les Pyrénées-Atlantiques à 8,1 % en Haute-Vienne en 2024 (**Figure 36**).

Figure 35. Evolution de la part des naissances prématurées (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Figure 36. Part des naissance prématurées (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024



Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

En 2024, la Nouvelle-Aquitaine présentait des taux de très grande prématurité (< 28 SA : 0,35 % des naissances vivantes), de grande prématurité (28-31 SA : 0,59 %) et de prématurité modérée (32-36 SA : 5,32 %) significativement inférieurs aux taux nationaux (respectivement 0,43 %, 0,70 % et 5,56 %) (**Tableau 4**).

Autres marqueurs de risque

En Nouvelle-Aquitaine, 2,9 % des naissances vivantes étaient des naissances issues d'une grossesse multiple en 2024, taux proche de celui observé en France entière (3,0 %) (**Tableau 4**).

En 2024, les naissances vivantes avec un poids < 2 500 grammes représentaient 7,2 % des naissances vivantes (contre 7,4 % en France entière).

Les petits poids pour l'âge gestationnel (PAG) au 10^{ème} percentile selon les courbes de naissance AUDIPOG [4] représentaient 10,0 % des naissances vivantes et les grands poids pour l'âge gestationnel (GAG) au 90^{ème} percentile 8,5 % des naissances vivantes, proportions toutes deux inférieures aux taux nationaux (**Tableau 4**).

Selon les données de l'ENP 2021, 8,8 % des nouveau-nés ont été hospitalisés ou transférés à la naissance en Nouvelle-Aquitaine (contre 11,5 % en France entière) (**Tableau 4**).

Post-partum

Tableau 5. Indicateurs relatifs au post-partum – Nouvelle-Aquitaine

Indicateurs	Source	Nouvelle-Aquitaine	France	p-value
Dépistage biologique néonatal				
Refus de dépistage (pour 10 000 enfants)	CNCDN (2020-2024)	6,9	6,3	
Incidence des maladies dépistées				
Hyperphénylalaninémie ou phénylcétonurie (pour 10 000 enfants testés)	CNCDN (2020-2024)	0,61	0,72	
Hypothyroïdie congénitale (pour 10 000 enfants testés)	CNCDN (2020-2024)	3,76	3,95	
Hyperplasie congénitale des surrénales (pour 10 000 enfants testés)	CNCDN (2020-2024)	0,50	0,48	
Drépanocytose (pour 10 000 enfants testés)	CNCDN (2020-2024)	13,86	17,44	**
Mucoviscidose (pour 10 000 enfants testés)	CNCDN (2020-2024)	1,92	1,73	
Durée de séjour en suites de couches				
Durée moyenne de séjour à la maternité en suites de couches (en nuits)	SNDS (2024)	3,9	3,8	-
Suite césarienne (en nuits)	SNDS (2024)	4,9	4,8	-
Suite accouchement par voie basse (en nuits)	SNDS (2024)	3,6	3,6	-
Alimentation du nourrisson et allaitement				
Tentative d'allaitement (%)	ENP (2021)	77,3 [74,4 - 80,0]	77,1 [76,3 - 77,9]	
Allaitement en maternité mixte ou exclusif (%)	ENP (2021)	68,8 [65,7 - 71,8]	70,5 [69,7 - 71,3]	
Allaitement à 2 mois mixte ou exclusif (%)	ENP (2021)	53,8 [49,6 - 58,0]	54,6 [53,4 - 55,9]	
Couchage à 2 mois				
Position de couchage "toujours sur le dos" (%)	ENP (2021)	77,3 [73,3 - 81,0]	79,2 [78,1 - 80,3]	
Lieu de couchage				
Lit seul dans la chambre des parents (%)	ENP (2021)	69,5 [65,6 - 73,2]	70,5 [69,3 - 71,6]	
Lit dans une chambre seule (%)	ENP (2021)	16,8 [14,0 - 19,9]	15,2 [14,3 - 16,0]	
Lit des parents (%)	ENP (2021)	11,7 [9,2 - 14,7]	13,0 [12,1 - 13,9]	
Suivi postnatal (2 mois après la naissance)				
Suivi médical				
Visite à domicile (sage-femme ou puéricultrice) (%)	ENP (2021)	92,4 [89,8 - 94,6]	84,2 [83,1 - 85,1]	***
Sage-femme (%)	ENP (2021)	87,9 [84,8 - 90,6]	79,3 [78,2 - 80,4]	***
Puéricultrice (%)	ENP (2021)	22,7 [19,4 - 26,4]	19,2 [18,2 - 20,3]	**
Entretien PostNatal Précoce (EPNP) (%)	SNDS (2024)	31,4	24,9	***
Suivi médical du nourrisson				
Suivi assuré principalement par un pédiatre (%)	ENP (2021)	42,8 [38,7 - 47,0]	43,2 [41,9 - 44,4]	
Suivi assuré principalement par un généraliste (%)	ENP (2021)	44,7 [40,5 - 49,0]	42,1 [40,8 - 43,3]	
Suivi assuré principalement par une PMI (%)	ENP (2021)	9,1 [6,7 - 11,9]	12,3 [11,4 - 13,3]	**
Engagement du partenaire				
Congés du partenaire pris (%)	ENP (2021)	63,4 [59,1 - 67,5]	59,8 [58,6 - 61,1]	**
Santé mentale post-partum				
Symptômes de dépression (%)	ENP (2021)	14,0 [10,7 - 17,8]	16,8 [15,9 - 17,8]	
Anxiété (%)	ENP (2021)	24,4 [20,9 - 28,1]	27,5 [26,4 - 28,7]	*

* : p<0,1 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Dépistage biologique néonatal

Repérer des maladies rares et graves chez le nourrisson avant même l'apparition des premiers signes

A la naissance, le dépistage néonatal est proposé aux parents de tous les nouveau-nés. Ce dépistage précoce, couramment appelé « test de Guthrie », repose sur le prélèvement de quelques gouttes de sang et permettait en 2024 de rechercher la présence de 13 maladies dans le but de mettre en place une prise en charge adaptée.

Les chiffres du dépistage de certaines maladies rares du Centre National de Coordination de Dépistage Néonatal (CNCNDN) ou de refus de dépistage sont très faibles à l'échelle de chaque région. De ce fait, il a été décidé de présenter les taux annuels cumulés sur la période 2020-2024.

Sur cette période 2020-2024, en Nouvelle-Aquitaine, le taux de refus était de 6,9 pour 10 000 enfants nés, taux sensiblement égal à celui enregistré en France (6,3 / 10 000). Pour 5 maladies dépistées, les taux d'incidence en 2020-2024 étaient les suivants (**Tableau 5**) :

- Hyperphénylalaninémie (ou phénylcétonurie) : 0,61 cas pour 10 000 enfants testés (France : 0,72 / 10 000).
- Hypothyroïdie : 3,76 cas pour 10 000 enfants testés (France : 3,95 / 10 000).
- Hyperplasie des surrénales : 0,50 cas pour 10 000 enfants testés (France : 0,48 / 10 000).
- Drépanocytose : 13,86 cas pour 10 000 enfants testés, significativement inférieur à la France (17,44 / 10 000).
- Mucoviscidose : 1,92 cas pour 10 000 enfants testés (France : 1,73 / 10 000).

Depuis 2022, deux maladies ont été ajoutées dans le test de Guthrie mais, du fait d'effectifs faibles, elles ne sont pas présentées à l'échelle régionale : le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne et les maladies issues d'erreurs innées du métabolisme.


Durée de séjour en suites de couches

Entre 2012 et 2019, une tendance à la diminution de la durée de séjour en suites de couches était observée, tant au niveau national que régional. Cette tendance à la baisse s'est accentuée durant la pandémie de COVID-19 en 2020, période au cours de laquelle les recommandations sanitaires encourageaient une réduction des durées d'hospitalisation afin de limiter les risques de transmission et les contacts en milieu hospitalier. Depuis 2021, un léger allongement de cette durée est observé pour retrouver en 2024 une durée moyenne proche de celle de 2019 (**Figure 37**).

En 2024, la durée de séjour à la maternité en suites de couches était de 3,9 nuitées en moyenne en Nouvelle-Aquitaine, sensiblement égale à la valeur nationale (3,8 nuitées en moyenne). Au niveau départemental, la durée la plus courte était observée en Charente (3,6 nuitées en moyenne) et la plus longue en Haute-Vienne et en Creuse (4,0 nuitées) (**Figure 38**).


Une différence selon le mode d'accouchement était observée, avec une durée régionale moyenne de 4,9 nuitées après une césarienne et de 3,6 nuitées après un accouchement par voie basse.

Figure 37. Evolution de la durée moyenne de séjour à la maternité en suites de couches (en nuitées), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012-2024



Source : SNDS

Figure 38. Durée moyenne de séjour à la maternité en suites de couches (en nuitées), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024



Source : SNDS


Alimentation du nourrisson et allaitement

Enquête EPIFANE

En France hexagonale, la durée médiane de l'allaitement global (avec ou sans préparation pour nourrissons) a progressé de 15 à 20 semaines entre l'édition 2012 et l'édition 2021 d'EPIFANE. Le rapport publié en 2024 [5] sur les résultats observés dans EPIFANE décrit l'âge médian (4,5 mois) au début de la diversification alimentaire et la proportion d'enfants (91 %) pour lesquels la diversification a débuté dans la fenêtre recommandée, située entre 4 et 6 mois de vie.


Selon l'ENP 2021, en région Nouvelle-Aquitaine, 77,3 % des femmes ont tenté d'allaiter leur enfant (**Carte 9**) et 68,8 % allaient (allaitement mixte ou exclusif) en suites de couches au moment de l'entretien avec la sage-femme enquêtrice (**Figure 39, Carte 8**). A deux mois post-partum, 53,8 % déclaraient encore allaiter (**Carte 10**). Ces proportions étaient sensiblement les mêmes qu'au niveau national, la pratique de l'allaitement étant plus fréquente dans les DROM et en Ile-de-France.

Figure 39. Evolution de la part des nourrissons allaités en maternité (en %), par lieu d'accouchement, France entière, France hexagonale et Nouvelle-Aquitaine, 2010, 2016 et 2021




Source : ENP

Carte 8. Part des nourrissons allaités en maternité (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021




Source : ENP ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001
ND = non disponible

Carte 9. Part des femmes ayant tenté d'allaiter en maternité (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021



Source : ENP ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001
ND = non disponible

Carte 10. Part des femmes ayant mis en place un allaitement mixte ou exclusif à 2 mois (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021



Source : ENP ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001
ND = non disponible

Couchage

Les principales recommandations de couchage des nourrissons pour réduire le risque de mort inattendue du nourrisson (MIN) sont de :

- Coucher systématiquement les bébés sur le dos ;
- Dans un lit séparé dans la chambre parentale jusqu'à ses 6 premiers mois ;
- Sans objets dans le lit qui risquent de couvrir sa tête (pas d'oreiller, couverture, couette, doudou, tour de lit, jouet...).

Pourtant, environ 60 % des décès par MIN surviennent dans des circonstances non conformes aux recommandations ci-dessus, soulignant l'importance de ces mesures préventives (source : OMIN – <https://www.omin.fr/chiffres-cles/>).

Selon l'ENP 2021, en Nouvelle-Aquitaine, seules 77,3 % des mères déclaraient systématiquement coucher leur enfant sur le dos deux mois après la naissance (79,2 % au niveau national) :

- 69,5 % déclaraient coucher le nourrisson dans un lit séparé dans la chambre parentale et 16,8 % seul dans une chambre ;
- 11,7 % des nourrissons étaient principalement couchés dans le lit des parents, pratique à risque qui souligne l'importance de renforcer les messages de prévention (**Tableau 5**).

Suivi postnatal jusqu'aux 2 mois après la naissance

Organisation du retour à domicile des mères et de leurs nouveau-nés


La HAS recommande deux à trois visites de sages-femmes, réalisées préférentiellement à domicile ou dans un lieu de soin approprié, à la sortie de maternité. En cas de sortie précoce, la première visite doit être organisée dans les 24h. Ces visites sont remboursées à 100 % par l'Assurance Maladie, si elles ont lieu dans les 12 jours qui suivent la naissance.

Depuis juillet 2022, l'entretien postnatal précoce (EPNP) est obligatoire en France. L'EPNP est un temps d'échanges réalisé entre la 4^{ème} et la 8^{ème} semaine du post-partum, ayant pour objectif une approche globale de prévention. Il permet notamment le repérage des premiers signes de la dépression du post-partum ou des facteurs de risque qui y exposent.

Selon l'ENP 2021, en Nouvelle-Aquitaine, 92,4 % des femmes déclaraient avoir reçu au moins une visite à domicile après leur sortie de la maternité, par une sage-femme (87,9 %) et/ou par une puéricultrice (22,7 %). A l'échelle nationale, seules 84,2 % déclaraient avoir bénéficié d'un tel suivi (**Tableau 5**).


En 2024, deux ans après l'instauration de l'entretien postnatal précoce (EPNP), 31,4 % des femmes ayant accouché ont bénéficié de cet entretien en Nouvelle-Aquitaine, contre 24,9 % au niveau national. Cette proportion marque une progression significative par rapport à 2023, où seulement 23,8 % des femmes de la région en avaient profité (**Figure 40**). En 2024, le taux d'EPNP variait de 13,7 % en Haute-Vienne à 44,5 % dans le Lot-et-Garonne (**Figure 41**).

Figure 40. Evolution de la part de femmes ayant bénéficié d'un EPNP (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2023-2024



Source : SNDS

Figure 41. Part des femmes ayant bénéficié d'un EPNP (en %), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2024



Source : SNDS ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$

20 examens de suivi médical de l'enfant et de l'adolescent

De la naissance à 16 ans, chaque enfant bénéficie gratuitement de 20 examens de santé : la moitié de ces examens ont lieu avant un an. A 2 mois, au moment où les femmes sont interrogées dans l'ENP, l'enfant a eu un examen dans les 8 jours suivant la naissance (en maternité généralement), au cours de la 2^{ème} semaine, à 1 mois et à 2 mois.

En 2021, en Nouvelle-Aquitaine, le suivi médical des nourrissons durant leurs deux premiers mois de vie était principalement assuré par un pédiatre (42,8 %) ou par un médecin généraliste (44,7 %). La Protection Maternelle et Infantile (PMI) intervenait pour 9,1 % des nourrissons (**Tableau 5**).

Engagement du partenaire / co-parent

Selon l'ENP 2021, en Nouvelle-Aquitaine, 63,4 % des partenaires avaient pris un congé dans les deux mois suivant la naissance, un taux supérieur à celui observé à l'échelle nationale (59,8 %) (**Tableau 5**).

Santé mentale post-partum

Première cause de mortalité maternelle (jusqu'à 1 an après la fin de la grossesse) : le suicide


Le suicide survient particulièrement dans les mois suivant l'accouchement (source : ENCMM). Par ailleurs, la santé mentale de la mère influence directement la qualité de la relation mère-enfant, essentielle pour l'attachement et le développement émotionnel du nourrisson.

L'échelle d'Edimbourg pour la dépression postnatale (*Edinburgh Postnatal Depression Scale*, EPDS) est un outil validé permettant d'évaluer le risque de dépression post-partum en calculant un score de 0 à 30 à partir de 10 items. Pour la 1^{ère} fois cette échelle a été intégrée dans l'ENP 2021 afin d'évaluer ce risque en France.

En Nouvelle-Aquitaine, en 2021, deux mois après l'accouchement, 14,0 % des femmes présentaient des symptômes de dépression et 24,4 % de l'anxiété (respectivement 16,8 % et 27,5 % à l'échelle nationale) (**Carte 11** ; **Carte 12**).


A noter qu'en 2021 ces femmes ont accouché pendant la pandémie de COVID-19, et que cela a pu impacter leur santé mentale.

Carte 11. Part des femmes ayant un score EPDS indiquant une dépression (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021



Source : ENP ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible

Carte 12. Part des femmes ayant un score EPDS indiquant une anxiété (en %), par région du lieu d'accouchement, 2021



Source : ENP ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible

Mortalité

La **mortalité maternelle** est suivie par le dispositif permanent de l'**Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM)** dont l'objectif est d'identifier et d'analyser les causes de décès des femmes pendant la grossesse et jusqu'à un an après l'accouchement.

La **mortalité foeto-infantile** se compose de plusieurs indicateurs, comme présenté sur le schéma ci-dessous :




Tableau 6. Indicateurs de mortalité – Nouvelle-Aquitaine

Indicateurs	Source	Nouvelle-Aquitaine	France	p-value
Mortalité maternelle (décès de la mère de la grossesse jusqu'à 1 an après l'accouchement)				
Taux de décès (pour 100 000 naissances)	ENCMM (2013-2018)	9,8 [6,7 - 13,7]	11,1 [10,2 - 12,1]	
Mortinatalité (enfants mort-nés, après 22SA) ¹				
Nombre de mort-nés	SNDS (2024)	393	6 094	
Taux de décès (pour 1 000 naissances totales)	SNDS (2024)	8,2	9,2	**
Mortinatalité induite (pour 1 000 naissances totales)	SNDS (2024)	4,3	3,6	**
Mortinatalité spontanée (pour 1 000 naissances totales)	SNDS (2024)	3,9	5,6	***
Mortalité périnatale (décès enfant entre 22SA et 6 jours) ¹				
Nombre de décès	SNDS (2024)	474	7 398	
Taux de décès (pour 1 000 naissances totales)	SNDS (2024)	9,8	11,2	**
Mortalité infantile (décès enfant entre 0 jour et 1 an)				
Nombre de décès	Etat civil (2024)	163	2 690	
Taux de décès (pour 1 000 naissances vivantes)	Etat civil (2024)	3,39	4,08	**
Mortalité néonatale précoce (décès enfant entre 0 et 6 j.)				
Nombre de décès	Etat civil (2024)	83	1 310	
Taux de décès (pour 1 000 naissances vivantes)	Etat civil (2024)	1,73	1,99	
Mortalité néonatale tardive (décès enfant entre 7 et 27 j.)				
Nombre de décès	Etat civil (2024)	39	618	
Taux de décès (pour 1 000 naissances vivantes)	Etat civil (2024)	0,81	0,94	
Mortalité post-néonatale (décès enfant entre 28 j et 1 an)				
Nombre de décès	Etat civil (2024)	41	762	
Taux de décès (pour 1 000 naissances vivantes)	Etat civil (2024)	0,85	1,16	**


* : p<0,1 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

1. Les indicateurs ont été calculés à partir d'une base corrigée par la DREES et l'Inserm.

Mortalité maternelle

Entre 2013 et 2018, le taux de mortalité maternelle durant la grossesse et l'année suivant l'accouchement en Nouvelle-Aquitaine s'élevait en moyenne à 9,8 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce taux régional restait proche de la moyenne nationale (11,1 décès pour 100 000 naissances vivantes) (**Carte 13**).

Carte 13. Taux régional de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes), par région de domicile, 2013-2018



Source : ENCMM ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$; ND = non disponible

Dans l'édition 2016-2018 de l'Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) [6], France entière, le suicide devenait la 1^{ère} cause de mortalité maternelle (considérée jusqu'à un an après la fin de la grossesse), et les maladies cardiovasculaires étaient la 1^{ère} cause de mortalité maternelle considérée jusqu'à quarante-deux jours. Les causes de mortalité maternelle ne peuvent être décrites au niveau régional.


Mortinatalité

La mortinatalité correspond aux enfants nés sans signe de vie ≥ 22 SA ou ≥ 500 grammes. Elle est composée de la mortinatalité induite par IMG (≥ 22 SA) et de la mortinatalité spontanée.

En France, environ 60 % de la mortinatalité était spontanée et 40 % était induite (données SNDS 2012-2024).

En Nouvelle-Aquitaine, 393 mort-nés (enfants nés sans signe de vie ≥ 22 SA ou ≥ 500 gr) ont été recensés en 2024, soit un taux de mortinatalité de 8,2 pour 1 000 naissances, inférieur à celui enregistré en France (9,2 pour 1 000) (**Carte 14**). Malgré des fluctuations annuelles, ce taux est resté relativement stable depuis 2012 (**Figure 42**).

Carte 14. Taux régional de mortinatalité (pour 1 000 naissances totales), par région de domicile, 2024




Source : SNDS ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$; ND = non disponible

A l'échelle nationale, une hausse est observée en 2024 et les analyses de tendance révèlent une diminution moyenne de 0,6 % par an entre 2012 et 2019, suivie d'une augmentation moyenne de 1,1 % par an jusqu'en 2024 [1] (**Figure 42**).


A l'échelle départementale sur la période 2020-2024, le taux de mortinatalité global variait de 7,0 % en Dordogne à 10,5 % en Corrèze (**Figure 43**).

Figure 42. Evolution du taux de mortinatalité (pour 1 000 naissances totales), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2014- 2024



Source : SNDS

Figure 43. Taux de mortinatalité (pour 1 000 naissances totales), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024



Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Mortinatalité induite

Le taux régional de mortinatalité induite s'élevait à 4,3 % en 2024, supérieur à la moyenne nationale (3,6 %). Entre 2014 et 2024, il variait entre 3,7 (2018, 2021) et 4,7 (2015) mort-nés pour 1 000 naissances totales selon les années (**Figure 44**).


Au niveau départemental sur la période 2020-2024, ce taux variait de 3,1 (Dordogne) à 5,1 (Corrèze) pour 1 000 naissances (**Figure 45**).

Figure 44. Evolution du taux de mortinatalité induite (pour 1 000 naissances totales), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2014- 2024



Source : SNDS

Figure 45. Taux de mortinatalité induite (pour 1 000 naissances totales), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024



Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Mortinatalité spontanée

Entre 2014 et 2024, le taux régional de mortinatalité spontanée oscillait entre 3,6 (2016) et 4,6 (2020) mort-nés spontanés pour 1 000 naissances totales selon les années (**Figure 46**). Ce taux montre une tendance à la baisse depuis 2020, avec une valeur observée de 3,9 ‰ en 2024, en deçà du taux national (5,6 ‰).


Au niveau départemental entre 2020 et 2024, ce taux variait de 3,7 (Gironde) à 5,4 (Vienne) pour 1 000 naissances (**Figure 47**).

Figure 46. Evolution du taux de mortinatalité spontanée (pour 1 000 naissances totales), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2014- 2024



Source : SNDS

Figure 47. Taux de mortinatalité spontanée (pour 1 000 naissances totales), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024




Source : SNDS ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Mortalité périnatale

La mortalité périnatale regroupe deux composantes distinctes :

- La mortinatalité (cf. partie dédiée) : les enfants mort-nés (décès in utero à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou 500 grammes), qui représentent 85 % des cas en France ;
- La mortalité néonatale précoce (cf. partie dédiée) : décès néonataux précoces (enfants nés vivants mais décédés dans les 7 premiers jours de vie (J0 à J6)), comptant pour les 15 % restants.

En Nouvelle-Aquitaine, en 2024, le taux de mortalité périnatale était de 9,8 décès pour 1 000 naissances, inférieur à celui observé au niveau national (11,2 pour 1 000 naissances) (**Carte 15**).

Carte 15. Taux régional de mortalité périnatale (pour 1 000 naissances totales), par région de domicile, 2024


Source : SNDS ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
 ND = non disponible

Depuis 2014, le taux de mortalité périnatale restait relativement stable, avec des valeurs annuelles proches de 10 décès pour 1 000 naissances en Nouvelle-Aquitaine. Dans le même temps, une tendance à la hausse était observée ces dernières années au niveau national (**Figure 48**).

Au niveau départemental, le taux de mortalité périnatale sur la période 2020-2024 variait de 8,9 (Dordogne) à 12,0 (Corrèze) pour 1 000 naissances (**Figure 49**).

Figure 48. Evolution du taux de mortalité périnatale (pour 1 000 naissances totales), France entière et Nouvelle-Aquitaine, 2014- 2024

Source : SNDS

Figure 49. Taux de mortalité périnatale (pour 1 000 naissances totales), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024

Source : SNDS ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$


Mortalité infantile

La mortalité infantile est composée d'environ 50 % de décès survenus entre 0 et 6 jours, d'environ 20 % de décès survenus entre 7 et 27 jours et d'environ 30 % de décès survenus entre 28 et 364 jours de vie.

Les trois paragraphes suivants décomposent la mortalité infantile selon ces trois périodes.

En Nouvelle-Aquitaine, 163 décès de nourrissons sont survenus entre 0 et 364 jours de vie en 2024, soit un taux de mortalité infantile de 3,39 décès pour 1 000 naissances vivantes, plus faible que celui observé en France (4,08 ‰) (**Carte 16**). La région présentait ainsi un des 3 taux les plus faibles du territoire.

Carte 16. Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes), par région de domicile, 2024




Source : Etat civil ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$

ND = non disponible

L'évolution du taux de mortalité infantile ne présentait pas de tendance nette au niveau régional entre 2012 et 2024, alors qu'une tendance à la hausse s'avérait significative à l'échelle nationale (+1 % de hausse chaque année entre 2014 et 2024) [1] (**Figure 50**).


À l'échelle départementale, le taux de mortalité infantile sur la période 2020-2024 présentait des disparités, variant du simple à plus du double selon les territoires (**Figure 51**). Le département de la Haute-Vienne observait un taux de mortalité infantile particulièrement élevé, reflétant un profil singulier pour ce territoire, autour duquel une mobilisation des acteurs locaux est d'ores et déjà en place.

Figure 50. Evolution du taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012- 2024



Source : Etat civil

Figure 51. Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024




Source : Etat civil ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$

Mortalité néonatale précoce

La mortalité néonatale précoce est la période de la mortalité infantile correspondant au décès du nourrisson survenu entre 0 et 6 jours.

En Nouvelle-Aquitaine, 83 décès de nourrissons sont survenus entre 0 et 6 jours de vie en 2024, soit un taux de mortalité néonatale précoce de 1,73 décès pour 1 000 naissances vivantes, du même ordre de grandeur que celui observé en France (1,99 %) (**Carte 17**).

Carte 17. Taux de mortalité néonatale précoce (pour 1 000 naissances vivantes), par région de domicile, 2024




Source : Etat civil ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible

Entre 2012 et 2024, la mortalité néonatale précoce fluctuait entre 1,24 (2012) et 2,04 (2017) pour 1 000 naissances en Nouvelle-Aquitaine, avec une tendance générale à la hausse. Au niveau national, cette tendance est observée avec +1 % de hausse chaque année entre 2014 et 2024 [1] (**Figure 52**).


A l'échelle départementale, en 2020-2024, le taux de mortalité néonatale précoce variait de 0,79 décès pour 1 000 naissances en Creuse à 2,91 décès pour 1 000 naissances dans la Haute-Vienne (**Figure 53**).

Figure 52. Evolution du taux de mortalité néonatale précoce (pour 1 000 naissances vivantes), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012- 2024



Source : Etat civil

Figure 53. Taux de mortalité néonatale précoce (pour 1 000 naissances vivantes), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024




Source : Etat civil ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$

Mortalité néonatale tardive

La mortalité néonatale tardive est la période de la mortalité infantile correspondant au décès du nourrisson survenu entre 7 et 27 jours.

En Nouvelle-Aquitaine, 39 décès de nourrissons sont survenus entre 7 et 27 jours de vie en 2024, soit un taux de mortalité néonatale tardive de 0,81 décès pour 1 000 naissances vivantes, proche de celui observé en France (0,94 ‰) (**Carte 18**).

Carte 18. Taux de mortalité néonatale tardive (pour 1 000 naissances vivantes), par région de domicile, 2024



Source : Etat civil ; * : $p < 0,10$; ** : $p < 0,05$; *** : $p < 0,001$
ND = non disponible

Dans la région, la mortalité néonatale tardive est globalement restée stable entre 2012 (0,96 ‰) et 2024 (0,80 ‰), avec toutefois un pic en 2022 (1,16 ‰). Une tendance à la hausse était par ailleurs observée au niveau national (+2,1 % de hausse par an entre 2014 et 2024) [1] (**Figure 54**).


A l'échelle départementale, le taux de mortalité néonatale tardive sur la période 2020-2024 montrait de fortes disparités, avec un taux observé en Haute-Vienne (1,20 ‰) presque trois fois supérieur à celui observé en Corrèze (0,34 ‰) (**Figure 55**).

Figure 54. Evolution du taux de mortalité néonatale tardive (pour 1 000 naissances vivantes), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012- 2024



Source : Etat civil

Figure 55. Taux de mortalité néonatale tardive (pour 1 000 naissances vivantes), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024




Source : Etat civil ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Mortalité post-néonatale

La mortalité post-néonatale est la période de la mortalité infantile correspondant au décès du nourrisson survenu entre 28 jours et 1 an.

En Nouvelle-Aquitaine, 41 décès de nourrissons sont survenus entre 28 et 364 jours de vie en 2024, soit un taux de mortalité post-néonatale de 0,85 décès pour 1 000 naissances vivantes, inférieur à celui observé en France (1,16 ‰) (**Carte 19**).

Carte 19. Taux de mortalité post-néonatale (pour 1 000 naissances vivantes), par région de domicile, 2024



Source : Etat civil ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001
ND = non disponible

En Nouvelle-Aquitaine, la mortalité post-néonatale est passée de 0,97 à 0,85 ‰, entre 2012 et 2024, avec une diminution observée entre 2015 et 2021. Elle évoluait presque systématiquement en deçà des valeurs nationales, pour lesquelles une tendance stable était observée entre 2014 et 2024 [1] (**Figure 56**).


A l'échelle départementale, le taux de mortalité post-néonatale sur la période 2020-2024 montrait d'importantes disparités. Il variait de 0,42 ‰ dans les Landes à 1,39 ‰ en Charente (**Figure 57**).

Figure 56. Evolution du taux de mortalité post-néonatale (pour 1 000 naissances vivantes), France entière et Nouvelle-Aquitaine, période 2012- 2024



Source : Etat civil

Figure 57. Taux de mortalité post-néonatale (pour 1 000 naissances vivantes), France entière et Nouvelle-Aquitaine (région et départements), 2020-2024



Source : Etat civil ; * : p<0,10 ; ** : p<0,05 ; *** : p<0,001

Prévention et promotion de la santé périnatale

La période de la conception aux deux premières années de la vie après la naissance est déterminante pour le développement de l'enfant et la santé de l'adulte qu'il deviendra. Il est donc nécessaire de s'engager en faveur de la santé du jeune enfant avant même sa naissance.

Le site ressources pour les (futurs) parents sur la période des 1000 premiers jours



Le site 1000-premiers-jours.fr informe les (futurs) parents sur l'impact de l'environnement physico-chimique et de l'environnement affectif et relationnel sur le développement de l'enfant, et la santé tout au long de sa vie. Il propose des pistes d'actions concrètes pour agir en faveur de la santé des parents et de celle de leur enfant. Basé sur les recommandations institutionnelles nationales et internationales, il aborde avec une approche bienveillante, une grande variété de thèmes comme la santé mentale des parents, la sobriété d'exposition à des substances chimiques dans la vie quotidienne et la qualité des interactions précoces parent-bébé.

Observation et promotion des interactions parents-bébé de qualité

Étude EVANE




Fin 2024, Santé publique France a lancé Evane, en partenariat avec la CNAF. Cette enquête vise à comprendre comment les conditions de vie, l'histoire personnelle du parent, ses caractéristiques individuelles et celles de son enfant influencent l'expérience de la parentalité (stress parental, pression ressentie et sentiment de compétence parental) et certaines pratiques parentales (lecture, petits jeux, activités etc.). Au total, 5 235 pères et 5 050 mères d'enfants de 0-2 ans vivant en France hexagonale ont participé. Des synthèses thématiques de résultats seront diffusées d'ici fin 2026 – début 2027.

Dispositif digital d'information : « Interactions parent-bébé »

Afin de faire connaître les bénéfices des interactions parent-bébé de qualité pour la santé de leur enfant, un dispositif d'information destiné aux jeunes parents et futurs parents a été mis en place fin 2025 en partenariat avec WeMoms et Explore Média. La vidéo présentée par le pédiatre Jules Fougère est toujours disponible.

PANJO : l'intervention de prévention précoce à domicile



Santé publique France a conçu l'intervention PANJO pour promouvoir la santé et l'attachement des jeunes enfants. Cette intervention à domicile est proposée par les PMI aux futurs parents vivant dans un contexte psychosocial à risque. Les visites (6 à 12), programmées de la grossesse aux douze mois de l'enfant, permettent de réduire les interactions parent-bébé dysfonctionnelles, de réduire les réactions hostiles du parent et d'améliorer le recours aux soins. Depuis 2022, les PMI de 23 départements répartis dans 8 régions, dont la Nouvelle-Aquitaine, se sont impliquées dans le déploiement de PANJO.

À chaque rencontre, 20 minutes minimum sont dédiées à l'observation et aux activités favorisant l'attachement, en s'appuyant sur les repères SPER – Sensibilité, Proximité, Engagement, Réciprocité. L'intervention adopte une posture valorisante, collaborative et adaptative, afin de soutenir les compétences parentales et renforcer la confiance des familles.

Le programme inclut également un soutien structuré aux pratiques professionnelles des puéricultrices et sages-femmes, grâce à des formations dédiées : 2 jours sur la théorie de l'attachement et 3 jours sur les visites à domicile PANJO. Les équipes disposent d'outils d'intervention PANJO spécifiquement conçus pour les visites à domicile, ainsi que de supervisions régulières pour consolider leurs pratiques et garantir une qualité d'accompagnement homogène.

En Nouvelle-Aquitaine, l'ARS, l'Institut de la Parentalité et Santé publique France se sont associés pour soutenir les services de PMI de la région dans la mise en place de l'intervention PANJO. Les formations ont débuté en Creuse en 2023. Puis, l'Institut de la Parentalité a pu former les infirmières puéricultrices et sages-femmes de Charente-Maritime, de Corrèze, des Deux-Sèvres, de Dordogne, de Gironde, de Haute-Vienne, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, et de la Vienne. Ainsi, plus de 400 intervenants à domicile de PMI sont prêts à proposer PANJO aux futurs parents vivant dans un contexte de fragilité psycho-sociale

Pour plus d'informations : eval.panjo@santepubliquefrance.fr

Promotion des comportements favorables à la santé

Les ressources de Santé publique France pour les (futurs) parents et les professionnels de la périnatalité traitant des sujets de la santé des femmes enceintes, des parents et du bébé.

La vaccination



Le site [Vaccination-info-service.fr](https://vaccination-info-service.fr) propose des informations factuelles, pratiques et scientifiquement validées sur la vaccination aux différents âges de la vie. Futurs et jeunes parents peuvent y trouver les recommandations vaccinales pour les femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse et celles pour les nourrissons et jeunes enfants, ainsi que des informations très pratiques du type « Où se faire vacciner ? », « que faire si mon bébé est enrhumé le jour de la vaccination ? » ou « comment préparer mon enfant qui doit être vacciné », etc.

Calendrier vaccinal des femmes enceintes



Ce document, format carte postale, présente de façon visuelle et synthétique, l'ensemble des vaccinations recommandées avant, pendant et après la grossesse. N'hésitez pas à le commander.

Soutien à l'arrêt de la consommation de tabac, d'alcool et de drogues illicites

Aide à distance



Tabac info service est un dispositif multicanal d'aide à l'arrêt du tabac qui comprend :

- **une ligne téléphonique, le 39 89** : accompagnement personnalisé et gratuit avec un tabacologue, par téléphone.
- **une application mobile Tabac info service** : programme d'e-coaching 100% personnalisé pour préparer son arrêt et suivre quotidiennement ses progrès.
- **un site internet, tabac-info-service.fr** : conseils et informations sur les stratégies d'arrêt.



Les sites Alcool-info-service.fr et Drogues-info-service.fr proposent des informations sur la consommation d'alcool et de drogues pendant la grossesse et l'allaitement, incluant : la consommation involontaire en début de grossesse, les difficultés à l'arrêt et les risques associés. Ils offrent aussi des services d'aide à distance : annuaire des structures spécialisées, forums, chat, FAQ, contenus informationnels et ligne téléphonique gratuite et anonyme avec des professionnels pour aider, informer et orienter.

Dépliants Grossesse sans tabac et sans Alcool



Dépliants d'information destinés aux femmes enceintes et à leur entourage qui traitent respectivement des questions liées à la consommation d'alcool et de tabac pendant la grossesse. Y sont abordés les conséquences possibles de leur consommation sur la grossesse, les traitements d'aide à l'arrêt ainsi que, pour l'alcool, des conseils à l'entourage pour la soutenir dans son arrêt temporaire de consommation. N'hésitez pas à les commander.

Nutrition et promotion de l'activité physique

Le guide « De la grossesse à l'arrivée de bébé, avec sérénité – Alimentation, activité physique et bien-être »



Ce guide destiné aux femmes enceintes contient une information fiable et claire sur la nutrition pendant leur grossesse et des conseils pour avoir une alimentation équilibrée tout en se faisant plaisir, continuer de bouger et vivre une grossesse sereine en prenant soin de leur santé et de celle de leur futur enfant. N'hésitez pas à le commander.

Le Guide de l'allaitement maternel



Ce guide sur la pratique et l'accompagnement à l'allaitement maternel contient des informations simples et illustrées, des réponses aux questions les plus fréquentes, des conseils et des informations pratiques, tant pour le démarrage de l'allaitement que pour sa poursuite au fil des semaines suivant l'accouchement. N'hésitez pas à le commander.

MANGER BOUGER

mangerbouger.fr est le site de référence institutionnel sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité. Le site, qui répond aux enjeux du Programme national nutrition santé, met à disposition des conseils et services en ligne qui aident à aller pas à pas vers une alimentation équilibrée et un mode de vie actif, tout en se faisant plaisir. Son service phare, La Fabrique à menus, femmes enceintes et parents de jeunes enfants peuvent générer en un clic des menus hebdomadaires équilibrés, de saison et personnalisés.

Promouvoir la santé sexuelle et reproductive

Question **Sexualité**

Le site Questionsexualite.fr est le site d'information sur la santé sexuelle pour toutes et tous à partir de 18 ans. Différentes thématiques y sont abordées : IST, contraception, dysfonctions ou encore discriminations et violences. Les femmes enceintes et les jeunes mères pourront tirer profit des articles sur le sexe pendant la grossesse et après l'arrivée d'un enfant, sur la contraception après un accouchement ou encore sur la fausse couche, etc.

Promouvoir la santé périnatale des personnes migrantes

Les livrets de santé bilingues



Support de communication et de dialogue pour les personnes migrantes et les professionnels de la santé ou du social, les livrets de santé bilingues sont conçus pour aider chacun à mieux comprendre le système de protection maladie français, les droits et démarches. Ils sont disponibles en 17 langues. Un chapitre est dédié à la grossesse et au parcours 1000 premiers jours. N'hésitez pas à commander.




A destination des professionnels : un guide pratique sur l'accès aux droits et aux soins en partenariat avec le Comité pour la santé des exilés (Comede).

Pour commander nos supports imprimés : <https://selfservice.santepubliquefrance.fr/>

Les autres projets prévention de la région Nouvelle-Aquitaine

Intervention des partenaires de Santé publique France

IHAB



L'Initiative hôpital ami des bébés (IHAB), est un programme de l'OMS et de l'Unicef déployé dans les services de maternité et de néonatalogie. L'IHAB contribue à créer un environnement favorable à l'allaitement et à développer des pratiques de soins centrées sur les rythmes et besoins des mères et des nouveau-nés. La France compte aujourd'hui 83 établissements labellisés et la démarche continue à se déployer dans toutes les régions-une naissance sur 4 a lieu en France dans une maternité IHAB (labellisée ou en cours de labellisation). Santé publique France, au travers de son programme 1000 premiers jours, soutient le label IHAB. Pour en savoir plus et faire connaître IHAB dans vos réseaux : plaquette institutionnelle.

Label Prévenir pour bien grandir

Le label Prévenir pour bien grandir®, créé en Nouvelle-Aquitaine en 2019 et gratuit pour les maternités, a pour objectif de valoriser l'engagement des maternités et centres périnataux de proximité (CPP) en prévention et promotion de la santé, et ainsi de favoriser la santé des nouveau-nés, des jeunes enfants et de leurs parents. Ce label s'appuie sur des critères répartis sur 7 thématiques :

- risques liés aux vulnérabilités psychiques,
- suivi des nouveau-nés fragiles ou à risque de fragilités,
- nutrition de la mère et du bébé,
- conduites à risque et addictions,
- risques liés aux vulnérabilités sociales,
- santé et environnement,
- risques transversaux liés aux handicaps.



En fonction des critères atteints, la labellisation de la maternité est évaluée de 1 à 3 petits pas. Actuellement, 11 maternités de la région Nouvelle-Aquitaine sont labellisées Prévenir pour bien grandir®.

Projet 5A-QUIT-N

Débuté en 2022, 5A-QUIT-N est un programme de recherche sur l'accompagnement au sevrage tabagique des femmes enceintes en Nouvelle-Aquitaine, porté par le CHU de Bordeaux. La phase pilote s'est déroulée sur le territoire du bassin d'Arcachon en 2020-2021, avec une baisse observée de la prévalence du tabagisme en fin de grossesse (21 % de femmes fumeuses étaient observées en fin de grossesse avant la mise en place de 5A-QUIT-N, contre 16 % l'année suivant sa mise en place). Depuis 2025, le programme a été étendu à l'ensemble de la région.

Stratégie régionale en santé environnementale

L'ARS Nouvelle Aquitaine porte une stratégie régionale de 1000 premiers jours comprenant un volet sur la santé-environnementale. Ces actions ont pour objectif de limiter l'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants aux substances chimiques présentes dans l'environnement intérieur, en particulier les perturbateurs endocriniens.

Ces actions sont engagées en direction des maternités pour les emmener vers plus d'écoresponsabilité et pour former des professionnels à proposer des ateliers de sensibilisation des futurs et jeunes parents aux polluants de l'air intérieur. ; Des actions sont également engagées vers les crèches avec la diffusion des recommandations des guides « Recocrèches » et les assistantes maternelles et d'autres professionnels pour les former à la santé-environnementale afin de les inciter à l'intégrer dans leurs pratiques. Ces actions sont conduites sur l'ensemble du territoire néo-aquitain.

Parcours COCON

Le dispositif COCON est une expérimentation article 51, déployée en Nouvelle-Aquitaine depuis 2023, visant à structurer un parcours périnatal précoce et coordonné pour les enfants vulnérables. Il repose sur :

- un repérage précoce des vulnérabilités,
- une coordination renforcée ville-hôpital-PMI,
- et la mise en place d'un réseau de suivi des enfants vulnérables (RSEV).

Le dispositif cible les femmes enceintes, nouveau-nés et familles à risque, avec une montée en charge progressive à l'échelle régionale. Les inclusions sont en cours jusqu'en septembre 2026. Au

30 avril 2026 : 2 259 nouveau-nés ont été inclus. Cette expérimentation mobilise une équipe dédiée d'environ 10 ETP, elle s'appuie sur des outils de repérage, de formation et de soutien aux pratiques. L'évaluation finale est prévue en 2027.

Dispositif CoPA

Le dispositif COPA s'inscrit également dans le cadre d'une expérimentation nationale article 51, initialement développée dans le Grand Est à partir de 2021, puis déployée à une échelle élargie (COPA V2) à partir de 2025-2026, notamment dans les départements de la Corrèze et de la Dordogne.

Le dispositif COPA vise à renforcer l'accompagnement postnatal à domicile en complément du suivi médical assuré notamment par les sages-femmes. Il repose sur l'intervention d'auxiliaires de puériculture, qui réalisent au moins deux visites à domicile dans les trois semaines suivant la naissance afin d'accompagner concrètement les parents dans leur quotidien.

Ce dispositif s'adresse aux jeunes parents en post-natal, hors situations médico-psycho-sociales complexes réservées à la PMI. Depuis son déploiement début 2026, 30 % des femmes ont été éligibles, avec des variations selon les territoires (27 % à Périgueux, 34,1 % à Brive, 32,5 % à Bergerac), traduisant une montée en charge progressive du dispositif.

Méthodologie

Populations, période et zones géographiques

Ce bulletin porte sur deux populations principales :

- Les femmes ayant accouché d'au moins un enfant (né vivant ou mort-né), selon la définition française : naissance à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou poids de l'enfant $\geq$ 500 grammes.
- Les enfants issus de naissances vivantes ou mort-nées, selon les mêmes seuils.

Quand cela a été possible (SNDS, Etat-Civil), les indicateurs ont été déclinés annuellement entre 2012 et 2024, et pour la France entière incluant l'Hexagone, les cinq départements et régions d'outre-mer (DROM) : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, et deux des collectivités d'Outre-mer (COM) : Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour la majorité des indicateurs (SNDS, Etat civil, CépiDC, ENCMM), la déclinaison territoriale est réalisée selon le domicile de la femme ou de l'enfant.

Pour les indicateurs issus de l'ENP, la déclinaison est réalisée selon le lieu d'accouchement / de naissance et pour les indicateurs issus du CNCDN, la déclinaison est réalisée selon le lieu du dépistage, donc principalement le lieu de naissance.

Sources de données

Enquête nationale périnatale (ENP) et ENP-DROM

L'Enquête nationale périnatale (ENP) est une enquête transversale répétée environ tous les six ans depuis 1995 (données 2010, 2016 et 2021 dans ce bulletin). Le recueil est réalisé dans toutes les maternités (publiques et privées) et les maisons de naissance pendant une semaine. Toutes les naissances vivantes et mort-nées (âgées d'au moins 22 semaines d'aménorrhée ou pesant au moins 500 gr à la naissance) sont incluses. Les données portent sur les pratiques médicales, les facteurs de risque, les caractéristiques des parents et la santé de la mère et de l'enfant. Elles sont collectées :

- auprès des établissements (caractéristiques et organisation des soins)
- via le dossier médical (antécédents obstétricaux, déroulement de l'accouchement, état de santé de la mère avant, pendant et après l'accouchement et état de santé de l'enfant)
- auprès des mères via
 - (1) un entretien en face-à-face par une sage-femme en suites de couches ;
 - (2) un auto-questionnaire web (ou via un télé-enquêteur) à 2 mois du post-partum (depuis l'édition 2021 de l'ENP). Les données issues du questionnaire 2 mois post-partum ont été pondérées pour être représentatives des inclusions en maternité.

En 2021, les DROM, hormis la Guyane, ont étendu la durée de l'enquête pour obtenir un échantillon représentatif (ENP-DROM).

Limites :

- L'enquête n'est pas conçue pour produire des indicateurs régionaux robustes pour toutes les régions notamment celles enregistrant moins de 400 naissances (Nouvelle-Aquitaine : 887 en maternité ; 675 à deux mois).
- En raison de faibles effectifs, les données sont non exploitables pour les DROM et la Corse sur les enquêtes 2010 et 2016 et pour la Corse et Saint-Barthélemy en 2021.
- En raison de perte dans le suivi à deux mois dans l'ENP 2021, certains indicateurs ne sont pas disponibles pour la Guyane, Mayotte et Saint-Martin.
- Les données autodéclarées peuvent être biaisées (mémoire, désirabilité sociale).

Hospitalisations et consommations de soins (SNDS)

Le Système National des Données de Santé (SNDS), géré par la Cnam, inclut notamment :

- Les données de l'Assurance maladie (Système national d'information interrégimes de l'Assurance maladie - Sniiram) comportant les données de remboursements de soins (telles que la délivrance de médicaments, les consultations médicales, les actes paramédicaux ou les examens biologiques remboursés) ;
- Les données des séjours hospitaliers dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) comportant les données d'hospitalisations pour accouchement et pour naissance du PMSI-MCO. Cette base recueille les données médico-administratives exhaustives relatives aux séjours dans tous les établissements publics et privés de santé de courte durée de la France entière.

Les données SNDS de ce bulletin sont issues d'une base corrigée produite par Santé publique France des naissances et des accouchements. Les corrections portent sur le traitement d'incohérences entre les séjours des mères et les séjours de leur(s) nouveau-né(s) et le traitement d'incohérences entre des séjours de transferts d'un même individu (mère ou nouveau-né).

Limites :

- La qualité du codage peut varier selon les établissements - rigueur des cliniciens, respect des règles de codage et des contrôles des DIM – pouvant entraîner des biais de mesure.
- Peu d'informations socio-économiques sont disponibles (hors couverture sociale et complémentaire santé), limitant l'analyse des inégalités sociales de santé.
- L'affiliation à la sécurité sociale est insuffisante sur Mayotte pour permettre de disposer de certaines données sur ce territoire.
- Ces contraintes imposent une interprétation prudente des résultats et une connaissance approfondie de ses spécificités pour éviter les erreurs d'analyse.

Plus d'informations sur les données du SNDS

Etat civil (Insee)

Les données d'état civil, fournies par l'Insee, recensent chaque naissance vivante et chaque décès enregistrés en mairie. Elles couvrent l'ensemble du territoire, avec des données exhaustives et annuelles.

Limites :

- Certaines naissances peuvent être classées différemment entre l'Etat civil et le PMSI (exemple : certaines naissances enregistrées comme mort-nées dans le PMSI apparaissent comme naissances vivantes suivies d'un décès le jour même dans les registres d'Etat civil)
- Mayotte est inclus depuis 2014.
- Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont regroupés avec la Guadeloupe.

Plus d'informations sur les bases des naissances vivantes

Plus d'informations sur les bases des décès

Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM)

L'ENCMM est un dispositif dédié à l'étude de la mortalité maternelle en France, un phénomène rare mais révélateur de la qualité des soins périnataux. Il s'appuie sur quatre sources principales : les signalements des réseaux de santé périnatale, les certificats de décès du CépiDc, les données de l'Insee (liant naissances et décès maternels dans l'année suivant l'accouchement), et les bases du PMSI (décès survenus en établissement hospitalier). L'enquête permet d'analyser les causes des décès maternels, d'évaluer leur lien avec la grossesse, et d'apprécier la qualité des soins prodigués (optimaux ou non). Elle identifie également l'évitabilité des décès pour formuler des recommandations de prévention.

Limites :

- Délai dans la disponibilité des données.
- Certains décès peuvent ne pas être identifiés, surtout s'ils surviennent après le post-partum immédiat.

Centre national de coordination du dépistage néonatal (CNCDN)

Le dépistage néonatal est une stratégie de santé publique qui consiste à repérer chez le nouveau-né certaines maladies graves, rares et le plus souvent d'origine génétique, avant même l'apparition des premiers signes et symptômes ; ceci dans le but de proposer à chaque enfant une prise en charge précoce adaptée. Ce dépistage est coordonné au niveau national par le Centre national de coordination du dépistage néonatal (CNCDN) depuis 2018. Le dépistage biologique concerne 6 maladies : la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la drépanocytose, la mucoviscidose et le déficit en Medium-Chain-Acyl-CoA Déshydrogénase.

Limites :

- Avant 2024, le dépistage de la drépanocytose était systématique dans les DROM mais ciblé en Hexagone.
- Le déficit en MCAD a été ajouté dans le test de Guthrie depuis 2022 et, en raison d'effectifs faibles, les données ne sont pas présentées à l'échelle régionale.

Analyses statistiques

Comparaisons entre territoires

Pour identifier d'éventuelles différences significatives entre un territoire spécifique et le reste de la France, des tests statistiques adaptés ont été appliqués avec des tests du χ^2 pour comparer les proportions ou les distributions catégorielles.

Excepté pour les données de mortalité maternelle, caractérisées par de faibles effectifs, où un test exact basé sur la loi de Poisson a été privilégié afin d'assurer une comparaison robuste.

La significativité statistique des résultats a été classée en trois niveaux :

- $p < 0,001$ (symbolisé par ***)
- $p < 0,05$ (**)
- $p < 0,10$ (*).

Dans les commentaires, il est considéré que la différence était significative au seuil de 0,05 (**). Les représentations cartographiques utilisent la discrétisation par quantiles en 5 classes pour les choroplèthes.

Gestion des petits effectifs

En raison d'un risque potentiel de réidentification, les effectifs strictement inférieurs à 5 et différents de zéro ont été floutés, ainsi que les taux, proportions et totaux correspondants. Ce floutage explique que certains effectifs soient approximés.

Références

- [1] Santé publique France. Surveillance de la Santé Périnatale. Bulletin. Édition nationale. Saint-Maurice : Santé publique France, 49 pages, 8 juillet 2026. Disponible à partir de l'URL : <https://www.santepubliquefrance.fr/anomalies-congenitales/bulletin-national/sante-perinatale-et-petite-enfance-en-france-entre-2012-2024>
- [2] Groupe de travail « Indicateurs ScanSanté » de la FFRSP. Indicateurs de santé périnatale, France hexagonale et DROM. Février 2026. 53 pages. Disponible à partir de l'URL : <https://ffrsp.fr>
- [3] Gomes E, Menguy C, Cahour L, Lebreton É, Regnault N et le groupe de travail sur les indicateurs en périnatalité. Rapport de surveillance de la santé périnatale en France 2010-2019. Santé publique France. Saint-Maurice : 2024. 165 p. Disponible à partir de l'URL : www.santepubliquefrance.fr
- [4] Mamelle N, Cochet V, Claris O. Definition of fetal growth restriction according to constitutional growth potential ; 80:277-285. Courbes mises à jour en 2006.
- [5] Salanave B, Lebreton E, Demiguel V, Regnault N et « Epifane2021 Study Group ». Alimentation des nourrissons pendant leur première année de vie. Résultats de l'étude Épipane 2021. Saint-Maurice : Santé publique France, 2024. 43 p. Disponible à partir de l'URL : www.santepubliquefrance.fr
- [6] Inserm, Santé publique France. Les morts maternelles en France : mieux comprendre pour mieux prévenir. 7^e rapport de l'Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM), 2016-2018. Saint-Maurice : Santé publique France, 2024. 232 p. Disponible à partir de l'URL : www.encmm.inserm.fr et www.santepubliquefrance.fr

Glossaire

AFTN : Anomalies de fermeture du tube neural	HAS : Haute Autorité de Santé
AME : Aide Médicale d'Etat	HCSP : Haut conseil de Santé publique
C2S : Complémentaire santé solidaire	HPP : Hémorragie post-partum
CépiDc : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès	HTA : Hypertension artérielle
CMV : Cytomégalovirus	IHAB : initiative Hôpital ami des Bébé
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales	Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
Cnam : Caisse national d'assurance maladie	IST : Infection sexuellement transmissible
CNGOF : Collège national des gynécologues et obstétriciens français	MIN : Mort inattendue du nourrisson
CNCDN : Centre national de coordination du dépistage néonatal	MCAD : <i>Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase</i>
DIM : Département de l'information médicale	MCO : Médecine-Chirurgie-Obstétrique
DROM : Département et région d'outre-mer	OMS : Organisation mondiale de la Santé
DREES : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques	PANJO : Promotion de la santé et de l'Attachement des Nouveau-nés et de leurs Jeunes parents
EPDS : <i>Edinburgh Postnatal Depression Scale</i>	PMI : Protection Maternelle et Infantile
ENCMM : Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles	PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information
ENP : Enquête nationale Périnatale	RSEV : Réseaux de suivi d'enfant vulnérables
FEES : Femmes Enceintes Environnement et Santé	SA : Semaine d'aménorrhée
FFRSP : Fédération française des réseaux de Santé périnatale	SNDS : Système national des données de Santé
	SNIIRAM : Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie
	VBNI : Voie basse non instrumentale

Remerciements

Santé publique France tient à remercier

- Nathalie Lelong et Camille Le Ray (Inserm, équipe Oppale),
- Emilie Marrer (Réseau Périnatal Lorrain) et Hélène Tillaut (Réseau Périnatalité Bretagne) pour le GT Indicateurs de la FFRSP

qui ont contribué à sélectionner les indicateurs à diffuser dans ce bulletin.

Nous remercions également l'ensemble des partenaires en région qui ont contribué à la rédaction et l'interprétation des résultats de ce bulletin : Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine.

Équipe de rédaction

Auteurs : Sandrine Coquet, Laure Meurice, Alice Herteau, Sandrine Huguet, Laurent Filleul

Fourniture des données & Conception de la maquette :

- Elodie Lebreton, Daniel Bejarano-Quisoboni (Santé publique France, Direction des maladies non transmissibles et traumatismes)
- Lisa Cahour, Oumayma Zougagh (Santé publique France, Direction Appui, Traitements et Analyses de données),
- Maud Gorza, Sandie Sempé (Santé publique France, Direction Prévention et Promotion de la Santé)
- François Clinard, Amandine Cochet, Sandrine Coquet, Jamel Daoudi, Noémie Fortin, Valérie Henry, Mélanie Martel, Mathilde Melin, Hélène Prouvost, Mathieu Rivière, Emmanuelle Vaissière, Nicolas Vincent (Santé publique France, Direction des Régions)
- Garance Doudeau (Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal)
- Annick Vilain (DREES)

Pour nous citer : Surveillance de la Santé Périnatale. Bulletin. Édition Nouvelle-Aquitaine. Saint-Maurice : Santé publique France, 49 pages, 8 juillet 2026

Directrice de publication : Aude de Viviès, directrice par intérim

Date de publication : 8 juillet 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr