



Date de publication : 19.08.2026

ÉDITION HEXAGONALE

Point hebdomadaire n° 10

SOMMAIRE

Points clés	1
Situation météorologique	3
Synthèse sanitaire	4

Points clés

- Un nouvel épisode de canicule touche la France Hexagonale depuis le 29 juillet. La surveillance présentée dans ce bulletin s'étend sur la période du 11 au 17 août. Pendant cette période, 91% de la population hexagonale a été concernée par au moins un jour de vigilance orange canicule.
- Le nombre de passages aux urgences quotidiens tous âges pour l'indicateur iCanicule (hyperthermies/coup de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) a oscillé entre 230 et 305 (pic de passages le 14/08) entre le 11 et le 15/08. Des augmentations de passages aux urgences pour iCanicule sont observées dans toutes les classes d'âges. Plus de la moitié des passages concernent des personnes de 75 ans et plus. Les effectifs semblent en diminution depuis le 16/08 (données non consolidées).
- Le nombre d'hospitalisations quotidiennes après passage aux urgences pour l'indicateur iCanicule a oscillé entre 146 et 184 (pic le 14/08) entre le 11 et le 15/08. Entre 50 et 60 concernaient des personnes de 15-74 ans, et entre 75 et 120 des personnes de 75 ans et plus.
- Le nombre de consultations SOS médecins quotidiens tous âges pour l'indicateur iCanicule a oscillé entre 30 et 91 (pic de consultations le 15/08) entre le 11 et le 16/08. Des augmentations de consultations SOS médecins pour iCanicule sont observées dans toutes les classes d'âges. Près de la moitié des consultations concernent des personnes de 15-74 ans et plus. Les effectifs semblent en diminution depuis le 16/08 (données non consolidées).
- Les dynamiques observées dans les recours aux soins sont cohérentes avec la dynamique des températures. Ces impacts soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention et d'adaptation pour l'ensemble de la population, sur la base des prévisions météorologiques, sans attendre d'observer des impacts. Pour rappel, les impacts sur la morbidité ne permettent pas de présager de la mortalité.

Ce point hebdomadaire couvre la période du 11 août au 17 août (lundi précédant la publication).

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire disponible en ligne.

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo-France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie, regroupés dans un indicateur composite appelé iCanicule) apparaissant moins de 24 heures après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.


L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que les **tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Situation météorologique

Un nouvel épisode de canicule touche le sud-est de la France Hexagonale depuis le 29 juillet. Entre le 11 et le 17 août, période couverte par ce bulletin, 91% de la population a été concernée par au moins un jour de vigilance orange canicule (Figure 1). Aucun département n'est passé en vigilance rouge canicule lors de cet épisode.

Cet épisode succède à deux périodes de canicule intenses en juin et juillet, au sein d'un été très chaud. Ces expositions répétées et prolongées aux fortes chaleurs peuvent accroître la vulnérabilité des populations, en particulier les plus fragiles. L'été 2026 est remarquable par l'intensité et la fréquence des canicules successives, qui sont aggravées par le changement climatique d'origine anthropique¹.

Figure 1. Durée des vigilances orange ou rouge canicule entre le 11 et le 17 août



Sources : GéoFLA, Météo France

Par ailleurs, la chaleur et les feux de forêts ont contribué à une dégradation de la qualité de l'air (ozone et particules fines) dans ces régions, avec des dépassements ponctuels des seuils d'information et d'alerte. Plus d'informations sur les liens entre ozone, chaleur et santé sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

¹ Zanchi, M., Holmberg, E., Alvarez-Castro, M. C., Alberti, T., Fučkar, N. S., Yiou, P., Tang, H., Lucarini, V., Galatolo, S., Messori, G., Chericoni, M., Coppola, E., Dafis, S., & Faranda, D. (2026). Anthropogenic climate change amplified the June 2026 Western European heatwave. *ClimaMeter*, Institut Pierre Simon Laplace, CNRS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21136744>

Synthèse sanitaire

Cette synthèse est réalisée sur l'ensemble de la France hexagonale. Il est à noter que tous les territoires n'ont pas été touchés par la chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité. La surveillance présentée dans ce bulletin s'étend sur la période du 11 au 17 août.

L'analyse des recours aux soins d'urgence à travers l'indicateur composite suivi dans le cadre du système d'alerte canicule et santé (iCanicule, comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) est la suivante :

Pour iCanicule :

- Le nombre de passages aux urgences quotidiens tous âges pour l'indicateur iCanicule a oscillé entre 230 et 305 (pic de passages le 14/08), entre le 11 et le 15/08 (Figure 2). Des augmentations de passages aux urgences pour iCanicule sont observées dans toutes les classes d'âges. Plus de la moitié des passages concernent des personnes de 75 ans et plus. Les effectifs semblent diminuer légèrement les 16 et 17/08 (données non consolidées).
- Le nombre de consultations SOS médecins quotidiennes tous âges pour l'indicateur iCanicule a oscillé entre 30 et 91 (pic de consultations le 15/08), entre le 11 et le 16/08 (Figure 2). Des augmentations de consultations SOS médecins pour iCanicule sont observées dans toutes les classes d'âges. Près de la moitié des consultations concernent des personnes de 15-74 ans et plus. Les effectifs semblent diminuer légèrement les 16 et 17/08 (données non consolidées).
- La part d'iCanicule dans l'activité totale des urgences a oscillé entre 0,45 et 0,62 % entre le 10 et le 15/08 tous âges. Elle est restée stable autour de 0,3 % pour les moins de 15 ans, 0,4 % pour les 15-74 ans et 1,6% pour les 75 ans et plus (avec un pic à 1,89 % le 14/08). Le 17/08, la part d'iCanicule tous âges est en diminution, proche de 0,3 %. La baisse semble s'amorcer dans toutes les classes d'âges.
- La part d'iCanicule dans l'activité totale SOS médecins a oscillé entre 0,3 et 0,83 % entre le 10 et le 15/08 tous âges, entre 0,3 et 0,85 % pour les moins de 15 ans, 0,2 et 0,85 % pour les 15-74 ans et 1 et 3,02 % pour les 75 ans et plus (pic à 3,02 % le 13/08). Le 17/08, la part d'iCanicule tous âges est en diminution, proche de 0,3 %. La baisse semble s'amorcer dans toutes les classes d'âges.
- Le nombre d'hospitalisations quotidiennes après passage aux urgences pour l'indicateur iCanicule a oscillé entre 146 et 184 (pic le 14/08) entre le 11 et le 15/08. Entre 50 et 60 concernaient des personnes de 15-74 ans, et entre 75 et 120 des personnes de 75 ans et plus.
- L'analyse différenciée des passages aux urgences et consultations SOS médecins selon le niveau de vigilance canicule souligne un gradient d'activité pour les départements en vigilance jaune et orange canicule par rapport aux départements en vert (Tableau 1).

Pour les hyperthermies / coups de chaleur :


- Les passages aux urgences pour hyperthermies et coups de chaleur ont augmenté à partir du 10/08, avec un pic à 79 passages le 14/08. Ces passages concernaient principalement des personnes de 15-74 ans.
- Les actes SOS médecins pour coup de chaleur ont également augmenté à partir du 11/08 avec un pic à 60 actes le 15/08. Ces actes concernaient principalement des personnes de 15-74 ans.

Tableau 1. Part d'iCanicule dans l'activité totale des urgences et de SOS médecins, selon le niveau de vigilance canicule entre le 11 et le 17 août

	Vert	Jaune	Orange	Rouge
Part d'iCanicule dans l'activité totale des urgences	0,34 %	0,43 %	0,55 %	-
Part d'iCanicule dans l'activité totale SOS médecins	0,28 %	0,35 %	0,71 %	-

Source : SurSaUD®

Figure 2. Part de la population en vigilance canicule et nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour l'indicateur iCanicule en France hexagonale et pour les départements en vigilance orange et rouge canicule
Données non consolidées à J-1 (pointillés).



Sources : Météo France, SurSaUD®, Insee

Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours.
L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires qui nous transmettent les données pour réaliser cette surveillance : Météo-France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS médecins.

En savoir plus

Une analyse est également réalisée pour chaque région concernée par au moins un département placé par Météo-France en vigilance météorologique orange. Les bulletins régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « Notre action ».

Dossiers et rapports de Santé publique France

- Dossier fortes chaleurs et canicules
- Outils de prévention
- Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique
- Changement Climatique

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 17 août 2026. Édition nationale. Saint-Maurice : Santé publique France, 6 p., 2026.

Directeur de publication : Étienne Pot, Directeur général par intérim

Date de publication : 19 août 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr