



Chikungunya, dengue, Zika et virus West Nile

Date de publication : 02/10/2026


ÉDITION NOUVELLE-AQUITAINE

Le **chikungunya**, la **dengue** et le **Zika** sont des pathologies transmises par les moustiques du genre *Aedes* alors que l'**infection à virus West Nile** (VWN) est une pathologie transmise principalement par les moustiques du genre *Culex*. Ces pathologies sont à **signalement obligatoire**.

Points clés de la surveillance renforcée dans la région

Plusieurs épisodes de transmission autochtone de chikungunya et de dengue détectés

- Treize épisodes autochtones de chikungunya identifiés (12 en Gironde et 1 dans les Landes) dont 12 toujours actifs :



* Episode clos

- Un épisode autochtone de dengue identifié en Dordogne (clos) :



- Les investigations, les mesures de gestion et de prévention se poursuivent.

Des cas autochtones d'infection à virus West Nile détectés en 2026

- Six cas autochtones identifiés en Gironde :



- Des mesures de sécurisation des produits issus du corps humain ont été mises en œuvre en Gironde.

Chikungunya, dengue et Zika

Le chikungunya, la dengue et le Zika sont des pathologies transmises par les moustiques du genre *Aedes*. Dans l'Hexagone, les moustiques *Aedes albopictus* (**moustique tigre**) sont actifs **de mai à novembre**. Pendant cette période, **la surveillance est renforcée** : après des investigations épidémiologiques et entomologiques, des actions de démoustication peuvent être réalisées autour des lieux fréquentés par les cas afin de limiter le risque de transmission au niveau local et l'apparition de cas autochtones (personnes n'ayant pas séjourné dans une zone de circulation virale en dehors de l'Hexagone, dans les 15 jours précédant le début des symptômes).

Cas autochtones

En Nouvelle-Aquitaine, le 30 septembre 2026, **76 cas autochtones de chikungunya** répartis au sein de **treize épisodes de transmission** ont été identifiés dans le département de la Gironde (12 épisodes) et dans les Landes (1 épisode) (Tableau 1, Figure 1). En dehors du premier cas, tous les cas identifiés ont présenté des symptômes à partir du 20 juillet 2026. Parmi ces épisodes, douze sont toujours actifs et le nombre de cas est évolutif. Par ailleurs, **un cas autochtone de dengue** a été identifié en Dordogne ; l'épisode est clos.

Au 28 septembre 2026¹, dans les autres régions de l'Hexagone, six épisodes de transmission autochtone de chikungunya (39 cas identifiés en Occitanie, 6 en Ile-de-France et 4 en Provence-Alpes-Côte d'Azur) et trois épisodes autochtones de dengue (3 cas en Occitanie et 2 en Provence-Alpes-Côte d'Azur) ont été identifiés.

Lors de l'identification d'épisodes de transmission autochtone, des mesures de lutte anti-vectorielle sont réalisées autour des lieux fréquentés par ces personnes, par les opérateurs de démoustication mandatés par l'Agence régionale de santé (ARS). Une recherche active de cas est effectuée par les équipes de l'ARS et de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine pour déterminer l'étendue de la transmission locale et ajuster le périmètre du traitement de lutte anti-vectorielle si nécessaire. Cette recherche active de cas repose sur la sensibilisation des professionnels de santé et de la population des secteurs concernés, et des enquêtes en porte-à-porte peuvent être réalisées dans le voisinage des cas identifiés afin d'identifier d'autres personnes symptomatiques. Des mesures adaptées de sécurisation des produits issus du corps humain sont par ailleurs mises en œuvre.

Tableau 1. Description des épisodes de transmission autochtone de chikungunya et dengue, Nouvelle-Aquitaine (données arrêtées au 30 septembre 2026, non consolidées)

Virus	Département	Commune	Nombre de cas autochtones	Date de début des signes du 1 ^{er} cas	Date de début des signes du dernier cas	Episode clos
Dengue	Dordogne	Mouleydier	1	10/06/2026	10/06/2026	Oui
Chikungunya	Gironde	Saint-Médard-en-Jalles	1	06/06/2026	06/06/2026	Oui
Chikungunya	Gironde	Prignac-et-Marcamps	30	20/07/2026	10/09/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Talence	5	12/08/2026	15/09/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Cavignac	6	17/08/2026	16/09/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Arcachon	16	17/08/2026	20/09/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Bordeaux	1	20/08/2026	20/08/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Etauliers	3	24/08/2026	05/09/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Portets	1	31/08/2026	31/08/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Créon	1	05/09/2026	05/09/2026	Non
Chikungunya	Landes	Biscarosse	6	02/09/2026	15/09/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Cadaujac	2	10/09/2026	11/09/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Saint-André-de-Cubzac	2	09/09/2026	19/09/2026	Non
Chikungunya	Gironde	Saint-Mariens	2	11/09/2026	11/09/2026	Non

¹ Dans ce bulletin, les données régionales sont arrêtées au 30 septembre 2026. Dans le bulletin dédié à la situation en France hexagonale, les données relatives aux cas autochtones sont arrêtées au 28 septembre 2026. De ce fait, les chiffres peuvent être différents.

Les épisodes de Talence, Cavignac et Arcachon sont liés à celui de Prignac-et-Marcamps. Celui de Portets est lié à celui d'Arcachon et celui de Saint-André-de-Cubzac est lié à celui de Cavignac (Figure 2).

Figure 1. Localisation des épisodes de transmission autochtone de chikungunya et dengue, Nouvelle-Aquitaine (données arrêtées au 30 septembre 2026)





Figure 2. Lien entre les épisodes de transmission autochtone de chikungunya sur les communes de Prignac-et-Marcamps, Talence, Cavignac, Arcachon, Portets et Saint-André-de-Cubzac, Gironde, Nouvelle-Aquitaine (données arrêtées au 30 septembre 2026)



Cas importés

Chikungunya

- Du 1^{er} mai au 30 septembre 2026, **22 cas importés de chikungunya**, probables ou confirmés, ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine (contre 148 l'année dernière au 15 septembre 2025).
- La plupart des cas ont été identifiés dans le département de la Gironde (n = 11).
- Personnes revenant principalement des départements et régions d'Outre-mer (n = 13).

Dans l'Hexagone², du 1^{er} mai au 27 septembre 2026, 152 cas importés de chikungunya ont été identifiés. Les personnes revenaient principalement de l'île Maurice (n = 46), de Guyane française (n = 40) et de Mayotte (n = 17).

Dengue

- Du 1^{er} mai au 30 septembre 2026, **40 cas importés de dengue**, probables ou confirmés, ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine (contre 115 l'année dernière au 15 septembre 2025).
- La plupart des cas ont été identifiés dans le département de la Gironde (n = 24).
- Personnes revenant principalement des DROM (n = 21 dont 16 de Martinique).


Dans l'Hexagone², au 27 septembre 2026, 424 cas importés de dengue ont été identifiés. Les personnes revenaient pour la plupart de Martinique (n = 142).

Zika

- Aucun cas importé de Zika identifié en Nouvelle-Aquitaine.

Dans l'Hexagone, au 27 septembre 2026, 17 cas importés de Zika ont été identifiés.

Figure 3. Répartition des cas importés de dengue et de chikungunya par semaine de signalement du 1^{er} mai au 30 septembre 2026, Nouvelle-Aquitaine



² Dans ce bulletin, les données régionales sont arrêtées au 30 septembre 2026. Dans le bulletin dédié à la situation en France hexagonale, les données relatives aux cas importés sont arrêtées au 27 septembre 2026. De ce fait, les chiffres peuvent être différents.

Tableau 2. Répartition des cas importés de dengue et de chikungunya par département de signalement du 1^{er} mai au 30 septembre 2026, Nouvelle-Aquitaine

Département	Dengue	Chikungunya
Charente	3	0
Charente-Maritime	6	2
Corrèze	1	0
Creuse	0	0
Dordogne	0	3
Gironde	24	11
Landes	1	1
Lot-et-Garonne	0	1
Pyrénées-Atlantiques	1	3
Deux-Sèvres	1	1
Vienne	3	0
Haute-Vienne	0	0
Nouvelle-Aquitaine	40	22

Infections à virus West Nile

L'infection à virus **West Nile** est une pathologie **transmise principalement par les moustiques du genre *Culex***, qui sont actifs **de juin à fin novembre** dans l'Hexagone où ils sont endémiques. Une transmission interhumaine du VWN par transfusion sanguine, transplantation d'organes, de tissus ou de cellules est possible. Pour réduire le risque de transmission par les produits du corps humain, des mesures de sécurisation des dons sont mises en œuvre lorsque la circulation du virus est avérée sur un territoire.

Au 30 septembre 2026, 6 cas humains autochtones d'infection à virus West Nile ont été identifiés en Gironde. Par ailleurs, des cas équins autochtones d'infection à VWN ont été rapportés en Charente-Maritime, en Dordogne, en Gironde, dans les Landes et le Lot-et-Garonne.


Dans l'Hexagone³, au 28 septembre 2026, 145 autres cas humains autochtones d'infection à virus West Nile ont été identifiés (régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire).

³ Dans ce bulletin, les données régionales sont arrêtées au 30 septembre 2026. Dans le bulletin dédié à la situation en France hexagonale, les données relatives aux cas autochtones sont arrêtées au 28 septembre 2026. De ce fait, les chiffres peuvent être différents.

Signalement

Le chikungunya, la dengue, le Zika et les infections à virus West Nile sont des maladies à signalement obligatoire (MSO). Les cliniciens et les biologistes doivent **signaler sans délai tout résultat biologique positif** pour l'une de ces pathologies sur le **portail de signalement** (version dématérialisée des fiches Cerfa).

Pour en savoir plus : retrouvez [ici](#) les repères pour votre pratique « Dengue, chikungunya, Zika : de la prévention au signalement. France hexagonale – Corse »



Caractéristiques entomologiques

Tableau 3. Comparaison des caractéristiques de *Culex pipiens* et *Aedes albopictus* (Source : CR SpF Île-de-France)

Caractéristique	<i>Culex pipiens</i>	<i>Aedes albopictus</i>
Aspect ¹		
Origine géographique	Cosmopolite tempéré	Originaire d'Asie du Sud-Est
Répartition actuelle	Mondiale, surtout zones tempérées	Expansion mondiale, zones tropicales et tempérées
Taille du moustique adulte	4 à 7 mm (plus petit qu'une pièce d'un centime)	4 à 6 mm (plus petit qu'une pièce d'un centime)
Couleur	Brun-gris	Noir mat, abdomen et pattes zébrées (« Moustique Tigre »)
Activité des adultes	Crépusculaire / nocturne	Diurne, pic d'activité tôt le matin et en fin d'après-midi
Habitat	En extérieur ou en intérieur (dont Métro) Eaux stagnante riche en déchets : Egouts, mares, seaux, soucoupes, caves, récipients non vidés, Adultes : plinthes, dessous de meubles ou arrières de rideaux, caves ...	Œufs et larves dans les petites collections d'eau propre, en extérieur (gouttières, récipients jouets, soucoupes, creux d'arbre ou bambous, bouchons ...). Adultes : zones végétalisées, buissons, regards d'eaux pluviales, véhicules...
Vol	Bourdonne	Silencieux
Distance de vol ²	Généralement 0,5 à 2 km, jusqu'à 10 km pour la recherche de sites de ponte ou d'hôtes (dispersion active). Peut être transporté passivement sur de plus longues distances (véhicules, vent).	Généralement 50 à 200 m, rarement plus de 1 km en dispersion active. Dispersion passive sur de très longues distances via le transport d'œufs ou d'adultes (commerce de pneus usagés, plantes, etc.).
Préférence trophique	Ornithophile (oiseaux), mais aussi mammifères et humains	Anthropophile (humains), mais aussi mammifères et oiseaux
Vecteur d'agents infectieux	Virus West Nile, Usutu, filariose, encéphalites ³	Dengue, chikungunya, Zika, fièvre jaune, peut-être West Nile
Résistance aux insecticides	Variable, résistances rapportées	Résistances croissantes rapportées
Diapause hivernale	Oui (femelles adultes)	Oui (œufs)
Comportement de ponte	Radeaux d'œufs à la surface de l'eau	Œufs pondus individuellement sur les parois humides au-dessus de la ligne de flottaison

¹ <https://solution-nuisible.fr/guides-conseils/moustique/especes-de-moustiques-tigre-commun-anophele-cousin/>

² <https://doi.org/10.1016/j.limno.2013.11.002>

³ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11281716/>

Mesures de prévention


Les mesures de prévention les plus efficaces contre ces pathologies sont la protection contre les piqûres de moustiques et la lutte contre les gîtes larvaires.



Au retour d'un séjour en zone intertropicale ou en France hexagonale où le virus de la dengue ou du chikungunya circule, soyez prudents pendant 15 jours :

- Adoptez les bons gestes pour **éviter de vous faire piquer** et de transmettre la maladie en France hexagonale ;
- Dès l'apparition de symptômes compatibles avec la dengue ou le chikungunya (fièvre brutale, douleurs musculaires, douleurs articulaires, maux de tête et/ou éruption cutanée), consultez un médecin qui pourra prescrire une analyse sanguine.

Soyez prudents : adoptez les bons gestes
pour éviter de vous faire piquer et de transmettre la maladie



Partenaires

L'équipe de Santé publique France en Nouvelle-Aquitaine remercie tous les acteurs qui contribuent à la surveillance de ces arboviroses, notamment : l'ARS Nouvelle-Aquitaine, les opérateurs de lutte antivectorielle, le CNR des arbovirus, les laboratoires de biologie médicale de ville et hospitaliers, les médecins libéraux et hospitaliers, l'Etablissement français du sang (EFS) ainsi que le réseau « One Health » Nouvelle-Aquitaine

Pour en savoir plus

Site de Santé publique France : Arboviroses en France hexagonale – Bulletin du 30 septembre 2026 ; dossier consacré aux maladies à transmission vectorielle

Site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine : pages dédiées au moustique tigre et au virus West Nile

Site du Centre national de référence (CNR) des arbovirus : <https://cnr-arbovirus.fr/>

Site du ministère de la Santé et de la Prévention : dossier sur les moustiques vecteurs de maladies

Site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères : conseils aux voyageurs

Site de l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) : données sur les virus de la dengue, du chikungunya, du Zika et du West Nile

Signalement du moustique tigre : https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

Équipe de rédaction

Anne Bernadou, Christine Castor, Sandrine Coquet, Philippine Delemer, Gaëlle Gault, Laurent Filleul, Alice Herteau, Sandrine Huguet, Laure Meurice, Pascal Vilain

Pour nous citer : Bulletin arboviroses. Édition Nouvelle-Aquitaine. Saint-Maurice : Santé publique France, 8 pages.

Directeur de publication : Etienne POT, directeur général par intérim. Date de publication : 02 octobre 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr