



Bulletin

Vaccination



Date de publication : 8 octobre 2026

ÉDITION RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Vaccination des femmes enceintes, des séniors et des adultes à risque

Données 2025

Sommaire

Infographie	3
Couvertures vaccinales des femmes enceintes	4
Couvertures vaccinales des séniors et des personnes à risque.....	9
Couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en établissements médico-sociaux (ESMS).....	15
Adhésion à la vaccination.....	19
Prévention	19
Information et promotion de la vaccination	20
Sources de données	23

Points clés en région Auvergne-Rhône-Alpes

• **Chez les femmes enceintes**, quatre vaccinations sont recommandées : les vaccinations contre la coqueluche, la grippe, la Covid-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). Ces vaccinations permettent de protéger la femme enceinte ainsi que le nouveau-né dans l'attente de ses premières vaccinations, lorsqu'il est le plus vulnérable aux infections.

Dans la région, près de 3 femmes enceintes sur 4 ayant accouché en 2025 ont été vaccinées contre la coqueluche. Cette couverture vaccinale est en forte hausse depuis 2023 (+ 27 points).

Lors de la campagne d'immunisation contre les infections à VRS en 2025-2026, 55 % des femmes enceintes éligibles ont été vaccinées contre le VRS en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport à la mise en œuvre de cette campagne en 2024-2025 (+ 20 points) Si la mère n'a pas été vaccinée contre le VRS pendant la grossesse, le nourrisson peut être protégé dès la naissance par l'injection d'anticorps monoclonaux.

Les **couvertures vaccinales contre grippe et Covid-19 chez les femmes enceintes sont très insuffisantes** alors que la grossesse est un facteur de risque de forme sévères pour ces maladies.

• **Chez les personnes âgées de 65 ans et plus**, les vaccinations contre les pneumocoques et le zona sont recommandées depuis 2025, en plus des vaccinations contre la grippe saisonnière, la Covid-19 et les rappels contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP). La vaccination contre les infections à VRS est également recommandée à partir de 75 ans, ainsi que pour les personnes entre 65 et 74 ans présentant des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques. Ces vaccinations s'inscrivent dans la stratégie de protection des plus âgés contre les infections respiratoires responsables de nombreuses hospitalisations et complications comme les événements cardiovasculaires, le déclin cognitif et la perte d'autonomie.

Dans la région, **la couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus a augmenté 3,1 points** dans la région et ce pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, avec 56,4 % des personnes vaccinées lors de la saison 2025-2026. Pour autant, elle reste encore très inférieure à l'objectif cible de 75 % fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Auvergne-Rhône-Alpes, **seuls 28 % des personnes âgées de 65 ans et plus à risque élevé de formes sévères étaient correctement vaccinées contre les infections à pneumocoques** en 2025. La couverture vaccinale contre le zona **reste** très faible avec moins de 5 % des personnes de 65 ans et plus qui avaient reçu un schéma complet.

Pour améliorer ces couvertures vaccinales, il est nécessaire de rappeler aux patients et aux soignants que les vaccinations contre les pneumocoques et le zona sont désormais recommandées pour tous à partir de 65 ans, comme celles contre la grippe et la Covid-19, en insistant sur l'impact direct des vaccins contre les maladies ciblées, mais aussi sur leurs bénéfices indirects liés à l'absence d'infection. Le bilan prévention (entre 60 et 65 ans) et la consultation gratuite à 65 ans constituent des opportunités privilégiées pour promouvoir ces vaccinations.

• **Chez les résidents et professionnels exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)**, les vaccinations contre la grippe et la Covid-19 sont recommandées en complément des gestes barrières afin de protéger les personnes les plus fragiles.

Chez les résidents en Ehpad, la couverture vaccinale contre la grippe restait élevée, avec 81 % d'entre eux vaccinés lors de la saison 2025-2026, couverture supérieure au seuil de 75 % recommandé par l'OMS mais en baisse ces cinq dernières années. La couverture vaccinale contre la Covid-19 était en revanche inférieure, estimée à 61 %.

Chez les professionnels exerçant en Ehpad, la couverture vaccinale contre la grippe demeure insuffisante avec seulement 25 % de vaccinés malgré les recommandations et une légère tendance à la hausse lors de la saison 2025-2026.

• **L'adhésion à la vaccination** se maintient à un niveau élevé dans la région, notamment chez les séniors avec **80 % des 65 à 79 ans se déclarant favorables à la vaccination en général**.

Infographie

Vaccination des femmes enceintes, des seniors et des adultes à risque en Auvergne-Rhône-Alpes - Données 2025



POINTS CLÉS



Femmes enceintes

La vaccination : un double bouclier pour la mère et l'enfant

Quatre vaccinations sont recommandées pendant la grossesse : contre la coqueluche et le virus respiratoire syncytial (VRS) responsables de la bronchiolite, la grippe et la Covid-19. Elles contribuent à protéger la femme enceinte et son bébé dès ses premiers jours de vie.

Coqueluche

femmes ayant accouché en 2025 ont été vaccinées pendant leur grossesse

75%

Infections à virus respiratoires syncytial (VRS)

femmes enceintes éligibles pendant la campagne 2025-26 d'immunisation contre le VRS ont été vaccinées

54%

Si la mère n'a pas été vaccinée, le nourrisson peut être protégé dès la naissance par l'injection d'anticorps monoclonaux.



Séniors et personnes à risques

À partir de 65 ans et pour les personnes à risque, la vaccination permet de prévenir les infections et leurs complications.

Les vaccins contre la grippe, la Covid-19, les infections à pneumocoques, le zona et le VRS sont recommandés. Un rappel DTP (diphtérie, tétanos et poliomyélite) est également recommandé tous les 10 ans à partir de 65 ans



En 2024, 80 % des 65-79 ans se déclarent favorables à la vaccination en général

Grippe

personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées

56%

Infections à pneumocoques

personnes 65 ans et plus à risque de formes sévères sont à jour de leur vaccination

28%

Zona

personnes de 65 ans et plus sont à jour de cette vaccination

5%



Résidents et professionnels en établissements médico-sociaux

En établissement médico-social, la vaccination est un levier essentiel de protection.

En complément des gestes barrières, les vaccinations contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels contribuent à limiter la circulation des virus et à protéger les plus fragiles.

Grippe

résidents en Ehpad ont été vaccinés

81%

Covid-19

résidents en Ehpad ont été vaccinés

61%

Grippe

professionnels exerçant en Ehpad ont été vaccinés

25%

Couvertures vaccinales des femmes enceintes

Coqueluche chez les femmes enceintes

Depuis 2022, la vaccination contre la coqueluche est recommandée chez les femmes enceintes à partir du 2^e trimestre de grossesse (20^e à 36^e semaine d'aménorrhée). La vaccination contre la coqueluche doit être effectuée à chaque grossesse afin que le taux d'anticorps maternels soit suffisamment élevé pour permettre un passage transplacentaire optimal vers le fœtus avant sa naissance. Le nouveau-né sera alors protégé dès sa naissance, en attendant de pouvoir recevoir la première dose de sa propre vaccination à 8 semaines.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, chez les femmes ayant accouché en 2025, la couverture vaccinale est estimée à 74,7 %, contre 66,3 % pour celles ayant accouché en 2024 et 47,3 % en 2023, soit un gain de couverture de 27,4 points depuis 2023. On observe une tendance à la hausse progressive de cette couverture entre 2023 et 2025, de façon plus marquée en 2024 (Figure 1). L'augmentation observée durant l'année 2024 pourrait s'expliquer par l'appropriation progressive des recommandations vaccinales par les professionnels de santé et, en partie, par les propositions de vaccination et les communications qui ont été faites dans le contexte de l'épidémie de coqueluche survenue cette année-là.

La couverture vaccinale régionale est légèrement supérieure au niveau national (72,6 % en France hexagonale), et varie selon les départements avec des niveaux supérieurs à 80 % dans l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Savoie, et les niveaux les plus faibles dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme (Tableau 1). Néanmoins, la forte progression de cette couverture vaccinale depuis 2023 a été observée dans tous les départements.


Tableau 1. Couvertures vaccinales (%) contre la coqueluche chez les femmes enceintes ayant accouché en 2023, 2024 et 2025, région Auvergne-Rhône-Alpes, France

Zone géographique	Coqueluche 1 dose pendant la grossesse			
	Accouchement en 2023 (%)	Accouchement en 2024 (%)	Accouchement en 2025 (%)	Différence 2025-2023 (points)
01 - Ain	50,5	68,3	74,8	+ 24,3
03 - Allier	52,3	69,7	80,3	+ 28,0
07 - Ardèche	29,9	56,3	67,4	+ 37,5
15 - Cantal	61,3	71,5	81,9	+ 20,6
26 - Drôme	34,0	56,9	68,0	+ 33,9
38 - Isère	39,2	62,8	74,2	+ 35,0
42 - Loire	41,7	59,4	70,6	+ 28,9
43 - Haute-Loire	38,0	66,2	78,1	+ 40,1
63 - Puy-de-Dôme	62,6	76,4	80,9	+ 18,3
69 - Rhône	53,3	69,4	75,5	+ 22,2
73 - Savoie	53,5	73,5	80,6	+ 27,1
74 - Haute-Savoie	46,0	64,9	73,0	+ 27,0
Auvergne-Rhône-Alpes	47,3	66,3	74,7	+ 27,4
France hexagonale	44,6	63,6	72,6	+ 28,0
France entière*	43,4	62,3	71,3	+ 27,9

*Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire et surestiment très vraisemblablement la couverture vaccinale dans ce territoire.


Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2025

Figure 1. Évolution des couvertures vaccinales (%) contre la coqueluche chez les femmes enceintes par trimestre d'accouchement, par département, région Auvergne-Rhône-Alpes, France, janvier 2023 à décembre 2025



Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2025

Figure 2. Couvertures vaccinales (%) départementales contre la coqueluche chez les femmes enceintes, France, 2025



Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2025

Prévention des infections à VRS chez les nourrissons

Les infections à virus respiratoire syncytial (VRS) constituent chaque année un enjeu important de santé publique, en particulier chez les nourrissons, pour lesquels elles représentent la première cause d'hospitalisation pour infection respiratoire aiguë. La stratégie nationale de prévention repose sur une approche combinée consistant soit à l'immunisation des nourrissons par anticorps monoclonaux (depuis 2023), soit à la vaccination des femmes enceintes (depuis septembre 2024), en complément des gestes barrières. La vaccination de la femme enceinte contre le VRS et l'immunisation par anticorps monoclonal chez le nourrisson s'effectuent en amont du début de la période épidémique et jusqu'à la fin de cette période.

Le choix entre ces deux options est laissé aux parents :

- La vaccination de la femme enceinte entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée (8^e mois de grossesse) pendant la campagne d'immunisation, en vue de protéger l'enfant à naître avec une immunisation passive, par passage transplacentaire d'anticorps synthétisés par la mère. Cette vaccination est réalisée avec le vaccin Abrysvo®.
- L'injection d'anticorps monoclonaux (Beyfortus® ou Enflonsia®) au nouveau-né pendant la campagne d'immunisation, ou au nourrisson né avant la campagne et exposé à la première saison de circulation du VRS. L'immunisation par Beyfortus® est également recommandée chez les nourrissons de moins de 24 mois exposés à leur deuxième saison de circulation du VRS et qui demeurent vulnérables à une infection sévère due au VRS.

En cas de nouvelle grossesse chez une femme préalablement vaccinée contre les infections à VRS au cours d'une grossesse antérieure, il est recommandé de privilégier l'administration d'anticorps monoclonaux chez le nourrisson dès la naissance. Cette année, la campagne en France hexagonale a débuté le 14 septembre 2026 et se terminera le 28 février 2027.

Vaccination contre le VRS chez les femmes enceintes

Depuis septembre 2024, la vaccination contre le VRS chez les femmes enceintes éligibles est possible pendant les campagnes d'immunisation contre les infections à VRS. En France, ces campagnes ont eu lieu respectivement entre septembre 2024 et janvier 2025, et entre septembre 2025 et février 2026.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, chez les femmes enceintes durant la campagne 2025-2026 et éligibles à la vaccination contre les infections à VRS, la couverture vaccinale est estimée à 55,1 %, contre 35,5 % pour celles ayant accouché lors de la saison 2024-2025, soit un gain de couverture de 19,6 points. Cette couverture est légèrement supérieure à celle observée au niveau national (54,1 %). Au niveau départemental, les couvertures sont comprises entre 46 % dans la Drôme et 65,9 % dans le Puy-de-Dôme. D'une manière générale, la couverture vaccinale est plus élevée chez les femmes accouchant en décembre et janvier, période à risque de bronchiolite (données non présentées).

L'interprétation de la couverture vaccinale contre le VRS doit tenir compte de la proposition alternative d'immunisation passive par anticorps monoclonaux de l'enfant à la naissance, qui donne une protection au moins équivalente contre la bronchiolite. Les données disponibles indiquent que la grande majorité des nourrissons nés pendant la période à risque de bronchiolite auraient reçu une immunisation, qu'elle soit active ou passive. Selon une étude menée par EPI-PHARE [1] 72,9% des enfants nés entre septembre et décembre 2024 en France, avaient été immunisés avec le nirsévimab (Beyfortus®) et 27,1% des femmes ayant accouché durant cette même période avaient été vaccinées. Cette dernière estimation est cohérente avec les estimations de Santé publique France (25,9% des femmes ayant accouché entre octobre et décembre 2024 avaient été vaccinées en France). Santé publique France prévoit de publier une estimation de la couverture du nirsévimab chez les nourrissons avant la fin de l'année 2026.


Tableau 2. Couvertures vaccinales (%) contre le VRS chez les femmes enceintes et éligibles à la vaccination pendant les campagnes d'immunisation 2024-2025 et 2025-2026, région Auvergne-Rhône-Alpes, France

Zone géographique	VRS 1 dose pendant la grossesse		
	Campagne 2024-2025 (%)	Campagne 2025-2026 (%)	Différence entre les 2 campagnes (points)
01 - Ain	36,8	56,8	+ 20,0
03 - Allier	35,4	55,2	+ 19,9
07 - Ardèche	27,7	47,1	+ 19,4
15 - Cantal	30,5	59,1	+ 28,6
26 - Drôme	29,2	46,0	+ 16,8
38 - Isère	32,5	56,3	+ 23,8
42 - Loire	30,1	46,5	+ 16,4
43 - Haute-Loire	30,7	54,4	+ 23,8
63 - Puy-de-Dôme	43,1	65,9	+ 22,8
69 - Rhône	40,2	57,7	+ 17,5
73 - Savoie	38,3	60,5	+ 22,2
74 - Haute-Savoie	33,3	51,4	+ 18,2
Auvergne-Rhône-Alpes	35,5	55,1	+ 19,6
France hexagonale	33,8	54,1	+ 20,3
France entière*	32,9	53,0	+ 20,1

*Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire et surestiment très vraisemblablement la couverture vaccinale.

Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/03/2026

Figure 3. Couvertures vaccinales (%) départementales contre le VRS chez les femmes enceintes, campagne d'immunisation 2025-2026, France



Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/03/2026

Vaccination grippe et Covid-19 chez les femmes enceintes

La vaccination contre la grippe est recommandée quel que soit le trimestre de grossesse, tandis que celle contre la Covid-19 est préconisée dès le premier trimestre.

Pour la saison 2024-2025 en France, la couverture vaccinale contre la grippe chez les femmes enceintes était estimée à 21,8 %. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette couverture s'élevait à 22,6 %. Ces estimations réalisées à partir des données de remboursements de l'Assurance Maladie présentent des limites, car les vaccins non remboursés (délivrés en hôpital, maternité ou dans le cadre professionnel) ne sont pas enregistrés dans les bases de données de l'Assurance Maladie, ce qui entraîne une sous-estimation de ces couvertures vaccinales. Par exemple, en France, la couverture vaccinale contre la grippe des femmes ayant accouché en mars 2021 était de 15,4 % à partir des données de l'Assurance Maladie, contre 30,4 % dans l'Enquête Nationale Périnatale pour la même population [2].

Pour la Covid-19, la couverture vaccinale chez les femmes enceintes était estimée à 6,2 % en France durant la saison 2024-2025. Cette couverture vaccinale est probablement aussi sous-estimée car les personnes vaccinées contre la Covid-19 sont identifiées via les actes de vaccination. Or, ces actes ne sont pas toujours enregistrés dans la base des remboursements, notamment lorsque les vaccinations sont réalisées dans des établissements sanitaires ou par certains professionnels vaccinateurs, ce qui entraîne une sous-estimation. Il n'est cependant pas possible d'évaluer l'ampleur de la sous-estimation, ainsi les données régionales ne sont donc pas communiquées. Ces estimations étant inférieures aux couvertures vaccinales réelles, elles ne seront pas publiées sur Odissé.

En comparant ces couvertures vaccinales avec celles contre la coqueluche ou le VRS chez les femmes enceintes qui atteignent des niveaux élevés et en hausse, les hypothèses de problèmes d'accessibilité ou de refus global de la vaccination en cours de grossesse peuvent être écartés. Par ailleurs, malgré le risque de sous-estimation, ces couvertures vaccinales suggèrent que la vaccination antigrippale nécessite toujours davantage de promotion auprès des femmes enceintes, et que la recommandation vaccinale contre la Covid-19 au cours de la grossesse n'est pas partout comprise et acceptée par les professionnels et la population ciblée. Il conviendrait de poursuivre et de renforcer la promotion de ces vaccinations auprès des femmes enceintes et des professionnels de santé qui les accompagnent. Des études épidémiologiques en cours ou prévues permettront d'estimer avec plus de fiabilité les couvertures chez les femmes enceintes, d'évaluer l'ampleur de la sous-estimation actuelle des estimations issues des données de l'Assurance Maladie, et d'investiguer les attitudes liées à la sous-vaccination.

Couvertures vaccinales des séniors et des personnes à risque

Grippe

La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chaque année aux personnes à risque de grippe sévère : les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de plus de 6 mois et atteintes de comorbidités ayant un risque élevé de forme grave de la maladie, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les résidents en établissement de soins de suite ou en établissement médico-social quel que soit leur âge, ainsi que les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l'infection, y compris les professionnels de santé.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, parmi l'ensemble des personnes ciblées par la vaccination contre la grippe, la couverture vaccinale est estimée à 50,0 % lors de la saison 2025-2026, comparable au niveau national (49,6 %). Ceci correspond à près d'1,2 million de personnes à risque vaccinées dans la région durant la dernière saison hivernale, dont 1 million étaient des personnes de 65 ans et plus. La couverture vaccinale contre la grippe reste cependant insuffisante dans la région comme en France, avec un niveau inférieur à l'objectif de 75 % pour les personnes à risque de forme sévère.

Chez les personnes de 65 ans et plus, pour la saison 2025-2026, la couverture vaccinale contre la grippe est estimée à 56,4 % en Auvergne-Rhône-Alpes. Après une diminution progressive de cette couverture depuis la pandémie de Covid-19, une nouvelle hausse est observée la saison dernière, avec une augmentation de 3,1 points dans la région par rapport à la saison 2024-2025. Parmi les personnes de 65 ans et plus vaccinées, 27,8 % l'ont été avec un vaccin préférentiellement recommandé pour les personnes de 65 ans et plus (Efluelda® ou Fluad®), et 72,2 % avec un vaccin à dose standard.

La couverture vaccinale contre la grippe reste plus élevée dans la région en 2025-2026 chez les personnes de 75 ans et plus (62,9 %) que chez les 65-74 ans (49,3 %). Néanmoins, la couverture vaccinale a d'avantage progressé durant la saison dernière par rapport à la saison 2023-2024 chez les 65-74 ans (+ 3,9 points) que chez les 75 ans et plus (+ 1,5 point).

Chez les personnes à risque âgées de moins de 65 ans, la couverture vaccinale contre la grippe pour la saison 2025-2026 est estimée à 29,6 % en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est également en hausse pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, avec néanmoins un niveau toujours inférieur à celui des estimations des saisons avant la pandémie et à l'objectif de couverture vaccinale.

Au sein des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes âgées de 65 ans et plus variait en 2025-2026 de 59,8 % dans le Puy-de-Dôme et 59,3 % dans le Rhône, à 50,7 % en Haute-Loire. Les départements de la Drôme, l'Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie présentaient les meilleures progressions de couverture vaccinale (plus de 3 points par rapport à 2023-2024), tandis qu'elle évoluait peu dans les départements de l'Allier et du Cantal.


Tableau 3. Couvertures vaccinales (%) contre la grippe chez les personnes à risque de moins de 65 ans et chez les personnes âgées de 65 ans et plus, saisons 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, région Auvergne-Rhône-Alpes, France

Zone géographique	Grippe, couverture vaccinale (%)							
	Moins de 65 ans à risque*				65 ans et plus			
	2023-24 (%)	2024-25 (%)	2025-2026 (%)	Différence 2023-2024 2025-2026 (points)	2023-24 (%)	2024-25 (%)	2025-2026 (%)	Différence 2023-2024 2025-2026 (points)
01 - Ain	24,8	24,7	28,5	+ 3,7	51,8	51,2	54,4	+ 2,6
03 - Allier	27,2	26,4	29,5	+ 2,3	54,0	53,3	55,4	+ 1,4
07 - Ardèche	23,6	23,4	26,8	+ 3,2	49,3	48,6	52,1	+ 2,8
15 - Cantal	31,1	29,8	34,1	+ 3,0	57,5	56,5	58,7	+ 1,3
26 - Drôme	24,1	24,1	28,0	+ 3,9	51,2	50,9	54,3	+ 3,1
38 - Isère	27,6	27,6	31,9	+ 4,3	55,2	55,1	58,6	+ 3,4
42 - Loire	25,1	25,1	28,4	+ 3,3	52,3	51,9	55,6	+ 3,3
43 - Haute-Loire	24,7	23,7	27,1	+ 2,4	47,8	47,2	50,7	+ 2,9
63 - Puy-de-Dôme	29,1	28,9	32,7	+ 3,6	56,7	56,7	59,8	+ 3,2
69 - Rhône	25,9	26,2	30,0	+ 4,1	56,0	56,2	59,3	+ 3,2
73 - Savoie	25,3	25,7	29,1	+ 3,8	52,2	51,8	55,6	+ 3,4
74 - Haute-Savoie	22,3	22,2	26,1	+ 3,8	48,6	48,2	52,1	+ 3,5
Auvergne-Rhône-Alpes	25,8	25,8	29,6	+ 3,8	53,3	53,1	56,4	+ 3,1
France hexagonale	25,7	25,6	29,2	+ 3,5	54,5	54,2	57,3	+ 2,8
France entière**	25,4	25,3	28,9	+ 3,5	54,0	53,7	56,7	+ 2,7

* Ces estimations n'incluent pas les personnes avec obésité morbide ni les femmes enceintes qui ne reçoivent pas de bon de prise en charge. ** Les données issues du SNDS pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire. À la Réunion la période de la campagne de vaccination contre la grippe est différente de celle des autres départements, la couverture vaccinale est donc calculée à un autre moment et n'est pas présentée ici.


Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 28/02/2026

Figure 4. Couvertures vaccinales (%) départementales contre la grippe chez les 65 ans et plus, France, saison 2025-2026



Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 28/02/2026

Figure 5. Couvertures vaccinales (%) contre la grippe chez les personnes à risque âgées de moins de 65 ans et chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et chez les 65-74 ans et 75 ans et plus, région Auvergne-Rhône-Alpes, saisons 2016-2017 à 2025-2026



Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 28/02/2026

Covid-19

La vaccination contre la Covid-19 cible toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de plus de 6 mois, atteintes de comorbidités ayant un risque élevé de forme grave de la maladie, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les résidents en Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (unité de soins de longue durée), ainsi que les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l'infection, y compris les professionnels de santé. Le vaccin disponible est le vaccin Comirnaty®, vaccin à ARN messager. Ces personnes sont éligibles à une nouvelle vaccination à partir de 6 mois après leur dernière infection ou injection de vaccin contre la Covid-19. Ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans ou plus. Lors de la dernière campagne de vaccination, le vaccin disponible était adapté au variant LP.8.1.

En France, au 28 février 2026, la couverture vaccinale contre la Covid-19 chez l'ensemble des personnes ciblées par la vaccination durant la saison hivernale 2025-2026 était de 14,2 %. Elle était de 16,8 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et de 6,5 % chez celles âgées de moins de 65 ans à risque de Covid-19 sévère. Ces couvertures vaccinales étaient inférieures à celles estimées pour la saison 2024-2025 (de - 4,1 points chez l'ensemble des personnes à risque, de - 4,9 points chez les 65 ans et plus et de - 1,7 point chez les moins de 65 ans à risque).

Ces estimations réalisées à partir des données de l'Assurance Maladie sont probablement sous-estimées car les personnes vaccinées contre la Covid-19 sont identifiées via les actes de vaccination. Or, ces actes ne sont pas toujours enregistrés dans la base des remboursements de l'Assurance Maladie, notamment lorsque les vaccinations sont réalisées dans des établissements sanitaires ou médico-sociaux, ou par certains professionnels vaccinateurs. Il n'est cependant pas possible d'évaluer l'ampleur de la sous-estimation. Du fait de ces incertitudes, les données régionales et départementales ne sont pas communiquées.

Pneumocoque

Depuis avril 2025, la vaccination contre les infections à pneumocoques est élargie à l'ensemble des adultes à partir de 65 ans en plus. Le schéma vaccinal est désormais d'une seule dose réalisée avec un vaccin polysidique conjugué à 20 valences (VPC20, Prevenar 20®) ou 21 valences (VPC21, Capvaxive®). Dans cette population, le vaccin est remboursé depuis octobre 2025. Par ailleurs, la Haute autorité de santé recommande depuis juillet 2026 d'utiliser le vaccin polysidique conjugué 21 valent dans cette population [3].

Cette vaccination était auparavant recommandée pour les personnes à risque élevé d'infection sévère à pneumocoque, quel que soit l'âge. Il s'agit des personnes immunodéprimées ou atteintes de syndrome néphrotique et des personnes porteuses d'une maladie prédisposant à la survenue d'infections invasives à pneumocoque : maladie du cœur, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique, bronchopneumopathie obstructive, emphysème, asthme sévère, mucoviscidose, insuffisance rénale, maladie chronique du foie, diabète, brèche ostéoméningée, implant cochléaire ou candidats à une implantation cochléaire, drépanocytose.

Les couvertures vaccinales présentées ont été estimées chez les personnes âgées de 65 ans et plus et à risque élevé d'infections sévères à pneumocoque au 31 décembre 2025. Conformément aux recommandations, ont été considérées comme vaccinées, les personnes ayant reçu au moins 1 dose de VPC20 ou de VPC21 ou pour celles vaccinées antérieurement par au moins 1 dose de VPC13 (Prevenar 13®) depuis moins d'un an ou un VPC13 suivi d'un VPP23 (Pneumovax®) dans les 10 dernières années.

Tableau 4. Couvertures vaccinales (%) contre les pneumocoques au moins une dose chez les personnes de 65 ans et plus à risque, région Auvergne-Rhône-Alpes, données au 31 décembre 2025

Zone géographique	Pneumocoques, couverture vaccinale (%)	
	Au moins une dose ** 2023	Vaccinés*** 2025
01 - Ain	18,1	26,0
03 - Allier	21,0	24,3
07 - Ardèche	15,7	22,3
15 - Cantal	18,4	25,0
26 - Drôme	15,8	23,5
38 - Isère	20,9	31,0
42 - Loire	18,0	27,5
43 - Haute-Loire	16,4	22,3
63 - Puy-de-Dôme	24,8	33,1
69 - Rhône	19,5	28,4
73 - Savoie	15,4	28,9
74 - Haute-Savoie	18,2	28,4
Auvergne-Rhône-Alpes	18,1	27,8
France hexagonale	19,1	26,6
France entière*	18,9	26,2

*Les données issues du SNDS-DCIR pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire.


** au moins 1 dose de VPC13 ; *** au moins 1 dose de VPC20 ou de VPC21, au moins 1 dose de VPC13 depuis moins d'un an ou un VPC13 suivi d'un VPP23 dans les 10 dernières années.

Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2025

En Auvergne-Rhône-Alpes, la couverture vaccinale contre les infections à pneumocoques chez les personnes âgées de 65 ans et plus et à risque élevé d'infections sévères à pneumocoques a été estimée à 27,8 % en 2025. Pour rappel la couverture vaccinale contre les infections à pneumocoques selon les recommandations antérieures avait été estimée à 19,1 % au 31 décembre 2023 dans la région. Au sein des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette couverture vaccinale au 31 décembre 2025 variait de 33,1 % dans le Puy-de-Dôme à 22,3 % en Ardèche et Haute-Loire.

Les vaccins n'étant remboursés à l'ensemble des personnes âgées de plus de 65 ans que depuis octobre 2025, la couverture vaccinale dans cette population sera estimée au 31 décembre 2026 et publiée en 2027.

Figure 6. Couvertures vaccinales (%) départementales contre le pneumocoque chez les 65 ans et plus à risque de formes sévères, France



Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2025

Zona

La vaccination contre le zona est recommandée chez les adultes de 65 ans et plus, ainsi que chez les adultes de 18 ans et plus immunodéprimés. Depuis le 14 décembre 2024, le vaccin est pris en charge par l'Assurance maladie pour ces populations. Le schéma vaccinal comporte deux doses administrées à deux mois d'intervalle. En 2025, dans la région comme au niveau national, la couverture vaccinale contre le zona reste très faible avec seulement 7,8 % des personnes de 65 ans et plus qui auraient reçu au moins une dose dans la région, valeur inférieure au niveau national. La couverture vaccinale au moins une dose contre le zona chez les personnes de 65 ans et plus varie de 10,4 % en Savoie à 4,8 % en Ardèche. La couverture vaccinale à 2 doses est estimée à 4,6 % dans la région.

Tableau 5. Couvertures vaccinales (%) contre le zona chez les personnes de 65 ans et plus, en 2025, au moins 1 dose et deux doses, région Auvergne-Rhône-Alpes

Zone géographique	Zona, couverture vaccinale (%)	
	Au moins 1 dose	2 doses
01 - Ain	6,9	4,1
03 - Allier	6,0	3,7
07 - Ardèche	4,8	2,8
15 - Cantal	4,9	2,8
26 - Drôme	6,1	3,6
38 - Isère	7,9	4,7
42 - Loire	8,0	4,5
43 - Haute-Loire	5,2	3,0
63 - Puy-de-Dôme	9,6	5,6
69 - Rhône	8,8	5,2
73 - Savoie	10,4	6,7
74 - Haute-Savoie	8,3	4,8
Auvergne-Rhône-Alpes	7,8	4,6
France hexagonale	9,0	5,3
France entière*	8,9	5,2

*Les données issues du SNDS-DCIR pour la Guyane ne couvrent pas l'ensemble du territoire.

Source : données SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2025

Diphtérie-tétanos-poliomyélite

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, un rappel de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (DTP) et la coqueluche est recommandé tous les dix ans avec un vaccin combiné DTP et coqueluche contenant des doses réduites d'anatoxines diphtériques (dTPolio). Suite à l'arrêt de commercialisation depuis le 1^{er} juillet 2024 du vaccin trivalent Revaxis® (dTPolio), les vaccins tétravalents contenant les antigènes coquelucheux (dTCaPolio) doivent être utilisés en remplacement.

Les rappels à 65 ans, 75 ans et 85 ans restent insuffisamment réalisés et la couverture vaccinale du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) diminue avec l'âge.

En 2024, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 54,4 % des personnes âgées de 65 ans étaient à jour de leur vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. A 75 ans et 85 ans, seulement 49,8 % et 37,3 % respectivement avaient reçu leur rappel de vaccin DTP.

Les couvertures vaccinales contre le DTP par département en âge en 2024 sont décrites dans un précédent Bulletin vaccination : <https://www.santepubliquefrance.fr/regions-et-territoires/auvergne-rhone-alpes/bulletin-regional/vaccination-en-auvergne-rhone-alpes-bilan-de-la-couverture-vaccinale-en-2024>

Couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en établissements médico-sociaux (ESMS)

La vaccination annuelle contre la grippe est recommandée aux personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge. De même, la vaccination contre la Covid-19 est aussi recommandée aux résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et unités de soins de longue durée (USLD). Au printemps, une dose supplémentaire de vaccin contre la Covid-19 est recommandée aux personnes âgées de 80 ans et plus, aux résidents d'Ehpad et d'USLD, et aux personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

La vaccination contre la grippe est recommandée aux professionnels de santé et à tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère. Elle permet en effet notamment de prévenir le risque que le personnel soignant (médecins, infirmiers, puéricultrices, aides-soignants...) ne transmette la grippe aux patients les plus fragiles. Dans le cadre de son évaluation de la pertinence d'instaurer une obligation vaccinale antigrippale annuelle aux 65 ans et plus résidant en collectivité et aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, la Haute autorité de santé recommande à présent la mise en place d'une obligation vaccinale des professionnels de santé et des professionnels des établissements médico-sociaux hébergeant des personnes à risque de forme sévères de grippe [4].

La vaccination contre la Covid-19 est fortement recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.

Les estimations de couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 chez les résidents et les professionnels exerçant en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) incluant les Ehpad sont issues d'une enquête annuelle ad-hoc réalisée en mars auprès de ces établissements par Santé publique France. La participation à l'enquête est volontaire. Les estimations régionales sont disponibles depuis la saison 2021-22, excepté en 2022-23 pour la Covid-19 [5].

Pour la saison 2025-2026, 364 ESMS ont participé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dont 289 Ehpad soit un taux de participation des Ehpad de 31,5 %. Ce taux de participation est légèrement inférieur à celui observé au niveau national (36,8 %).

Grippe et Covid-19 chez les résidents en Ehpad

Lors de la saison 2025-2026, la couverture vaccinale contre la grippe des résidents en Ehpad en région Auvergne-Rhône-Alpes était de 81,3 % (intervalle de confiance à 95% [IC95%] : 79,8-82,9 %), à un niveau un peu inférieur de la France hexagonale (83,0 %, IC95% : 82,6-83,5 %). Une tendance à la baisse de cette couverture est observée dans la région sur ces 5 dernières années (- 4,4 points par rapport à 2021-2022), même si le niveau est encore élevé.


La couverture vaccinale contre la Covid-19 chez les résidents en Ehpad lors de la saison 2025-2026, elle a été estimée à 61,0 % en Auvergne-Rhône-Alpes, soit à un niveau légèrement inférieur au niveau national (62,6 % en France hexagonale, IC95% 61,5-63,6 %). Cette couverture est également en baisse dans la région, de - 0,1 point par rapport à 2024-2025 et surtout de - 8,6 points par rapport à 2023-2024. Aussi, la couverture vaccinale contre la Covid-19 chez les résidents en Ehpad est insuffisante dans la région comme en France.

Tableau 6. Couvertures vaccinales (%) contre la grippe et la Covid-19 chez les résidents en Ehpad, saison 2025-2026, région, France

Zone géographique	Grippe	Covid-19
Auvergne-Rhône-Alpes	81,3	61,0
Bourgogne-Franche-Comté	81,9	59,1
Bretagne	86,5	70,4
Centre-Val de Loire	83,3	66,8
Corse*	-	-
Grand Est	80,7	60,4
Hauts-de-France	85,5	66,5
Ile-de-France	84,9	65,0
Normandie	83,7	64,0
Nouvelle-Aquitaine	82,8	61,0
Occitanie	82,2	60,3
Pays de la Loire	82,7	66,2
Provence-Alpes-Côte d'Azur	81,2	55,3
La Réunion	62,6	36,3
France hexagonale	83,0	62,8
France entière*	82,9	62,6

* Les données pour la Corse, les Antilles et la Guyane ne sont pas mentionnées en raison de la faible participation des ESMS à l'enquête.
Source : enquête de couverture vaccinale contre la grippe et la covid-19 en ESMS, traitement Santé publique France, 2025-2026

Figure 7. Évolution des couvertures vaccinales (%) estimées contre la grippe chez les résidents en Ehpad, saison 2021-2022 à 2025-2026, région Auvergne-Rhône-Alpes et France



Source : enquête de couverture vaccinale contre la grippe et la covid-19 en ESMS, traitement Santé publique France, 2025-2026

Grippe et Covid-19 chez les professionnels des Ehpad

Pendant la saison 2025-2026, la couverture vaccinale contre la grippe des professionnels exerçant dans les Ehpad était très faible dans la région comme en France avec une couverture estimée en Auvergne-Rhône-Alpes à 25,2 % (IC95% : 23,1-27,4 %), contre 25,1 % (IC95% : 24,5-25,8 %) au niveau national. Cette couverture est en hausse en 2025-2026 par rapport à 2024-2025 (+ 5,7 points), sans toutefois rattraper le niveau de couverture vaccinale des professionnels en période pré-Covid-19 et reste très insuffisante.

En France, les analyses par catégories de professionnels retrouvent des couvertures vaccinales contre la grippe plus élevées chez les médecins ou pharmaciens (61,7%) comparativement aux autres professionnels de santé (ex. 22,5 % des aides-soignants étaient vaccinés). La hausse des couvertures vaccinales en 2025-2026 est observée pour toutes les catégories de professionnels des Ehpad [6].


Tableau 7. Couvertures vaccinales (%) estimées contre la grippe et la Covid-19 chez les professionnels exerçant en Ehpad, saison 2025-2026, région, France

Zone géographique	Grippe	Covid-19
Auvergne-Rhône-Alpes	25,2	4,9
Bourgogne-Franche-Comté	25,6	4,2
Bretagne	29,3	4,5
Centre-Val de Loire	25,2	3,2
Corse*	-	-
Grand Est	20,1	3,4
Hauts-de-France	25,1	3,6
Ile-de-France	26,5	3,8
Normandie	25,1	4,0
Nouvelle-Aquitaine	26,7	4,9
Occitanie	24,3	4,2
Pays de la Loire	26,2	5,4
Provence-Alpes-Côte d'Azur	24,2	3,6
La Réunion	3,8	-
France hexagonale	25,2	4,2
France entière*	25,1	4,2

* Les données pour la Corse, les Antilles et la Guyane ne sont pas mentionnées en raison de la faible participation des ESMS à l'enquête.
Source : enquête de couverture vaccinale contre la grippe et la covid-19 en ESMS, traitement Santé publique France, 2025-2026

Concernant les actions de promotion de la vaccination contre la grippe auprès des professionnels, les actions les plus fréquemment proposées par les Ehpad étaient l'organisation de la vaccination pour les professionnels au sein des services (93,6 %) et la pose d'affiches (85,7%). La campagne de vaccination contre la grippe des professionnels était soutenue par l'équipe de direction dans à peine plus de la moitié des Ehpad (53,6 %, données régionales non disponibles en raison de trop faibles effectifs). Les actions pour promouvoir la vaccination des professionnels de santé tendent globalement à être mises en place avec la même fréquence que la saison précédente ou avec une fréquence légèrement plus élevée. Il avait cependant été observé de fortes baisses des nombres d'actions conduites dans les ESMS sur le plus long terme [6].

Figure 8. Évolution des couvertures vaccinales (%) contre la grippe chez les professionnels exerçant en Ehpad, saison 2018-2019 à 2025-2026, région Auvergne-Rhône-Alpes et France



Source : enquête de couverture vaccinale contre la grippe et la covid-19 en ESMS, traitement Santé publique France, 2025-2026

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme en France, la couverture vaccinale contre la Covid-19 chez les professionnels exerçant en Ehpad lors de la saison 2025-2026 était très faible avec moins de 5 % des professionnels vaccinés. Il convient de noter que seuls 65 % des Ehpad participant ont renseigné des données de vaccination contre la Covid-19 chez les professionnels (contre 93% pour la vaccination grippe) et seuls 24% ont déclaré connaître complètement ou partiellement l'ensemble des vaccinations contre la Covid-19 réalisées chez les professionnels (contre 56% pour la vaccination grippe). Ceci peut impacter la qualité des données.

Couverture vaccinale contre la grippe des professionnels des établissements hospitaliers

L'indicateur de couverture vaccinale contre la grippe du personnel hospitalier est recueilli dans le cadre de la campagne nationale de mesure des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) portée par la Haute autorité de santé (HAS).

Lors de la campagne de vaccination 2024-2025, la couverture vaccinale médiane contre la grippe du personnel hospitalier a été estimée à 20 % en France et 22 % en Auvergne-Rhône-Alpes [7].

Les prochaines estimations pour la saison 2025-2026 seront disponibles sur ce [lien](#).

Adhésion à la vaccination

D'après les données du dernier Baromètre de Santé publique France, en région Auvergne-Rhône-Alpes, 79,7 % des adultes âgés de 18 à 79 ans se déclaraient très ou plutôt favorables à la vaccination dans la région en 2024. Cette adhésion était globalement stable par rapport au niveau estimé en 2021.


L'adhésion à la vaccination était élevée quel que soit l'âge : 78,0 % chez les 30-44 ans, 78,3 % chez les 45-64 ans et 79,7 % chez les 65-79 ans.

Les vaccinations contre la Covid-19 et - dans une moindre mesure - celle contre la grippe rassemblent le plus de réticences chez les adultes de 18-79 ans avec respectivement 25,6 % et 6,2 % qui indiquent être défavorables à ces vaccinations. Chez les personnes âgées de 65 à 79 ans, ces réticences étaient respectivement de 24,4 % et 8,0 %. La réticence à la vaccination contre la grippe était ainsi supérieure chez les séniors par rapport aux 18-64 ans (5,8 %) alors qu'ils sont ciblés par les recommandations.

L'ensemble des résultats de l'édition 2024 du Baromètre de Santé publique France en région Auvergne-Rhône-Alpes est disponible sur ce [lien](#) [8].



Points clés 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes



Prévention

Santé publique France est étroitement associée à la politique vaccinale pilotée par le ministère chargé de la Santé.

Outre le suivi de la couverture vaccinale, la surveillance épidémiologique des maladies à prévention vaccinale et la gestion des stocks stratégiques de vaccins, Santé publique France est responsable de plusieurs missions dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé :

- **Production de connaissances sur l'adhésion du public et des professionnels de santé** à la vaccination qui permettent d'orienter les actions développées visant à promouvoir la vaccination auprès de ces publics ;
- **Information sur la vaccination et sa promotion** afin de restaurer et maintenir la confiance dans la vaccination ;
- **Identification et promotion d'intervention prometteuses ou efficaces** permettant d'améliorer les couvertures vaccinales pour être au plus près des objectifs fixés par l'OMS et valorisation sur [ReperPrev](#), le registre national le registre des interventions en prévention et promotion de la santé, à destination des acteurs de la santé publique. Cette plateforme de référence recense des programmes de prévention efficaces, prometteurs ou innovants en France évalués scientifiquement.

Information et promotion de la vaccination

Dans l'objectif d'informer et promouvoir la vaccination auprès du public et des professionnels de santé, Santé publique France met à disposition de nombreux outils.

- ✓ **Le site de référence : vaccination-info-service.fr (VIS)**
- ✓ Avec plus de 40 millions de visites depuis sa mise en ligne en 2017, vaccination-info-service.fr est le site de référence sur la vaccination pour le grand public et les professionnels de santé. Régulièrement mis à jour et enrichi en contenus textuels et vidéos, le site comprend un espace à destination du grand public et un autre à destination des professionnels de santé, permettant ainsi à tous d'accéder à des informations fiables et précises sur la vaccination. **Le site consacre également des pages spécifiques aux recommandations vaccinales pour les adultes, femmes enceintes ou en projet de grossesse, ainsi que pour les séniors.**



Chaque année, les deux versions de site (professionnel ou grand public) intègrent les nouvelles recommandations publiées dans le calendrier vaccinal. Les informations principales publiées sur la version « professionnel » sont également mises en avant dans l'encart « Actualités » visible en page d'accueil, permettant ainsi un accès direct aux nouveautés publiées.

Pour accompagner la promotion des nouvelles recommandations vaccinales, des outils didactiques sont créés chaque année, notamment sous forme de vidéos expliquant la recommandation et à qui elle se destine précisément.

Pour promouvoir les sites VIS, Santé publique France met à disposition un dépliant d'information, une affiche et deux marque-pages pour la promotion des deux espaces du site, disponibles sur le site de Santé publique France.



- ✓ **Les outils pour les professionnels**

La collection « Repères pour votre pratique » : ces dépliant synthétiques à destination des professionnels de santé font le point sur des recommandations vaccinales spécifiques pour différentes pathologies et à plusieurs stades de la vie (rougeole, femmes enceintes, séniors...).

Ces outils sont à retrouver sur le site de [Santé publique France](https://santepubliquefrance.fr), certains sont disponibles à la commande.



Les outils pour le grand public

Santé publique France possède un large éventail d'outils pour informer le grand public :

- **Les dépliants d'information « 5 bonnes raisons de se faire vacciner »** répondent aux questions essentielles que peut se poser le grand public sur plusieurs des vaccinations destinées aux adultes (hépatite B, coqueluche femmes enceintes...).




Une nouvelle vidéo a été publiée sur le site Vaccination-Info service : elle rappelle le schéma vaccinal de la rougeole et son importance notamment chez les adolescents et les jeunes adultes.

La carte postale et l’affiche du calendrier vaccinal, mis à jour tous les ans, permettent à chacun d’identifier les vaccinations indiquées ainsi que le schéma vaccinal préconisé selon son âge et/ou sa situation.

La carte postale est traduite en cinq langues chaque année (arabe, anglais, mandarin, turc et espagnol), disponibles en téléchargement sur le site de Santé publique France.



Pour accompagner les recommandations vaccinales concernant les populations les plus à risque, deux documents ont également été développés concernant la vaccination des **séniors** et la vaccination des **femmes enceintes**.



NB : Les recommandations vaccinales n'ayant pas évolué en 2026 pour les séniors et les femmes enceintes, les versions 2025 sont toujours d'actualité pour ces deux documents.



→ **La brochure « Comprendre la vaccination »** répond simplement aux principales questions sur la vaccination et fait le point sur les maladies à prévention vaccinale.

→ **Des affiches** permettent de communiquer sur divers sujets liés à la vaccination (vaccination en général, rougeole, etc.).

→ **Des vidéos pédagogiques et des vidéos d'experts** sont également disponibles sur le site vaccination-info-service.fr pour informer le grand public.




Retrouvez tous nos documents à la commande et en téléchargement sur le site internet de Santé publique France : [La vaccination – Santé publique France \(santepubliquefrance.fr\)](http://La vaccination – Santé publique France (santepubliquefrance.fr))

✓ Les outils pour les populations plus vulnérables

Dans un souci de prise en compte des inégalités sociales de santé, Santé publique France produit des documents plus simples et pédagogiques pour rendre les informations sur la vaccination accessibles à tous.

De nombreux outils de cette collection « accessible » sont produits en fonction des actualités. Les outils plus pérennes sur la vaccination, disponibles en téléchargement et à la commande sur le site de Santé publique France, sont :

- **Le dépliant et l'affiche « Les vaccins à tous les âges »** qui présentent le schéma vaccinal actualisé sous forme d'une frise chronologique.
- **La brochure « Pour comprendre la vaccination »** qui permet de donner de nombreuses informations pour bien comprendre la vaccination à travers des textes courts et simples et des illustrations.



Tous les outils accessibles (documents et vidéos) de Santé publique France sont disponibles sur l'espace accessible du site : <https://www.santepubliquefrance.fr/linfo-accessible-a-tous>

Sources de données

Les données relatives à l'adhésion à la vaccination chez les 18-79 ans sont issues du Baromètre Santé de Santé publique France, édition 2024 [7].

Les couvertures vaccinales, des femmes enceintes, des séniors et des personnes à risque sont estimées à partir du Datamart de consommation inter-régimes (DCIR) du Système national des données de santé (SNDS). Cette base de données, gérée par la CNAM, intègre les remboursements d'actes de soins, y compris les délivrances de vaccins de la quasi-totalité des régimes d'Assurance maladie. En raison de la forte proportion de personnes non affiliées à un régime d'assurance maladie à Mayotte, le DCIR ne permet pas d'obtenir des estimations de couverture vaccinale fiables pour toutes les valences dans ce département. La méthode utilisée pour estimer chacune des couvertures vaccinales est détaillée ici : [lien vers la note méthodologique](#).

La limite majeure des données SNDS-DCIR réside dans le fait qu'elles n'intègrent pas les vaccinations non remboursées. Cela inclut notamment les vaccins administrés dans le cadre de la médecine du travail, certains vaccins administrés dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI), ou en milieu hospitalier - dans les établissements avec pharmacie à usage intérieur (PUI) ou lors de campagnes de vaccination. Ceci peut ainsi conduire à la sous-estimation des estimations de couvertures vaccinales issues des données de remboursement, mais avec un impact variable en fonction des valences vaccinales et des populations.

Cet impact est particulièrement fort pour la vaccination contre la grippe des femmes enceintes qui sont suivies par des consultations fréquentes en maternité.

Pour ce qui concerne la vaccination contre le VRS chez la femme enceinte, il est en revanche attendu que les couvertures vaccinales issues des données du SNDS-DCIR soient probablement peu sous-estimées. Ce vaccin étant coûteux, il pourrait être moins souvent fourni gratuitement à l'hôpital ou en maternité. Il n'est, de plus, pas proposé dans un cadre professionnel.

Concernant la vaccination contre la grippe des personnes âgées de 65 ans, les couvertures vaccinales nationales estimées grâce aux données du SNDS-DCIR pour la saison 2020-2021 (60,4%) ont pu être confrontées aux estimations issues du Baromètre de Santé publique France 2021 [9]. Dans cette dernière étude, 65,1% [63,6-66,6] des personnes âgées de 65 à 85 ans ont déclaré avoir été vaccinées contre la grippe lors de la saison 2020-2021. La différence entre les deux estimations pourrait s'expliquer du fait de vaccinations non remboursées (ex : vaccinations réalisées gratuitement dans le cadre professionnel, en milieu hospitalier ou médico-social, ou absence de demande de remboursement), mais pourraient s'expliquer également par un périmètre d'analyse différent (personnes âgées de 65 à 85 ans vs 65 ans et plus). De plus, des biais de mémoire (ex : déclaration à tort d'une vaccination contre la grippe qui n'aurait pas réellement été réalisée) ou des biais de désirabilité (réponse donnée pour satisfaire l'enquêteur) ne peuvent être exclus dans le Baromètre de Santé publique France.

Pour la vaccination contre la Covid-19, les personnes vaccinées sont identifiées via les actes de vaccination. Ces actes ne sont, cependant, pas toujours enregistrés dans la base des remboursements, notamment lorsque les vaccinations sont réalisées dans les établissements sanitaires ou par certains professionnels vaccinateurs. Il est ainsi attendu que les couvertures vaccinales estimées grâce aux données du SNDS soient inférieures aux couvertures vaccinales réelles.

Ces différents exemples montrent que des enquêtes complémentaires restent indispensables pour valider et compléter les estimations issues des données du SNDS-DCIR. Les enquêtes du Baromètre de Santé publique France 2026 et de l'Enquête nationale périnatale 2027 devraient permettre de confronter les estimations de couvertures vaccinales pour plusieurs valences vaccinales et dans diverses populations dans les années à venir.

Bibliographie

- [1] Jabagi M, Bertrand M, Gabet A, Kolla E, Olié V, Zureik M. Nirsevimab vs RSVpreF Vaccine for Respiratory Syncytial Virus–Related Hospitalization in Newborns. JAMA. 2026;335(9):787–798. doi:10.1001/jama.2025.24082
- [2] Enquête Nationale périnatale 2021. Rapport 2021. Les naissances, le suivi à deux mois et les établissements. <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/enquetes-etudes/enquete-nationale-perinatale-rapport-2021-les-naissances-le-suivi-a-deux-mois-et-les-etablissements>
- [3] Haute Autorité de Santé - Pneumocoques : une stratégie vaccinale actualisée pour mieux protéger les populations à risque
- [4] Haute Autorité de Santé. Grippe saisonnière : évaluation de la pertinence d'une obligation vaccinale. Juillet 2026
- [5] Etudes de couverture vaccinale contre la grippe et la Covid-19 des résidents et des professionnels salariés des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), saison 2025-2026 | Santé publique France
- [6] Hanguhard R, Fonteneau L, Bonnet N, Levy-Bruhl D, Parent-du-Châtelet I, Vaux S. decreases in influenza vaccination coverage among nursing homes' healthcare workers and in measures implemented to promote influenza vaccination, France, 2007/08 to 2024/25. Eurosurveillance. 2026 Mar; 31(12). <https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2026.31.12.2500628>
- [7] Haute Autorité de Santé. Couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier, campagne 2024-2025
- [8] Baromètre de Santé publique France : résultats de l'édition 2024. Édition Auvergne-Rhône-Alpes | Santé publique France
- [9] Vaux S, Gautier A, Fonteneau L, Gault G, Gagnière B, Soullier N, et al. Couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 à 85 ans et étude des déterminants, enquête nationale, Baromètre de Santé publique France 2021. Bull Épidémiol Hebd. 2025;(2):16-23. <http://beh.santepubliquefrance.fr/f>

Pour en savoir plus

- [Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2026. Avril 2026.](#)
- [Données épidémiologiques sur la grippe](#)
- [Données épidémiologiques sur les infections à VRS, Bronchiolite](#)
- [Données épidémiologiques sur les infections à pneumocoque](#)
- [Données de couvertures vaccinales ; Portail open data Odissé :](#)
 - Couvertures vaccinales des adolescents et adultes depuis 2011 ([France](#), [régions](#), [départements](#)) ;
 - Couvertures vaccinales du nourrisson depuis 2018 ([France](#), [régions](#), [départements](#)) ;
- Le site de référence sur les vaccinations : vaccination-info-service.fr

Rédaction

Équipe de rédaction : Thomas BÉNET, Elise BROTTET, Stéphane ÉROUART, Bertrand GAGNIERE, Gaëlle GAULT, Sandrine GAUTIER, Guillaume HEUZE, Virginie DE LAUZUN, Pascaline LOURY (Direction des régions) ; Laure FONTENEAU, Rémi HANGUEHARD, Judith MUELLER, Sophie VAUX (Direction des maladies infectieuses) ; Oriane NASSANY, Sandrine RANDRIAMAMPINANINA (Direction de la prévention et de la promotion de la santé)

Référents en région : Thomas BÉNET, Elise BROTTET

Pour nous citer : Vaccination des femmes enceintes, des seniors et des adultes à risque. Données 2025. Bulletin. Édition régionale Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Maurice : Santé publique France, 24 p., octobre 2026

Directeur de publication : Étienne POT **Date de publication :** 8 octobre 2026

Contact : cire-ara@santepubliquefrance.fr

Pour vous abonner

[Sur le site de Santé publique France](#)

ou

