Bulletin

Surveillance épidémiologique


Santé publique France

Semaine 46 (du 9 au 15 novembre 2026) - Date de publication : 19 novembre 2026

ÉDITION GRAND EST

Niveaux d'alerte

Syndromes grippaux **Bronchiolite (moins de 1 an)**



Points clés

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5

Les recours aux urgences en lien avec la bronchiolite étaient en augmentation en semaine 46 ; mais les indicateurs, en ville et à l'hôpital, restaient à des niveaux inférieurs à ceux observés à la même période l'année dernière. La circulation du VRS était toujours faible dans la région.

Syndromes grippaux - p.6

Bien qu'en légère hausse dans les services d'urgences, les indicateurs de la grippe étaient à leur niveau de base en semaine 46. La circulation des virus de la grippe restait faible dans la région.

COVID-19 - p.7

Les indicateurs syndromiques continuaient d'augmenter légèrement à l'hôpital, mais étaient stables en ville.

Gastro-entérites aiguës - p.9

Les parts d'activité pour gastro-entérites aiguës, en ville et à l'hôpital étaient stables en semaine 46, similaires à celles des années précédentes à la même période.

Actualités

Infections respiratoires aiguës : il est recommandé aux personnes à risque de forme grave de se faire vacciner sans attendre

Chaque année, les infections respiratoires aiguës, telles que la grippe et la Covid-19, touchent de nombreuses personnes, en particulier **les populations les plus vulnérables**, et sont à l'origine d'une **hausse significative des consultations médicales et des hospitalisations.** Ces épidémies ont ainsi des conséquences notables pour les patients malades mais également pour les professionnels de santé avec une pression importante sur le système de soins. La vaccination représente le moyen le plus efficace pour se prémunir des formes graves de la grippe et du Covid−19.

Les deux campagnes de vaccination contre la grippe et contre la Covid-19 sont actuellement menées de manière conjointe sur l'ensemble du territoire de France hexagonale, depuis le 13 octobre 2026.

Compte tenu de l'augmentation actuelle de la circulation des virus grippaux et du SARS-CoV-2 au niveau national, **il est vivement recommandé aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes à risque de forme grave de se faire vacciner sans attendre contre la grippe et la Covid-19.**

Les indications vaccinales contre la grippe saisonnière et le Covid-19, les précisions sur les personnes à risque de forme grave, ainsi que les vaccins disponibles sont consultables sur le site vaccination-info-service aux deux liens suivants : pour la grippe, et pour la Covid-19.

VACCINATION INFO SERVICE.FR

En complément des vaccinations, **l'adoption des gestes barrières est indispensable pour se protéger de l'ensemble des maladies de l'hiver** : le lavage des mains, l'aération des pièces et le port du masque en cas de symptômes (fièvre, mal de gorge ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles.

Prévention

Gestes barrière



Recommandations vaccinales

Bronchiolite



Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncitial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :

- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS des nouveaux nés eux-mêmes.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux



Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre 2026 en France hexagonale.**

COVID-19



La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre 2026 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës



La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.
Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an

Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données des semaines 42 et 43 sont incomplètes.

Syndromes grippaux

Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données des semaines 42 et 43 sont incomplètes.

COVID-19

Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données des semaines 42 et 43 sont incomplètes.

Figure 7. Évolution de la part des infections respiratoires aiguës basses parmi les passages aux urgences en Grand Est depuis la semaine 2026-35 par rapport au seuil d'alerte régional. (Source : OSCOUR®).



Source : Sante publique France

Gastro-entérites aigües

Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données des semaines 42 et 43 sont incomplètes.

Mortalité toutes causes

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 43-2026, Grand Est (Source : Insee, au 04/11/2026)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR® ;
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes ;
- Réseau Sentinelles ;
- Systèmes de surveillance spécifiques :
  - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ;
  - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées ;
  - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg ;
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
  - Observatoire des urgences Est-RESCUE ;
  - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Lidiana Munerol, Sophie Raguet, Justine Trompette, Marie Wagner.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 19 novembre. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 pages, 2026.

Directeur de publication : Etienne POT
Dépôt légal : 19 novembre 2026
Contact : grandest@santepubliquefrance.fr
Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr