

# 2026

## Calendario resumido de vacunación



| Edad recomendada         | Vacunas obligatorias en lactantes |         |         |         |         |         |          |          |             |  | 6 años | 11-13 años | 14 años | 25 años | 65 años y más |               |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|--|--------|------------|---------|---------|---------------|---------------|
|                          | 1 mes                             | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 11 meses | 12 meses | 16-18 meses |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>BCG</b>               |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>DTP y tosferina</b>   |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         | Cada 20 años  | Cada 10 años  |
| <b>HIB</b>               |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>Hepatitis B</b>       |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>Neumococo</b>         |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>TV</b>                |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>Meningococos ACWY</b> |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>Meningococo B</b>     |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>Rotavirus</b>         |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>VPH</b>               |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>Gripe</b>             |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               | Cada año      |
| <b>COVID-19</b>          |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               | Cada año      |
| <b>Herpes zóster</b>     |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               |               |
| <b>VRS*</b>              |                                   |         |         |         |         |         |          |          |             |  |        |            |         |         |               | 75 años y más |

\*Se recomienda la inmunización de los lactantes contra el VRS, ya sea vacunando a la mujer cuando está embarazada o al lactante tras nacer.

## Tuberculosis (BCG)

Se recomienda la vacunación contra la tuberculosis en niños con alto riesgo de exposición, desde el primer mes de vida hasta los 15 años.

## Difteria, tétanos, poliomielitis y tosferina (DTPca)

Se administrarán las dosis a las edades previstas en el calendario. En personas no vacunadas con anterioridad, la pauta de rescate será de 3 dosis separadas por un intervalo de 2 meses entre la 1.<sup>a</sup> y la 2.<sup>a</sup> dosis y un intervalo de 6 meses entre la 2.<sup>a</sup> y la 3.<sup>a</sup>.

Las mujeres embarazadas deben recibir una dosis de DTPca en cada embarazo para proteger al lactante.

## Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

En niños no vacunados, se puede realizar vacunación de rescate hasta los 5 años.

## Hepatitis B

Si la vacuna no se administró en el primer año de vida, se podrá administrar hasta los 15 años (inclusive). A partir de los 16 años, se recomienda únicamente en personas en riesgo.

## Neumococo

La vacunación es obligatoria en lactantes. La vacunación de rescate puede realizarse hasta los 24 meses de edad. Asimismo, se recomienda en personas de 65 años o más.

## Triple vírica (sarampión, paperas y rubeola)

En personas nacidas a partir de 1980, la vacunación se considera completa con 2 dosis administradas con un intervalo mínimo de 1 mes. Son necesarias 3 dosis si la primera se administró antes de los 12 meses de edad.

## Meningococos ACWY

La vacunación es obligatoria en lactantes hasta los 24 meses de edad. En caso de no haberse administrado, puede realizarse una vacunación de rescate hasta los 5 años. En adolescentes y adultos jóvenes no vacunados antes de los 14 años, se recomienda la vacunación entre los 15 y los 24 años.

## Meningococo B

La vacunación es obligatoria en lactantes hasta los 24 meses de edad. En caso de no haberse administrado, puede realizarse una vacunación de rescate hasta los 5 años. En adolescentes no vacunados con anterioridad, la vacunación puede ofrecerse entre los 15 y los 24 años.

## Rotavirus

Se recomienda la vacunación de todos los lactantes a partir de los 2 meses de edad. Según la vacuna, se administran 2 o 3 dosis por vía oral.

## Virus del papiloma humano (VPH)

Se recomienda la vacunación a niños y niñas de 11 a 14 años. En caso de no haberse administrado, puede ofrecerse la vacunación hasta los 26 años (inclusive).

## Gripe

Se recomienda vacunarse cada año, en particular a aquellas personas con mayor riesgo de complicaciones:

personas de 65 años o más, personas con determinadas enfermedades crónicas (incluidos los niños a partir de los 6 meses), mujeres embarazadas y personas con obesidad (IMC > 40 kg/m<sup>2</sup>). La vacunación contra la gripe también se puede administrar a niños y adolescentes de 2 a 17 años.

## COVID-19

En otoño, además de a los grupos de riesgo a los que se dirige la vacunación frente a la gripe, la vacuna contra la COVID-19 se recomienda también a personas con trastornos psiquiátricos, demencia o síndrome de Down.

En primavera, se recomienda en personas de 80 años o más, en residentes en centros sociosanitarios y en personas inmunodeprimidas, independientemente de su edad.

## Herpes zóster

Se recomienda la vacunación en personas a partir de los 65 años. Son necesarias dos dosis separadas por un intervalo mínimo de dos meses.

## Virus respiratorio sincitial (VRS)

Se recomienda la vacunación en personas a partir de los 75 años. Asimismo, se recomienda la vacunación en personas a partir de los 65 años con enfermedades respiratorias crónicas (en particular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o enfermedades cardíacas (en particular, insuficiencia cardíaca).

Para más información



VACCINATION  
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

