

# 2026年

## 简化疫苗接种 时间表



适合接种年龄	婴幼儿强制接种疫苗									6岁	11-13岁	14岁	25岁	65岁以上	
	1月龄	2月龄	3月龄	4月龄	5月龄	6月龄	11月龄	12月龄	16-18月龄						
卡介苗	■														
百白破-脊灰联合疫苗		■		■			■			■	■		■	■	
乙型流感嗜血杆菌疫苗		■		■			■								
乙肝疫苗		■		■			■								
肺炎链球菌疫苗		■		■			■								■
麻腮风三联疫苗								■	■						
脑膜炎球菌ACWY疫苗						■		■			■	■			
乙型脑膜炎疫苗			■		■			■							
轮状病毒疫苗		■	■	■											
人乳头瘤病毒疫苗											■	■			
流感疫苗															■
新冠肺炎疫苗															■
带状疱疹疫苗															■
呼吸道合胞病毒疫苗*															■

\*婴幼儿必须通过母亲在孕期接种呼吸道合胞病毒疫苗获得免疫力或是出生之后接种该疫苗。

## 结核病（卡介苗）

通常建议具有结核病高危风险的1月龄到15岁的儿童与少年接种结核病疫苗。

## 百白破-脊灰联合疫苗（DTcaP）

须根据疫苗时间表内标明的固定年龄接种该疫苗。对于未接种过该疫苗的人们，须接种3剂，在第1剂和第2剂之间须间隔2个月，在第2剂和第3剂之间须间隔6个月。

孕妇每次妊娠期间必须接种一剂的百白破-脊灰联合疫苗，以便保护婴儿。

## 乙型流感嗜血杆菌疫苗（Hib）

对于未接种过乙型流感嗜血杆菌疫苗的儿童，可以在5岁前补种该疫苗。

## 乙肝疫苗

如果未曾于出生后第1年接种乙肝疫苗，可以在15岁（含15岁）前补种。16岁起，仅建议具有乙肝接触风险的人群接种该疫苗。

## 肺炎链球菌疫苗

所有新生儿均需接种该疫苗，如未种，可在出生后24个月内补种。建议所有65岁或以上的人群接种该疫苗。

## 麻疹-流行性腮腺炎-风疹三联疫苗

### （麻腮风）

对于1980年及以后出生的新生儿，所谓“接种完成”是指已接种两剂疫苗，且两剂间隔至少一个月（如果第一剂是在12个月龄前接种的，则需接种三剂）。

## 脑膜炎球菌ACWY疫苗

所有24个月龄以内的婴儿均需接种该疫苗。如未接种，可以在5岁前（含5岁）补种。对于14岁前未接种过该疫苗的青少年，建议在15到24岁之间补种。

## 乙型脑膜炎疫苗

所有24月龄以内的婴儿均需接种该疫苗。如未接种，可以在5岁前（含5岁）补种。对于未接种过的青少年和年轻人，可以在15岁到24岁之间补种该疫苗。

## 轮状病毒疫苗

建议所有2月龄以上的婴儿接种该疫苗。根据不同的疫苗类型需要接种2到3剂（口服）。

## 人乳头瘤病毒疫苗(HPV)

建议11至14岁的青少年接种，如错过，一直到26岁都可以补种。

## 流感疫苗

建议每年接种该疫苗，特别是并发症高危人群：65岁或以上的老年人，患有某些慢性疾病的人群，其中包括6月龄以上的儿童，孕妇以及患有肥胖症的人群（体重指数大于40 kg m<sup>2</sup>）。2岁至17岁的所有儿童也可以接种流感疫苗。

## 新冠肺炎疫苗

在秋季，除了流感高危人群之外，还建议患有精神疾病、痴呆症或唐氏综合症的人群接种该疫苗。

在春季，建议80岁或以上的老年人、医疗养老院的老人或长期病患护理机构的居民以及免疫力低下的人群接种该疫苗。

## 带状疱疹疫苗

建议65岁或以上的老人接种该疫苗。须接种2剂，每剂间隔至少2个月。

## 呼吸道合胞病毒疫苗

建议75岁或以上的老年人接种该疫苗。同样也建议65岁或以上且患有慢性呼吸道疾病（特别是慢性阻塞性肺病）或心脏病（特别是心力衰竭）的老年人接种该疫苗。

了解更多信息

VACCINATION  
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

