Antibiorésistance

Santé publique France

Novembre 2026

DONNÉES DE SURVEILLANCE

Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques en soins de ville et en établissements pour personnes âgées dépendantes

Principaux résultats 2025

RéPIA PRIMO

Réseau piloté par Santé publique France

Sommaire

Principaux résultats **2**
Participation régionale à la surveillance **3**
Indicateurs de la surveillance **4**
Résistances bactériennes **5**
Méthodologie / Analyse et rédaction du rapport / Remerciements **15**

Principaux résultats

● Le nombre de laboratoires de biologie médicale privés (LBM) participant à la surveillance nationale de la résistance aux antibiotiques en ville et secteur médico-social a progressé en 2025 avec 2 384 LBM soit 52,4 % des LBM français contre 44,6 % en 2024 (Tableau 1).

● 1 038 665 antibiogrammes réalisés sur des entérobactéries isolées de prélèvements urinaires ont été collectés (83,0 % de *Escherichia coli* et 12,0 % de *Klebsiella pneumoniae*).

● Les deux indicateurs (l'un en soins de ville, l'autre en Ehpad) de la stratégie nationale 2022-2027 de prévention des infections et de l'antibiorésistance (1) qui concernent la résistance aux céphalosporines de 3e génération (C3G), ont augmenté et n'atteignaient pas la cible contrairement aux indicateurs concernant les fluoroquinolones (FQ) (Tableau 2).

● Résistances observées pour l'espèce *E. coli* (urinaires), patients à domicile (Tableau 3) :

- Résistance aux C3G (Cible 2027 < 3%) : 5,1 % (Figure 1a) et 4,1% par BLSE (Carte 1)
- Résistance aux FQ (Cible 2027 < 10%): 9,0 % (Carte 2)

● Résistances observées pour l'espèce *E. coli* (urinaires), résidents en Ehpad (Tableau 4) :

- Résistance aux C3G (Cible 2027 < 8 %) : 10,0 % (Figure 1a) et 8,3 % par BLSE (Carte 1)
- Résistance aux FQ (Cible 2027 < 18 %) : 11,6 % (Carte 2)

● Résistances observées pour l'espèce *K. pneumoniae* (urinaires), patients à domicile (Tableau 5) :

- Résistance aux C3G : 8,5 %, production de BLSE : 7,8 % (Carte 3)
- Résistance aux FQ : 8,4 % (Carte 4)

● Résistances observées pour l'espèce *K. pneumoniae* (urinaires), résidents en Ehpad (Tableau 6) :

- Résistance aux C3G : 21,9 %, production de BLSE : 19,8 % (Carte 3)
- Résistance aux FQ : 17,8 % (Carte 4)

En 2025, 52,4 % des laboratoires de ville ont participé à la surveillance volontaire de la résistance bactérienne aux antibiotiques de la mission PRIMO, permettant ainsi de déterminer les tendances temporelles et régionales des proportions de résistance aux antibiotiques chez les patients de ville et les résidents en Ehpad. La proportion de résistance aux C3G des souches urinaires de l'espèce *Escherichia coli* a augmenté dans les deux secteurs de soins par rapport à 2024 après une période de stabilité en soins de ville et de diminution significative en Ehpad entre 2020 et 2022. En revanche, la baisse de résistance aux fluoroquinolones des souches urinaires de *E. coli* observée en 2024 s'est confirmée en 2025 dans les 2 secteurs, atteignant ainsi les objectifs fixés par la stratégie nationale en ville (<10 %) et en Ehpad (<18 %) [1]. La résistance aux carbapénèmes restait faible pour les souches des Enterobacterales isolées des prélèvements urinaires, respectant ainsi l'objectif fixé (<0,5%), mais en augmentation continuelle depuis 2018 (Figure 2). Les évolutions observées et la variabilité inter-régionale de l'épidémiologie sont probablement multifactorielles, impliquant l'exposition aux soins (hospitalisation, consommation d'antibiotiques) et des déterminants sociaux et environnementaux [2, 3].

[1]. Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance [Internet]. Disponible sur: https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_2022-2025_prevention_des_infections_et_de_l_antibioresistance.pdf

[2]. Larramendy S, Gaultier A, Fournier JP, Caillon J, Moret L, Beaudeau F. Local characteristics associated with higher prevalence of ESBL-producing Escherichia coli in community-acquired urinary tract infections: an observational, cross-sectional study. J Antimicrob Chemother. 11 févr 2021;76(3):789-95.

[3]. Paumier A, Asquier-Khati A, Thibaut S, Coeffic T, Lemenand O, Larramendy S, et al. Assessment of Factors Associated With Community-Acquired Extended-Spectrum β-Lactamase–Producing *Escherichia coli* Urinary Tract Infections in France. JAMA Netw Open. 21 sept 2022;5(9):e2232679.

Participations régionales à la surveillance

Tableau 1. Participation régionale des laboratoires de biologie médicale à la surveillance PRIMO en 2025, France

Régions participantes	LBM installés en 2025 (n)	LBM participants au réseau PRIMO (n , %)	Évolution 2025 *vs* 2024
Auvergne-Rhône-Alpes	486	318 (65,4%)	↑
Bourgogne-Franche-Comté	143	79 (55,2%)	↑
Bretagne	165	108 (65,5%)	↑
Centre-Val de Loire	136	66 (48,5%)	→
Corse	25	16 (64,0%)	↑
Grand-Est	406	259 (63,8%)	↑
Guadeloupe	33	16 (48,5%)	↑
Guyane	14	0 (0%)	→
Hauts-de-France	356	140 (39,3%)	↑
Ile-de-France	791	225 (28,4%)	→
La Réunion	69	26 (37,7%)	→
Martinique	41	0 (0%)	→
Mayotte	2	0 (0%)	→
Normandie	157	100 (63,7%)	↑
Nouvelle-Aquitaine	389	233 (59,9%)	↑
Occitanie	460	268 (58,3%)	↑
Pays de la Loire	228	162 (71,1%)	↑
Provence-Alpes-Côte d'Azur	647	368 (56,9%)	↑
Total général	**4548**	**2384 (52,4%)**	↑

Indicateurs de la surveillance

Tableau 2. Tendances des six indicateurs de suivi de la stratégie nationale 2022-2027 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en soins de ville et Ehpad

Prélèvements urinaires	Cibles à l'horizon 2027	Nombre de régions atteignant la cible	Valeurs 2025	Tendances 2024-2025 au niveau national
Soins de ville				
% d'*E. coli* résistants aux C3G	≤ 3% au niveau national et dans toutes les régions	0	5,1%	↗ (+0,8)
% d'*E. coli* résistants aux FQ	≤ 10% au niveau national et dans toutes les régions	11	9,0%	↘ (-1,8)
% d'*E. coli*, *K. pneumoniae* et *E. cloacae* producteurs de carbapénémases	≤ 0,5% au niveau national et dans toutes les régions	15	0,084%	↗ (+0,017)
EHPAD				
% d'*E. coli* résistants aux C3G	≤ 8% au niveau national et dans toutes les régions	6	10,0%	↗ (+1,1)
% d'*E. coli* résistants aux FQ	≤ 18% au niveau national et dans toutes les régions	12	11,6%	↘ (-2,6)
% d'*E. coli*, *K. pneumoniae* et *E. cloacae* producteurs de carbapénémases	≤ 0,5% au niveau national et dans toutes les régions	15	0,125%	↗ (+0,050)

En orange : valeur au-delà de la cible de la stratégie nationale
En vert : valeur sous la cible de la stratégie nationale

Résistances bactériennes

Tableau 3. Répartition régionale de la proportion de souches de *E. coli* résistantes aux céphalosporines de 3e génération, productrices de BLSE et résistantes aux fluoroquinolones dans les prélèvements urinaires des patients vivant à domicile en 2025, France

Souches de *E. coli*	Patients vivant à domicile[1]								
	Céphalosporines de 3e génération (Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime)			Productrices de BLSE			Fluoroquinolones-R[2]		
Régions	**N**	**% R**	**IC 95%**	**N**	**% BLSE**	**IC 95%**	**N**	**% R**	**IC 95%**
Auvergne-Rhône-Alpes	123248	4,7%	[4,5% - 4,8%]	123248	3,5%	[3,4% - 3,6%]	123229	8,0%	[7,9% - 8,2%]
Bourgogne-Franche-Comté	23488	3,9%	[3,6% - 4,1%]	23488	3,1%	[2,9% - 3,4%]	23456	7,0%	[6,6% - 7,3%]
Bretagne	52300	3,4%	[3,3% - 3,6%]	52300	2,9%	[2,7% - 3%]	52293	7,1%	[6,9% - 7,4%]
Centre-Val de Loire	28435	4,1%	[3,9% - 4,4%]	28435	3,2%	[3% - 3,4%]	28417	7,2%	[6,9% - 7,5%]
Corse	5236	5,7%	[5,1% - 6,3%]	5236	4,6%	[4% - 5,2%]	5236	8,6%	[7,9% - 9,4%]
Grand-Est	75884	4,9%	[4,8% - 5,1%]	75884	4,1%	[3,9% - 4,2%]	75479	8,7%	[8,5% - 8,9%]
Guadeloupe	3893	3,2%	[2,7% - 3,8%]	3893	2,8%	[2,3% - 3,3%]	3893	12,4%	[11,3% - 13,4%]
Guyane	3	-	-	3	-	-	3	-	-
Hauts-de-France	57695	4,8%	[4,7% - 5%]	57695	3,9%	[3,8% - 4,1%]	57630	8,6%	[8,4% - 8,8%]
Île-de-France	58853	8,2%	[8% - 8,4%]	58853	6,9%	[6,7% - 7,1%]	58850	13,8%	[13,5% - 14,1%]
La Réunion	7828	3,7%	[3,3% - 4,2%]	7828	3,6%	[3,2% - 4%]	7828	15,8%	[15% - 16,6%]
Martinique	5	-	-	5	-	-	5	-	-
Normandie	69346	4,2%	[4% - 4,3%]	69346	3,5%	[3,4% - 3,7%]	69153	7,8%	[7,6% - 8%]
Nouvelle-Aquitaine	75435	4,7%	[4,5% - 4,8%]	75435	3,6%	[3,5% - 3,7%]	47323	7,6%	[7,3% - 7,8%]
Occitanie	80278	4,8%	[4,7% - 5%]	80278	3,8%	[3,7% - 4%]	78756	9,8%	[9,6% - 10%]
Pays de la Loire	58816	4,0%	[3,8% - 4,1%]	58816	3,0%	[2,9% - 3,1%]	58760	7,3%	[7,1% - 7,5%]
Polynésie Française	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Provence-Alpes-Côte d'Azur	91970	7,8%	[7,6% - 8%]	91970	6,0%	[5,8% - 6,1%]	91963	11,1%	[10,9% - 11,4%]
Réseau PRIMO	**812714**	**5,1%**	**[5,1% - 5,2%]**	**812714**	**4,1%**	**[4% - 4,1%]**	**782275**	**9,0%**	**[8,9% - 9,1%]**

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

Tableau 4. Répartition régionale de la proportion de souches de *E. coli* résistantes aux céphalosporines de 3e génération, productrices de BLSE et résistantes aux fluoroquinolones dans les prélèvements urinaires des patients vivant en Ehpad en 2025, France

Souches de *E. coli*	Patients vivant en Ehpad[1]								
	Céphalosporines de 3e génération (Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime)			Productrices de BLSE			Fluoroquinolones-R[2]		
Régions	**N**	**% R**	**IC 95%**	**N**	**% BLSE**	**IC 95%**	**N**	**% R**	**IC 95%**
Auvergne-Rhône-Alpes	7697	8,3%	[7,6% - 8,9%]	7697	6,5%	[5,9% - 7%]	7658	9,0%	[8,4% - 9,6%]
Bourgogne-Franche-Comté	1990	6,0%	[4,9% - 7%]	1990	4,5%	[3,6% - 5,4%]	1909	8,3%	[7,1% - 9,6%]
Bretagne	4542	6,8%	[6,1% - 7,6%]	4542	6,0%	[5,3% - 6,7%]	4491	10,5%	[9,6% - 11,4%]
Centre-Val de Loire	1783	7,0%	[5,8% - 8,2%]	1783	5,4%	[4,4% - 6,5%]	1723	10,9%	[9,4% - 12,4%]
Corse	236	21,2%	[16% - 26,4%]	236	18,6%	[13,7% - 23,6%]	236	14,0%	[9,6% - 18,4%]
Grand-Est	4542	9,5%	[8,6% - 10,3%]	4542	8,2%	[7,4% - 9%]	4467	11,1%	[10,1% - 12%]
Guadeloupe	39	15,4%*	[4,1% - 26,7%]*	39	15,4%*	[4,1% - 26,7%]*	39	25,6%*	[11,9% - 39,3%]*
Hauts-de-France	3820	13,9%	[12,8% - 15%]	3820	11,5%	[10,5% - 12,6%]	3813	14,0%	[12,9% - 15,1%]
Île-de-France	884	17,8%	[15,2% - 20,3%]	884	15,8%	[13,4% - 18,2%]	834	21,3%	[18,6% - 24,1%]
La Réunion	126	3,2%	[0,1% - 6,2%]	126	3,2%	[0,1% - 6,2%]	126	17,5%	[10,8% - 24,1%]
Martinique	27	7,4%*	[0% - 17,3%]*	27	7,4%*	[0% - 17,3%]*	27	22,2%*	[6,5% - 37,9%]*
Normandie	2669	7,9%	[6,9% - 9%]	2669	6,0%	[5,1% - 6,9%]	2675	9,1%	[8% - 10,2%]
Nouvelle-Aquitaine	6032	9,6%	[8,9% - 10,4%]	6032	8,0%	[7,3% - 8,7%]	4257	9,4%	[8,6% - 10,3%]
Occitanie	4520	10,7%	[9,8% - 11,6%]	4520	9,2%	[8,4% - 10%]	4481	13,0%	[12% - 13,9%]
Pays de la Loire	4495	5,2%	[4,6% - 5,9%]	4495	4,3%	[3,7% - 4,9%]	4484	7,3%	[6,5% - 8,1%]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5564	18,0%	[17% - 19%]	5564	15,3%	[14,4% - 16,3%]	5547	20,0%	[18,9% - 21%]
Réseau PRIMO	**48966**	**10,0%**	**[9,7% - 10,2%]**	**48966**	**8,3%**	**[8,1% - 8,6%]**	**46767**	**11,6%**	**[11,4% - 11,9%]**

[1] Données issues de la mission PRIMO et SPARES

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Tableau 5. Répartition régionale de la proportion de souches de *K. pneumoniae* résistantes aux céphalosporines de 3e génération, productrices de BLSE et résistantes aux fluoroquinolones dans les prélèvements urinaires des patients vivant à domicile en 2025, France

Souches de *K. pneumoniae*	Patients vivant à domicile[1]								
	Céphalosporines de 3e génération (Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime)			Productrices de BLSE			Fluoroquinolones-R[2]		
Régions	**N**	**% R**	**IC 95%**	**N**	**% BLSE**	**IC 95%**	**N**	**% R**	**IC 95%**
Auvergne-Rhône-Alpes	16351	8,0%	[7,6% - 8,4%]	16351	7,2%	[6,8% - 7,6%]	16347	7,6%	[7,2% - 8%]
Bourgogne-Franche-Comté	3120	7,6%	[6,6% - 8,5%]	3120	6,7%	[5,9% - 7,6%]	3115	6,9%	[6% - 7,8%]
Bretagne	5600	6,8%	[6,1% - 7,4%]	5600	6,6%	[5,9% - 7,2%]	5598	6,4%	[5,8% - 7,1%]
Centre-Val de Loire	3188	8,1%	[7,1% - 9%]	3188	7,6%	[6,6% - 8,5%]	3186	4,7%	[4% - 5,4%]
Corse	993	8,7%	[6,9% - 10,4%]	993	7,6%	[5,9% - 9,2%]	992	7,4%	[5,7% - 9%]
Grand-Est	11204	7,2%	[6,7% - 7,6%]	11204	6,7%	[6,2% - 7,1%]	11150	7,0%	[6,5% - 7,4%]
Guadeloupe	1487	8,4%	[7% - 9,8%]	1487	7,1%	[5,8% - 8,4%]	1487	11,3%	[9,7% - 12,9%]
Guyane	2	-	-	2	-	-	2	-	-
Hauts-de-France	8319	9,0%	[8,4% - 9,6%]	8319	8,2%	[7,6% - 8,8%]	8311	8,3%	[7,7% - 8,9%]
Île-de-France	9801	9,8%	[9,2% - 10,3%]	9801	9,0%	[8,5% - 9,6%]	9801	9,6%	[9% - 10,1%]
La Réunion	1844	10,1%	[8,7% - 11,5%]	1844	10,0%	[8,7% - 11,4%]	1843	13,0%	[11,5% - 14,6%]
Martinique	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Normandie	8050	8,1%	[7,5% - 8,7%]	8050	7,2%	[6,6% - 7,7%]	8038	7,6%	[7,1% - 8,2%]
Nouvelle-Aquitaine	9460	7,3%	[6,8% - 7,8%]	9460	6,4%	[5,9% - 6,9%]	5778	7,0%	[6,4% - 7,7%]
Occitanie	11920	8,1%	[7,6% - 8,6%]	11920	7,3%	[6,9% - 7,8%]	11726	7,6%	[7,2% - 8,1%]
Pays de la Loire	6844	6,0%	[5,4% - 6,5%]	6844	5,7%	[5,2% - 6,3%]	6835	6,6%	[6% - 7,2%]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	16698	11,6%	[11,1% - 12,1%]	16698	11,1%	[10,6% - 11,6%]	16697	12,4%	[11,9% - 12,9%]
Réseau PRIMO	**114882**	**8,5%**	**[8,3% - 8,6%]**	**114882**	**7,8%**	**[7,7% - 8%]**	**110907**	**8,4%**	**[8,2% - 8,5%]**

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

Tableau 6. Répartition régionale de la proportion de souches de *K. pneumoniae* résistantes aux céphalosporines de 3e génération, productrices de BLSE et résistantes aux fluoroquinolones dans les prélèvements urinaires des patients vivant en Ehpad en 2025, France


Souches de *K. pneumoniae*	Patients vivant en Ehpad[1]								
	Céphalosporines de 3e génération (Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime)			Productrices de BLSE			Fluoroquinolones-R[2]		
Régions	**N**	**% R**	**IC 95%**	**N**	**% BLSE**	**IC 95%**	**N**	**% R**	**IC 95%**
Auvergne-Rhône-Alpes	1447	20,4%	[18,3% - 22,5%]	1447	18,4%	[16,4% - 20,4%]	1443	13,4%	[11,6% - 15,1%]
Bourgogne-Franche-Comté	373	20,6%	[16,5% - 24,8%]	373	16,9%	[13,1% - 20,7%]	349	17,8%	[13,8% - 21,8%]
Bretagne	821	17,5%	[14,9% - 20,1%]	821	16,8%	[14,3% - 19,4%]	807	16,4%	[13,8% - 18,9%]
Centre-Val de Loire	320	22,8%	[18,2% - 27,4%]	320	19,4%	[15% - 23,7%]	313	17,6%	[13,4% - 21,8%]
Corse	55	29,1%	[17,1% - 41,1%]	55	29,1%	[17,1% - 41,1%]	55	32,7%	[20,3% - 45,1%]
Grand-Est	946	21,5%	[18,8% - 24,1%]	946	20,2%	[17,6% - 22,7%]	929	16,7%	[14,3% - 19,1%]
Guadeloupe	20	20,0%*	[2,5% - 37,5%]*	20	15,0%*	[0% - 30,6%]*	20	50,0%*	[28,1% - 71,9%]*
Hauts-de-France	829	22,6%	[19,7% - 25,4%]	829	17,6%	[15% - 20,2%]	823	13,7%	[11,4% - 16,1%]
Île-de-France	193	29,5%	[23,1% - 36%]	193	29,0%	[22,6% - 35,4%]	185	28,6%	[22,1% - 35,2%]
La Réunion	44	29,5%*	[16,1% - 43%]*	44	29,5%*	[16,1% - 43%]*	44	31,8%*	[18,1% - 45,6%]*
Martinique	18	27,8%*	[7,1% - 48,5%]*	18	27,8%*	[7,1% - 48,5%]*	18	33,3%*	[11,6% - 55,1%]*
Normandie	484	19,2%	[15,7% - 22,7%]	484	16,7%	[13,4% - 20,1%]	484	16,7%	[13,4% - 20,1%]
Nouvelle-Aquitaine	1228	24,7%	[22,3% - 27,1%]	1228	22,4%	[20,1% - 24,7%]	787	17,5%	[14,9% - 20,2%]
Occitanie	860	22,7%	[19,9% - 25,5%]	860	20,0%	[17,3% - 22,7%]	847	20,1%	[17,4% - 22,8%]
Pays de la Loire	708	12,7%	[10,3% - 15,2%]	708	12,3%	[9,9% - 14,7%]	708	11,7%	[9,4% - 14,1%]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1167	27,8%	[25,2% - 30,3%]	1167	26,6%	[24,1% - 29,2%]	1165	27,0%	[24,5% - 29,6%]
Réseau PRIMO	**9513**	**21,9%**	**[21% - 22,7%]**	**9513**	**19,8%**	**[19% - 20,6%]**	**8977**	**17,8%**	**[17% - 18,6%]**

[1] Données issues de la mission PRIMO et SPARES

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine


* Nombre de souches < 50

Figure 1a. Évolution entre 2017 et 2025 du pourcentage de souches urinaires de *E.coli* résistantes aux C3G chez les patients vivants à domicile et en Ehpad, France




* Pour l'année 2023, seules les données PRIMO ont été incluses pour les résultats en Ehpad.

Figure 1b. Évolution entre 2017 et 2025 du pourcentage de souches urinaires de *E.coli* résistantes aux fluoroquinolones chez les patients vivants à domicile et en Ehpad, France




* Pour l'année 2023, seules les données PRIMO ont été incluses pour les résultats en Ehpad.


Carte 1.Proportions régionales de résistance aux céphalosporines de 3e génération par production de BLSE des souches urinaires de *E. coli* chez les patients vivant à domicile et en Ehpad, France, 2025



Carte 2. Proportions régionales de résistance aux fluoroquinolones (FQ) des souches urinaires de *E. coli* chez les patients vivant à domicile et en Ehpad, France, 2025



Carte 3. Proportions régionales de résistance aux céphalosporines de 3e génération par production de BLSE des souches urinaires de *K. pneumoniae* chez les patients vivant à domicile et en Ehpad, France, 2025



Carte 4. Proportions régionales de résistance aux fluoroquinolones (FQ) des souches urinaires *K. pneumoniae* chez les patients vivant à domicile et en Ehpad, France, 2025





Figure 2. Évolution entre 2018 et 2025 de la proportion des souches urinaires des *Enterobacterales* productrices de carbapénémases chez les patients de ville, France



Méthodologie

Ville et EHPAD indépendants : e-outil MedQualVille, mission nationale PRIMO

EHPAD intégrés à un établissement de santé : e-outil ConsoRes, mission nationale SPARES (excepté l'année 2023)

Analyse et rédaction du rapport

Dr Olivier LEMENAND, Sonia THIBAUT-JOVELIN, Thomas COEFFIC, Dr Gabriel BIRGAND (responsable), PRIMO, Cpias des Pays de la Loire

Remerciements

L'équipe PRIMO remercie les biologistes participant à la surveillance de la résistance PRIMO : A Vrain, Labouest, Ancenis ; M Sansot, Cerballiance Pays de la Loire, Laval ; C Leboucher, Bioliance, Nantes ; F Maillet, Bioloire, Nantes ; G de Gastines, Biogroup Atlantique Centre BIORYLIS, La Roche sur Yon ; V Leroux, Laborizon Maine Anjou, Le Mans ; K Konstantinov, Synlab Normandie Maine, La Ferté-Macé ; F Kerdavid, Alliance Anabio, Melesse ; A Denoel, Laborizon-Bretagne-Biogroup, Noyal ; S Gillard, Ouest-Biologie-Biolor, Lorient ; B Guesnon, Ouest Biologie, Saint Malo ; B Gestin, Eurofins Labazur Bretagne, Chateaulin ; S Arsene, Cerballiance Normandie, Lisieux ; E Pradier, Groupe Biologique des Carmes, Caen ; F Artur, Biocéane, Le Havre ; O Dorson, D-Lab, Dieppe ; V Wehrlé, BioLbs, Rouen ; A Holstein, Laborizon Centre Biogroup, Tours ; D Bouvet, Bio MédiQual centre, Châteauroux ; C Laudignon, MédiBiolab-Mlab, Orléans ; C Valin, Biogroup Aura, Lyon ; E Burgonse, Eurofins Labazur Rhône-Alpes, Les marches ; F Cabanne, Eurofins Cbm69, Villeurbanne ; E Chanard, Cerballiance Aura, Villon ; G Deleglise, Genbio, Clermont Ferrand ; C Lerisbe, BiogroupOriade Noviale, Briançon ; L Gauthier, Bioval, Annecy ; N Lecordier, Analysis 88, Épinal ; A Duda, Atoutbio, Nancy ; E Grandsire, OuilabDynalab, Romilly sur Seine ; JP Rault, Ouilab-Espacebio, Metz ; P Demonchy, Biogroup Lorraine, Metz ; S Huck, Biogroup Est, Strasbourg ; E Sanandedji, Bioardaisnes, Rethel ; J Cadenet, Biovsm, Noisy le Grand ; J Amzalag, Biogroup Paris Est-Sud-Oise-Aisne, Thiais; Ophélie Said-Delattre, BiogroupParis Ouest, Saint-Ouen-sur-Seine; L Libier, InovieAxbio, Bayonne ; A Touzalin, Bio17, Marans ; A Allery, Biogroup Atlantique Centre, Poitiers ; H Valade, Bioffice, Bordeaux ; S Benzimra, Biolab33, Le Haillan ; C Morate, Novabio, Périgueux ; S Zaffreya, Cerballiance Nouvelle Aquitaine, Le Haillan ; M. Hipolyte, Biogroup Corse, Porto Vecchio ; E Parisi, Vialle, Bastia ; D Robert, Cerballiance Occitanie, Toulouse ; J Bayette, Inovie-Labosud, Montpelier ; MF Aran, Inovie-BioMédilab, Perpignan ; S Coutanson, Bioaxiome, Avignon ; A François, BioesterelBiogroup, Mandelieu-la-Napoule ; L Prots, Cerballiance Côte d'Azur, Nice ; E Delaunay, Cerballiance Provence, Marseille ; K Decrucq, Cerballiance HDF, Lille ; O Duquesnoy, Biopath, Dunkerque ; T Guffond, Biogroup Nord-Diagnovie, Villeneuve-d'Ascq ; E Mbenga, Unilabs, Beaune ; A Desjardins, Evorial, Nevers; P Kassab, InovieBiopôle Antilles, Guadeloupe; A NzeumiFanmi, Cerballiance île de la Réunion, le PORT

L'équipe PRIMO remercie également l'équipe SPARES et les biologistes fournissant leurs données de résistance aux antibiotiques pour les Ehpad des établissements de santé via ConsoRes®

MOTS CLÉS : ANTIBIORÉSISTANCE, BACTÉRIES, EHPAD, SOINS DE VILLE, SURVEILLANCE

Citation suggérée : Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques en soins de ville et en établissements pour personnes âgées dépendantes. Principaux résultats 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, novembre 2026. 15 p. www.santepubliquefrance.fr

ISSN : 2534-6539 / ISBN-NET : 978-2-37986-106-2 / RÉALISÉ PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / DÉPÔT LÉGAL : NOVEMBRE 2026