

Synthèse :

- Au cours de la **1^{ère} semaine de 2018** (du 1^{er} au 07 janvier), l'**activité toutes causes** des associations SOS Médecins est en **forte baisse chez les enfants** (-29% soit -9 498 visites) et **en hausse chez les adultes** (+7% soit +4 530 visites).
- Les **pathologies saisonnières** sont **globalement stables ou en baisse** dans toutes les classes d'âges et plus particulièrement chez les enfants ; en lien avec la baisse de l'activité globale.
Les consultations pour **grippe/syndrome grippal** sont en **baisse chez les enfants** (-39% soit -1 909 visites) et **stables chez les adultes**. Les parts d'activité associées dans l'activité totale pour ces classes d'âges sont respectivement de 13,5% et 17,5% et légèrement supérieures aux années précédentes à la même période.
On retient également une baisse des consultations pour **bronchiolite** (-30% soit -218 visites) chez les moins de 2 ans, pour **bronchite** chez les enfants (-43%) et les adultes (-5%) et pour **pneumopathie** chez les enfants (-44% soit -130 visites). Les recours pour **gastro-entérite** sont stables sauf chez les **15-74 ans** où ils sont **légèrement en hausse** (+6,3% soit +278 visites)..
La plupart des **indicateurs non spécifiques** sont **en baisse ou stables** dans toutes les classes d'âges. On note une hausse des recours (effectifs faibles) pour **malaise** chez les 2-14 ans (+80% soit +10 visites) et les 15-74 ans (+11% soit +23 visites), pour **allergie** chez les 15-74 ans (+14% soit +60 visites) et **conjonctivites infectieuses** chez les adultes (+31% soit +94 visites).
- Parmi les **pathologies les plus fréquemment rencontrées** dans les associations SOS Médecins, en dehors des pathologies saisonnières on note la hausse, des recours pour **varicelle** (+22) chez les enfants de 2-14 ans, **douleurs abdominales aiguës** chez les personnes de 2 à 74 ans (+18%) associée à une hausse des **troubles digestifs** divers chez les adultes de 15-74 ans (17%), ainsi que la hausse des **traumatismes** chez les adultes (+26) et des **insuffisances cardiaques** chez les 75 ans et plus (+15%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Allergie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Conjonctivite infectieuse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	≈	>
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	≈
Bronchite	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	<	>
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	≈	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Pathologies des voies respiratoires hautes (ORL)	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés	2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France	3
Activité totale SOS Médecins.....	4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....	5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	6
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée.....	7
Activité SOS Médecins liée à un malaise	8
Activité SOS Médecins liée à crise d'asthme	9
Activité SOS Médecins liée à une allergie	10
Activité SOS Médecins liée à une conjonctivite infectieuse	11
Activité SOS Médecins liée à une grippe/ syndromes grippaux	12
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite.....	13
Activité SOS Médecins liée à une bronchite	14
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie	15
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite.....	16
Activité SOS Médecins liée aux pathologies des voies respiratoires hautes	17

Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](http://santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux : [Consulter les PE des Cires](#)

Pour les indicateurs saisonniers :

Bulletin Grippe :

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance>

Bulletin Bronchiolite :

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine>

Bulletin Gastro-entérite:

- <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue-semaine-46.-Saison-2017-2018>

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :


- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Malaise
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie ;
 - Conjonctivite infectieuse;
 - Grippe, syndromes grippaux
 - Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans uniquement);
 - Bronchite ;
 - Pneumopathie
 - Gastro-entérite;
 - Pathologies des voies respiratoires hautes : laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD[®] (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Légende


- Emplacement d'une association SOS Médecins
- Département n'ayant pas d'association SOS Médecins
- Département ayant au moins une association SOS Médecins

Réalisation : DCAR USS - mars 2015
Sources : données SOS Médecins, IGN

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	21 855	27 258	-19,82%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	13 834	15 331	-9,76%
BRONCHITE (Diag SOS)	6 950	8 196	-15,20%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	6 809	6 611	3,00%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 169	1 750	23,94%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 112	1 820	16,04%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 585	1 295	22,39%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 526	1 303	17,11%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 446	1 128	28,19%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	1 443	1 497	-3,61%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	3 158	4 413	-28,44%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	505	673	-24,96%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	497	715	-30,49%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	486	502	-3,19%
BRONCHITE (Diag SOS)	405	526	-23,00%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	226	320	-29,38%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	210	261	-19,54%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	156	201	-22,39%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	123	115	6,96%
DIARRHEE (Diag SOS)	120	119	,84%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 275	10 369	-39,48%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	2 421	4 162	-41,83%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 263	1 310	-3,59%
BRONCHITE (Diag SOS)	902	1 765	-48,90%
VARICELLE (Diag SOS)	458	375	22,13%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	391	593	-34,06%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	366	457	-19,91%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	259	276	-6,16%
ALLERGIE (Diag SOS)	246	277	-11,19%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	243	213	14,08%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	11 767	11 702	,56%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	10 249	9 890	3,63%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 685	4 407	6,31%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 109	4 339	-5,30%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 954	1 525	28,13%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 768	1 464	20,77%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 343	1 088	23,44%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 044	877	19,04%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	944	808	16,83%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	890	706	26,06%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	1 501	1 537	-2,34%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	624	555	12,43%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	601	640	-6,09%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	562	547	2,74%
DECES (Diag SOS)	399	383	4,18%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	366	293	24,91%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	354	368	-3,80%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	337	310	8,71%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	243	212	14,62%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	199	220	-9,55%

Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite infectieuse (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite infectieuse dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour conjonctivite infectieuse


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **grippe/syndrome grippal** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de grippe/syndrome grippal dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre) chez les enfants de moins de 2 ans




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-17	376,00	287,00	-20,00	-10,03
S51-17	367,00	275,00	-2,39	-4,18
S52-17	399,00	315,00	8,72	14,55
S01-18	278,00	217,00	-30,33	-31,11

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une bronchite (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour bronchite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pneumopathie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée aux **voies respiratoires hautes*** (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions pathologies liées aux voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

