

Surveillance de la grippe

Bulletin périodique : janvier et février 2012 (S01 à 08)

| GUYANE |

Le point épidémiologique — N°02 / 2012

Surveillance des syndromes grippaux par les médecins du réseau sentinelle et les centres et postes de santé

Depuis le début de l'année (S2012-01), le nombre hebdomadaire de syndromes grippaux diagnostiqués en médecine de ville a progressivement augmenté jusqu'à dépasser les valeurs maximales attendues au cours de la 1^{ère} semaine de février (S2012-05).


L'activité grippale est soutenue et stable depuis le début du mois de février, confirmant ainsi le passage en début d'épidémie. La

commune de Cayenne est plus particulièrement concernée par ce phénomène saisonnier, regroupant plus de 65% des syndromes grippaux estimés en février.

Au total, au cours des 4 premières semaines de février, 1 488 consultations pour syndrome grippal ont été enregistrées sur le département contre 1 094 au cours du mois de janvier.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire de patients ayant présenté un syndrome grippal et ayant consulté un médecin généraliste* ou ayant consulté dans les Centres délocalisés de soins et de prévention, Guyane, janvier 2008 à février 2012 / *Estimated weekly number of flu like illnesses diagnosed in GP clinics or health centres, French Guiana, January 2008 to February 2012*



*Le nombre de cas est une estimation pour l'ensemble de la population guyanaise du littoral du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de grippe. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.


Surveillance des virus grippaux

Sur un total de 27 prélèvements naso-pharyngés réalisés depuis le début de l'année, 1 a permis d'identifier le virus A/H1N1 pdm2009 chez un patient diagnostiqué à Saint

-Laurent et 3 étaient positifs au virus A/H3 saisonnier pour des patients diagnostiqués à Matoury et Cayenne.

| Figure 2 |

Répartition des prélèvements naso-pharyngés suivant l'étiologie, Guyane - janvier 2012 à février 2012 / *Distribution of influenza virus type in positive GP clinic's samplings, French Guiana, January 2012 to February 2012*



Quelques chiffres à retenir

En Guyane

Au cours des mois de janvier et février 2012 :

- 2 582 syndromes grippaux estimés
- Virus circulants : A/H1N1pdm2009 et A/H3 saisonnier

Situation dans les DFA

- En Martinique :
Activité grippale soutenue
- En Guadeloupe :
Début d'épidémie
- A Saint-Martin :
Activité grippale faible
- A Saint-Barthélemy :
Activité grippale faible

Directeur de la publication

Dr Françoise Weber,
directrice générale de l'InVS

Rédacteur en chef

Martine Ledrans, coordonnatrice
scientifique de la Cire AG

Maquettiste

Claudine Suivant

Comité de rédaction

Vanessa Ardillon
Luisiane Carvalho
Claude Flamand

Diffusion

Cire Antilles Guyane
Centre d'Affaires AGORA
Pointe des Grives. B.P. 658.
97261 Fort-de-France
Tél. : 596 (0)596 39 43 54
Fax : 596 (0)596 39 44 14
<http://www.invs.sante.fr>
<http://www.ars.guyane.sante.fr>

Distribution spatiale des cas

Au cours des mois janvier et février, les communes où l'incidence a été la plus élevée sont Cayenne (23 pour 1 000 hab.), Kourou (9 pour 1 000 hab.) et Saint-Laurent du Maroni (7 pour 1 000 hab.).

Surveillance hospitalière

Au **Centre hospitalier Andree Rosemon** (CHAR), 3 passages aux urgences pour motif grippe ont été recensés depuis le début de l'année (S2012-01 à S2012-08) sans notion d'hospitalisation. Pour cette même période, 35 consultations pour syndrome grippal ont été enregistrées à la garde médicale de Cayenne dont 21 au cours de la 4^{ème} semaine de février (S2012-08).

Au **Centre médico-chirurgical de Kourou** (CMCK), seul 1 diagnostic de « fièvre isolée » a été rapporté aux urgences sans notion d'hospitalisation depuis le début de l'année (S2012-01 à S2012-08)*.

Les données sont manquantes pour le **Centre hospitalier de l'ouest guyanais** (CHOG).

*Données incomplètes

Analyse de la situation épidémiologique

Au cours du mois de janvier, une recrudescence du nombre hebdomadaire de syndromes grippaux a été observée et s'est caractérisée par le dépassement des valeurs maximales attendues au cours de la 1^{ère} semaine de février.

Depuis, l'activité grippale est stable et soutenue, et concerne plus particulièrement la commune de Cayenne.

Les virus grippaux A/H1N1pdm2009 et A/H3 saisonnier ont été identifiés à Saint-Laurent, Cayenne et Matoury.

Cette évolution signe le début de l'épidémie saisonnière sur le département.

Recommandations

Afin de limiter les risques de transmission, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique et lorsque vous éternuez ou toussiez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre manche ou un mouchoir à usage unique. En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence.

Nos partenaires

Remerciements à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS (Dr Françoise Eltgès, Dr Jean-Marc Fischer, Rocco Carlisi, Claire-Marie Cazaux, Danièle Le Bourhis, Hélène Euzet), au réseau de médecins généralistes sentinelles, aux services hospitaliers (urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), aux Centres délocalisés de prévention et de soins, au CNR arbovirus et virus influenzae de l'Institut Pasteur de Guyane, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.

