

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la bronchiolite :



► Points clés

En Nouvelle-Aquitaine : poursuite de la hausse des indicateurs hospitaliers, marquée par une forte augmentation de la part d'hospitalisation pour bronchiolite chez les moins de 2 ans.

L'épidémie de bronchiolite, qui a débuté précocement en semaine 41 (11 au 17 octobre 2021), se poursuit depuis 7 semaines dans la région. Après la diminution liée aux congés scolaires, une nouvelle augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations pour bronchiolite est observée pour la 2^{ème} semaine consécutive.

En semaine 47-2021 (22 au 28 novembre 2021)* :

- 339 passages aux urgences enregistrés soit 18,3 % de l'activité chez les moins de 2 ans (contre 14,1 % en semaine 46), dont 147 ont été suivis d'une hospitalisation soit 43,4 % des cas de bronchiolite ;
- **La part des bronchiolites parmi les hospitalisations chez les moins de 2 ans est en forte hausse (38,1 % en semaine 47 contre 31,3 % en semaine 46) ;** près de 95 % des hospitalisations pour bronchiolite concernent des enfants de moins de 1 an ;
- **La circulation du VRS reste active** sur le territoire.


* Données SOS Médecins non disponibles en S47 du fait d'un mouvement de grève qui impacte l'activité des associations SOS Médecins.

Au niveau territorial, cette hausse des indicateurs hospitaliers est principalement observée dans les Deux-Sèvres (24 % des passages aux urgences et 50 % des hospitalisations concernent des bronchiolites), en Gironde (23 % des passages aux urgences et 43 % des hospitalisations concernent des bronchiolites) et dans la Vienne (23 % des passages aux urgences et 34 % des hospitalisations concernent des bronchiolites).

Au niveau national : poursuite de l'épidémie de bronchiolite en France métropolitaine

Une forte augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans est observée, avec des indicateurs à un niveau élevé en semaine 47-2021. L'épidémie se poursuit sur le territoire avec le passage en phase pré-épidémique à La Réunion.

► Niveau d'alerte régional de la bronchiolite, chez les enfants de moins de 2 ans, France, semaine 47-2021



► Prévention

Le virus responsable de la bronchiolite (VRS, virus respiratoire syncytial) se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements. Il peut aussi rester sur les mains et les objets.


Le respect des mesures barrières reste essentielle pour notamment le lavage régulier des mains ou l'utilisation d'une solution hydro-alcoolique, l'aération des pièces, l'utilisation d'un masque pour s'occuper du bébé en cas de rhume.

Plus d'informations sur les mesures de prévention en page 3 de ce Point Epidémiologique.

Surveillance en ville

SOS Médecins


Figure 1. Evolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine (*S47 non disponible*)



Surveillance à l'hôpital

Passages aux urgences

Figure 2. Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, Nouvelle-Aquitaine



Afin d'éviter la transmission du virus de la bronchiolite, il est **recommandé aux familles de continuer à respecter les mesures barrières**. C'est essentiel pour lutter contre la prolifération du virus d'autant que les adultes et les grands enfants qui en sont porteurs n'ont habituellement aucun symptôme ou ont juste un simple rhume. Le lavage des mains, l'aération des pièces ou l'utilisation d'un masque pour s'occuper du bébé en cas de rhume restent essentiels.

L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les réseaux **AquiRespi** et **Périnat Nouvelle-Aquitaine (RPNA)**, a réalisé l'infographie ci-dessous à destination des familles pour rappeler les mesures de prévention.

Une [brochure](#) intitulée "Votre enfant et la bronchiolite" est aussi disponible sur le site de Santé publique France.

Dans la majorité des cas, la bronchiolite ne nécessite pas une hospitalisation et peut donc être prise en charge par un médecin de ville. Ce dernier pourra prescrire, si besoin, de la kinésithérapie respiratoire qui sera un soutien complémentaire pour la prise en charge et l'évaluation de l'état clinique du nourrisson en période critique.

Plus d'informations sur bronchiolite.org

Retrouvez toutes les informations sur les mesures de prévention sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine : [Comment prévenir la bronchiolite](#)

Comment prévenir la bronchiolite du nourrisson ?

- 1 Se laver les mains avant de s'occuper de son bébé
- 2 Aérer sa chambre tous les jours comme le reste du domicile
- 3 Veiller à ce que la température de sa chambre ne dépasse pas 19 degrés
- 4 Ne pas l'exposer à la fumée de cigarette
- 5 Privilégier les sorties en extérieur et à l'air libre
- 6 Poursuivre, si possible, l'allaitement maternel
Le lait maternel contient des éléments permettant de combattre le virus
- 7 Lui laver régulièrement le nez au sérum physiologique
- 8 En cas de symptômes, porter un masque et éviter de l'embrasser sur le visage
- 9 Si besoin, demander conseils aux professionnels de santé

Pour plus d'informations et trouver un kiné de garde en Nouvelle-Aquitaine : bronchiolite.org

<https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr>

Rédacteur en chef
Laurent Filleul

Equipe de rédaction

Santé publique France
Nouvelle-Aquitaine

Anne Bernadou
Martine Casseron
Christine Castor
Sandrine Coquet
Sullivan Evain
Laurent Filleul
Gaëlle Gault
Alice Herteau
Anais Lamy
Sophie Larrieu
Marie-Anne Montaufray
Laure Meurice
Ursula Noury
Anna Siguier
Pascal Vilain

En collaboration à Santé publique France avec la Direction des maladies infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et analyse de données (Data)

Contact presse

presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication

01 décembre 2021

Sites associés :

- [SurSaUD@](#)
- [OSCOUR@](#)
- [SOS Médecins](#)

Remerciements aux partenaires de la surveillance

Associations SOS Médecins de Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Pau et Bayonne
Services d'urgences du réseau Oscour®
Observatoire Régional des Urgences Nouvelle-Aquitaine
Laboratoire de virologie et unité de surveillance biologique du CHU de Bordeaux
Laboratoire de virologie du CHU de Limoges
Laboratoire de virologie du CHU de Poitiers
Les équipes de l'ARS Nouvelle-Aquitaine
ainsi que l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance

GÉODES
GÉO DONNÉES EN SANTÉ PUBLIQUE

ars
Agence Régionale de Santé

**MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ**
Liberté
Égalité
Fraternité

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

10 conseils pour protéger les uns les autres :

- 1 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
- 2 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- 3 Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
- 4 Éviter de se toucher le visage
- 5 Respecter une distance d'au moins deux mètres avec les autres
- 6 Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
- 7 Porter un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 quand la distance de deux mètres ne peut pas être respectée
- 8 Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)
- 9 Aérer les pièces le plus souvent possible, au minimum quelques minutes toutes les heures
- 10 Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)