

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la bronchiolite :



► Points clés

En Nouvelle-Aquitaine : nouvelle hausse des indicateurs hospitaliers

L'épidémie de bronchiolite, qui a débuté précocement en semaine 41 (11 au 17 octobre 2021), se poursuit depuis 6 semaines dans la région. Après la diminution liée aux congés scolaires, une nouvelle augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations pour bronchiolite est observée.

En semaine 46-2021 (15 au 21 novembre 2021) :

- 70 consultations SOS Médecins* enregistrées soit 7,4 % de l'activité concernant les enfants de moins de 2 ans (contre 8,0 % en semaine 45) ;
- 232 passages aux urgences enregistrés soit 14,1 % de l'activité chez les moins de 2 ans (contre 13,8 % en semaine 45), dont 96 ont été suivis d'une hospitalisation soit 41,4 % des cas de bronchiolite ;
- **La part des bronchiolites parmi les hospitalisations chez les moins de 2 ans est en légère hausse (31,4 % en semaine 46 contre 30,2 % en semaine 45) ;** près de 96 % des hospitalisations pour bronchiolite concernent des enfants de moins de 1 an ;
- **La circulation du VRS reste active** sur le territoire.

* *Interprétation prudente des données du fait d'un mouvement de grève qui impacte l'activité des associations SOS Médecins depuis la semaine 39-2021.*

Au niveau territorial, cette hausse des indicateurs hospitaliers est principalement observée dans les Deux-Sèvres (25 % des passages aux urgences et 60 % des hospitalisations concernent des bronchiolites) et dans les Landes (22 % des passages aux urgences et 58 % des hospitalisations concernent des bronchiolites).

Au niveau national :

En semaine 46-2021, l'épidémie de bronchiolite se poursuit dans l'ensemble des régions de France métropolitaine. Les passages aux urgences et les hospitalisations augmentent à nouveau chez les enfants de moins de 2 ans, après une diminution liée aux congés scolaires et jour férié.

► Niveau d'alerte régional de la bronchiolite, chez les enfants de moins de 2 ans, France, semaine 46-2021



► Prévention

Le virus responsable de la bronchiolite (VRS, virus respiratoire syncytial) se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements. Il peut aussi rester sur les mains et les objets.


Le respect des mesures barrières reste essentielle pour notamment le lavage régulier des mains ou l'utilisation d'une solution hydro-alcoolique, l'aération des pièces, l'utilisation d'un masque pour s'occuper du bébé en cas de rhume.

Plus d'informations sur les mesures de prévention en page 3 de ce Point Epidémiologique.

Surveillance en ville

SOS Médecins


Figure 1. Evolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine



Surveillance à l'hôpital

Passages aux urgences

Figure 2. Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, Nouvelle-Aquitaine



Afin d'éviter la transmission du virus de la bronchiolite, il est **recommandé aux familles de continuer à respecter les mesures barrières**. C'est essentiel pour lutter contre la prolifération du virus d'autant que les adultes et les grands enfants qui en sont porteurs n'ont habituellement aucun symptôme ou ont juste un simple rhume. Le lavage des mains, l'aération des pièces ou l'utilisation d'un masque pour s'occuper du bébé en cas de rhume restent essentiels.

L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les réseaux **AquiRespi** et **Périnat Nouvelle-Aquitaine (RPNA)**, a réalisé l'infographie ci-dessous à destination des familles pour rappeler les mesures de prévention.

Une [brochure](#) intitulée "Votre enfant et la bronchiolite" est aussi disponible sur le site de Santé publique France.

Dans la majorité des cas, la bronchiolite ne nécessite pas une hospitalisation et peut donc être prise en charge par un médecin de ville. Ce dernier pourra prescrire, si besoin, de la kinésithérapie respiratoire qui sera un soutien complémentaire pour la prise en charge et l'évaluation de l'état clinique du nourrisson en période critique.

Plus d'informations sur bronchiolite.org

Retrouvez toutes les informations sur les mesures de prévention sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine : [Comment prévenir la bronchiolite](#)

Comment prévenir la bronchiolite du nourrisson ?

- 1 Se laver les mains avant de s'occuper de son bébé
- 2 Aérer sa chambre tous les jours comme le reste du domicile
- 3 Veiller à ce que la température de sa chambre ne dépasse pas 19 degrés
- 4 Ne pas l'exposer à la fumée de cigarette
- 5 Privilégier les sorties en extérieur et à l'air libre
- 6 Poursuivre, si possible, l'allaitement maternel
Le lait maternel contient des éléments permettant de combattre le virus
- 7 Lui laver régulièrement le nez au sérum physiologique
- 8 En cas de symptômes, porter un masque et éviter de l'embrasser sur le visage
- 9 Si besoin, demander conseils aux professionnels de santé

Pour plus d'informations et trouver un kiné de garde en Nouvelle-Aquitaine : bronchiolite.org

<https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr>

Rédacteur en chef
Laurent Filleul

Equipe de rédaction
Santé publique France
Nouvelle-Aquitaine

Anne Bernadou
Martine Casseron
Christine Castor
Sandrine Coquet
Sullivan Evain
Laurent Filleul
Gaëlle Gault
Alice Herteau
Anais Lamy
Sophie Larrieu
Marie-Anne Montaufray
Laure Meurice
Ursula Noury
Anna Siguier
Pascal Vilain

En collaboration à Santé publique France avec la Direction des maladies infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et analyse de données (Data)

Contact presse
presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France
12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication
24 novembre 2021

Sites associés :
► [SurSaUD@](#)
► [OSCOUR@](#)
► [SOS Médecins](#)

Remerciements aux partenaires de la surveillance

Associations SOS Médecins de Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Pau et Bayonne
Services d'urgences du réseau Oscour®
Observatoire Régional des Urgences Nouvelle-Aquitaine
Laboratoire de virologie et unité de surveillance biologique du CHU de Bordeaux
Laboratoire de virologie du CHU de Limoges
Laboratoire de virologie du CHU de Poitiers
Les équipes de l'ARS Nouvelle-Aquitaine
ainsi que l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance

GÉODES
GÉO DONNÉES EN SANTÉ PUBLIQUE

ars
Agence Régionale de Santé

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
Liberté
Égalité
Fraternité

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

10 conseils pour protéger soi-même et les autres :

- 1 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
- 2 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- 3 Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
- 4 Éviter de se toucher le visage
- 5 Respecter une distance d'au moins deux mètres avec les autres
- 6 Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)
- 7 Porter un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 quand la distance de deux mètres ne peut pas être respectée
- 8 Aérer les pièces le plus souvent possible, au minimum quelques minutes toutes les heures
- 9 Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
- 10 Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)