


Surveillance des épidémies hivernales

Phases épidémiques : ■ Pas d'épidémie ■ Pré-épidémie ■ Epidémie

**BRONCHIOLITE
(MOINS DE 2 ANS)**




Evolution régionale :



[Page 2](#)

**GRIPPE
ET SYNDROME GRIPPAL**



Evolution régionale :



[Page 3](#)

Autres données de surveillance régionale

Gastro-entérites aiguës : Activité en baisse en S02-2020 (06/01 au 12/01/2020) chez les adultes de plus de 15 ans avec une activité qui reste élevée d'après les données des associations SOS Médecins. Cette activité est en hausse chez les enfants de moins de 15 ans avec une activité très élevée d'après les données SOS Médecins. Cette recrudescence exceptionnelle est observée dans le contexte hivernal d'épidémie de gastro-entérites virales, la rentrée scolaire et également liée à la consommation de coquillages crus, fréquente en cette période de fin d'année.

→ Pour en savoir plus : [page 4 de ce document](#) et [site de Santé publique France](#)

Oreillons : Plusieurs cas d'oreillons ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine au cours du mois de décembre chez des jeunes adultes, notamment dans les Pyrénées-Atlantique et en Gironde (réseau Oscour® et SOS Médecins). Rappelons que la vaccination contre les oreillons, la rougeole et la rubéole est obligatoire chez les enfants nés depuis le 1^{er} janvier 2018 avec un schéma 2 doses de vaccin ROR (à 12 mois et 16-18 mois). Un rattrapage avec 2 doses chez les sujets nés à partir de 1980 est recommandé.

→ Pour en savoir plus : [lien](#)

Mortalité toutes causes : En Nouvelle-Aquitaine, en semaine 01, la mortalité toutes causes, tous âges et chez les plus de 65 ans, reste proche des valeurs attendues à cette période de l'année. Au niveau national, la mortalité tous âges et toutes causes confondues reste dans les marges de fluctuation habituelle.

→ Pour plus d'informations, se reporter aux bulletins nationaux : [lien](#)

Actualités

Cas groupés de pneumopathies possiblement associés à un nouveau Coronavirus, Wuhan, Chine
<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-groupes-de-pneumopathies-possiblement-associes-a-un-nouveau-coronavirus-wuhan-chine>

Alcool : Bulletin Santé publique Nouvelle-Aquitaine disponible [ici](#)
<https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/alcool-ou-en-sont-les-francais>
<https://www.santepubliquefrance.fr/regions/nouvelle-aquitaine/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-publique-alcool-en-nouvelle-aquitaine.-janvier-2020>

BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

Synthèse des données disponibles : **nette baisse de l'activité**

- **SOS Médecins** : 37 consultations soit 5 % de l'activité totale chez les moins de 2 ans (en nette baisse par rapport à S01).
- **Oscour®** : 159 passages d'enfants de moins de 2 ans soit 12,9 % de l'activité totale chez les moins de 2 ans (en nette baisse par rapport à S01). Parmi ces passages, 75 (47 %) ont été suivis d'une hospitalisation, et 146 passages (92 %) concernaient des enfants de moins de 1 an. Parmi les enfants hospitalisés pour bronchiolite, 71 étaient âgés de moins de 1 an (95 %).
- **Données de virologie** : diminution de la circulation du VRS avec 27 prélèvements positifs à VRS dans les CHU de la région (8 au CHU de Bordeaux, 9 au CHU de Limoges et 10 au CHU de Poitiers).




Figure 1 - Evolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine

Figure 2 - Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, OSCOUR®, Nouvelle-Aquitaine

Semaine	Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, moins de 2 ans	Variation par rapport à la semaine précédente	Nombre total d'hospitalisations codées, moins de 2 ans	Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations codées, moins de 2 ans (%)
2020-S01	139		356	39,04
2020-S02	75	-46%	262	28,63

Tableau 1 - Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, OSCOUR®, Nouvelle-Aquitaine

Consulter les données nationales :
Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)

Prévention et prise en charge de la bronchiolite

Recommandations sur les mesures de prévention

La bronchiolite est une maladie respiratoire qui touche surtout les enfants de moins de 2 ans. Elle est due à un virus, le plus souvent le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements, et peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les "doudous").

La prévention de la bronchiolite repose sur les mesures d'hygiène :

- le lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson, surtout avant de préparer les biberons et les repas
- éviter autant que possible d'emmener son enfant dans les lieux publics très fréquentés et confinés (centres commerciaux, transports en commun, hôpitaux...)
- le nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines...)
- l'aération régulière de la chambre
- éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés

Pris en en charge et conseils aux parents : [Prise en charge -évaluation](#) et [Conseils aux parents](#)

Brochure à télécharger : [Votre enfant et la bronchiolite](#)

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL

Synthèse des données disponibles : **activité en augmentation**

- SOS Médecins : activité en hausse avec 566 consultations enregistrées en semaine 02-2020 soit 4,7 % de l'activité totale
- Oscour® : 112 passages aux urgences (0,4 %) avec 15 % des personnes hospitalisées en semaine 02-2020.
- Données de virologie :
 - Grippe A : 2 prélèvements positifs au CHU de Bordeaux, 4 au CHU de Poitiers, 1 au CHU de Limoges.
 - Grippe B : 4 prélèvements positifs au CHU de Bordeaux, 3 au CHU de Poitiers, 2 au CHU de Limoges.
- Cas graves de grippe : la surveillance a débuté au 1er novembre 2019 (semaine 45). Dix cas graves signalés depuis le 01/11/2019.




Figure 4 - Evolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour grippe, tous âges, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine




Figure 5 - Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et proportion d'activité pour grippe, tous âges OSCOUR®, Nouvelle-Aquitaine

[Consulter les données nationales :](#)
Surveillance de la grippe: [cliquez ici](#)

Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus *Influenzae*. Les virus grippaux se répartissent essentiellement entre deux types : A et B, se divisant eux même en deux sous-types (A(H3N2) et A(H1N1)pdm09) ou lignage (B/Victoria et B/Yamagata). Les virus de la grippe se transmettent de personne à personne par les sécrétions respiratoires à l'occasion d'éternuements ou de toux. Ils peuvent également se transmettre par contact indirect à travers des objets contaminés. Les lieux confinés et très fréquentés (métro, bus, collectivités scolaires...) sont propices à leur transmission. La période d'incubation varie de 1 à 3 jours.

La prévention de la grippe repose sur les mesures d'hygiène simples pouvant contribuer à limiter la transmission de personne à personne. Concernant le malade, dès le début des symptômes, il lui est recommandé de :

- limiter les contacts avec d'autres personnes et en particulier **les personnes à risque** ;

- **se couvrir la bouche à chaque fois qu'il tousse** ;

- **se couvrir le nez à chaque fois qu'il éternue** ;

- se moucher ou cracher dans des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle recouverte d'un couvercle ;

Tous ces gestes doivent être suivis d'un lavage des mains à l'eau et au savon et à défaut, avec des solutions hydro-alcooliques.

Concernant l'entourage du malade, il est recommandé de :

- éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades, en particulier quand on est une personne à risque ;

- se laver les mains à l'eau et au savon après contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade ;

- nettoyer les objets couramment utilisés par le malade.

Recommandations sur les mesures de prévention : [lien](#)

Des vidéos pour comprendre la grippe : symptômes, transmission gestes de prévention pour se protéger et protéger les autres sont disponible [ici](#)

GASTRO-ENTERITE

Synthèse des données disponibles : **activité en baisse qui reste élevée chez les plus de 15 ans et une activité en hausse chez les enfants de moins de 15 ans**

- **SOS Médecins** : 2172 consultations pour gastro-entérites ont été enregistrées en semaine 02-2020 soit 18,2 % de l'activité totale (contre 18,9 % semaine 01-2020).
- **Oscour®** : 600 passages pour gastro-entérites soit 2,4 % de l'activité totale ont été enregistrés en semaine 02-2020 (contre 3,3 % en semaine 01-2020). Parmi ces passages, 91 ont été suivis d'une hospitalisation soit un taux d'hospitalisation de 15,2 % (contre 14,6 % en semaine 01-2020).
- Une baisse est observée d'après les données des urgences hospitalières et des associations SOS Médecins sur les adultes de plus de 15 ans avec une activité qui reste élevée d'après SOS Médecins. Celle-ci est en hausse chez les enfants de moins de 15 ans d'après SOS Médecins (660 consultations/visites soit 20,3 % de l'activité totale dans cette tranche d'âge) et les données d'urgences hospitalières (310 passages soit 6,2 % de l'activité totale dans cette tranche d'âge).




Figure 6 - Niveau d'activité des consultations pour gastro-entérites, tous âges, SOS Médecins




Figure 7 - Evolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour gastro-entérites, tous âges, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine




Figure 8 - Niveau d'activité des passages aux urgences pour gastro-entérites, tous âges, OSCOUR®




Figure 9 - Evolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et proportion d'activité pour gastro-entérites, tous âges, OSCOUR®, Nouvelle-Aquitaine

Prévention des gastro-entérites

Les gastro-entérites aiguës hivernales sont surtout d'origine virale. Elles se manifestent, après une période d'incubation variant de 24 à 72 heures, par de la diarrhée et des vomissements qui peuvent s'accompagner de nausées, de douleurs abdominales et parfois de fièvre. La durée de la maladie est généralement brève, de l'ordre de quelques jours. La principale complication est la déshydratation aiguë qui survient le plus souvent aux âges extrêmes de la vie.

La prévention des gastro-entérites aiguës virales repose sur l'hygiène des mains et des surfaces :

- les mains constituent le vecteur le plus important de la transmission et nécessite de ce fait un nettoyage au savon soigneux et fréquent ;
- certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l'environnement et présents sur les surfaces, celles-ci doivent être nettoyées soigneusement et régulièrement dans les lieux à risque élevé de transmission (services de pédiatrie, institutions accueillant les personnes âgées).

Recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites aiguës en établissement d'hébergement pour personnes âgées : [lien](#)

MORTALITE TOUTES CAUSES

Synthèse des données disponibles

Les données de mortalité Insee (tous âges et 65 ans et plus) restent dans des fluctuations habituellement observées à cette période.

Ces observations sont à interpréter avec prudence, les données étant encore non consolidées du fait des délais habituels de transmission. Elles ont pour vocation de décrire les évolutions de la mortalité, sans faire de lien avec tout évènement en cours.

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)




Figure 10 - Nombre hebdomadaire de décès toutes causes chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, Insee, Nouvelle-Aquitaine

Méthode

La **mortalité** toutes causes est suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'Etat-civil dans les communes informatisées de la région (qui représente près de 80 % des décès de la région).

- Un projet européen de surveillance de la mortalité, Euromomo (<http://www.euromomo.eu>), permet d'assurer un suivi de la mortalité en temps réel et de coordonner une analyse normalisée afin que les signaux entre les pays soient comparables. Les données proviennent des services d'état civil et nécessitent un délai de consolidation de plusieurs semaines. Ce modèle permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés pendant les saisons estivales et hivernales.

Les **regroupements syndromiques** suivis sont composés :

- Pour la grippe ou syndrome grippal : codes J09, J10, J11 et leurs dérivés selon la classification CIM-10 de l'Organisation mondiale de la santé ;
- Pour la bronchiolite : codes J210, J218 et J219, chez les enfants de moins de 2 ans ;
- Pour la GEA : codes A08, A09 et leurs dérivés

Pour ces regroupements, la définition des périodes épidémiques est basée sur la combinaison de méthodes statistiques appliquées à deux ou trois sources de données (SOS Médecins, Oscour®, et Sentinelles selon la pathologie). Sont appliquées jusqu'à trois méthodes statistiques selon les conditions d'application : (i) un modèle de régression périodique (serfling), sur 5 ans d'historique avec écrêtage des journées présentant les valeurs les plus élevées (ii) un modèle de régression périodique robuste avec pondération des journées selon leur valeur et (iii) un modèle de Markov caché. Pour chaque pathologie, un algorithme définit le niveau épidémique selon les alarmes statistiques observées. Celui-ci est validé par l'épidémiologiste.

Remerciements à nos partenaires :

- Associations SOS Médecins de Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Pau et Bayonne
- Services d'urgences du réseau Oscour®
- SAMU de la région Nouvelle-Aquitaine
- Observatoire Régional des Urgences Nouvelle-Aquitaine
- Réseau AquiRespi
- Laboratoire de virologie et unité de surveillance biologique du CHU de Bordeaux
- Laboratoire de virologie du CHU de Limoges
- Laboratoire de virologie du CHU de Poitiers
- Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)
- Système de surveillance des maladies à déclaration obligatoire
- Services d'Etat-Civil pour les données de mortalité
- les équipes de l'ARS Nouvelle-Aquitaine
- ainsi que l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr
Twitter : @sante-prevention

Directrice de la publication
Geneviève Chêne

Comité de rédaction
Dr Stéphanie Vandentorren, responsable
Martine Casseron, assistante

Epidémiologistes :

Anne Bernadou
Christine Castor
Sandrine Coquet
Laurent Filleul
Gaëlle Gault

Philippe Germonneau
Laure Meurice
Ursula Noury

Diffusion
Cellule régionale de Santé publique France
Nouvelle-Aquitaine
Tél. 05 57 01 46 20
nouvelleaquitaine@santepubliquefrance.fr